



מאי 2021

רופא/ה רוקח/ת נכבד/ה,

חברת סאנופי-אוונטיס ישראל בע"מ מבקשת להודיע על עדכון בעלון לצרכן של התכשירים:

**Tritace 1.25 mg; 2.5 mg; 5 mg;**  
*tablets*

החומר פעיל:

RAMIPRIL

ההתוויה המאושרת:

Hypertension congestive heart failure reduction of mortality in patients after MI with left ventricular dysfunction.  
For reducing the risk of myocardial infarction stroke cardiovascular death or need for revascularization procedures in patients over 55 years or more who have clinical evidence of cardiovascular disease (previous MI unstable angina or multivessel CABG or multivessel PTCA) stroke or peripheral vascular disease.  
Also for reducing the risk of myocardial infarction stroke cardiovascular death or need for revascularization procedures in diabetic patients of 55 years or more who have one or more of the following clinical findings: hypertension (systolic blood pressure > 160 mmHg or diastolic pressure > 90 mmHg) high total cholesterol (>5.2 mmol/L) low HDL (<0.9 mmol/L) current smoker known microalbuminuria clinical evidence of previous vascular disease.  
Prevention of progressive renal failure in patients with persistent proteinuria in excess of 1g/day.

מפורטים להלן תתי הסעיפים בהם נעשו העדכונים העיקריים בעלונים:

היריון, הנקה ופוריות:

היריון

עליך לספר לרופא שלך אם את חושבת **שאת שהנך** בהיריון או עשויה להיכנס להיריון .

טריטייס אינו מומלץ ב-12 השבועות הראשונים להיריון ואסור כלל לשימוש החל מהשבוע ה-13, שכן השימוש בו במהלך ההיריון עלול להזיק לתינוק.

אם נכנסת להיריון בזמן שאת מטופלת בטריטייס, ספרי לרופא שלך מיד. ייתכן שהרופא יחליט על טיפול חלופי הבטוח לשימוש בהיריון. באם נדרש, מעבר לטיפול חלופי מתאים צריך להתבצע לפני היריון מתוכנן.

בדרך כלל הרופא ייעץ לך להפסיק לקחת טריטייס לפני שאת נכנסת להיריון או כאשר נודע לך שאת בהיריון, ויעץ לך לקחת תרופה אחרת במקומה.



טריטייס אינו מומלץ ב-12 שבועות ההיריון הראשונים ואסור כלל לשימוש החל מהשבוע ה-13, כיוון שהוא עלול לגרום נזק רציני לעובר.

#### הנקה

אין ליטול טריטייס בזמן ההנקה.

התייעצי עם הרופא או עם הרוקח לפני לקיחת כל תרופה בתקופת היריון והנקה.

לפני שתקבלי טריטייס, ספרי לרופא שלך אם את מניקה או מתכננת להיניק מאחר ויש מידע מוגבל על שימוש בטריטייס בזמן הנקה. טריטייס אינו מומלץ לשימוש במהלך הנקה.

העלונים המעודכנים נשלחו לפרסום במאגר התרופות שבאתר משרד הבריאות. בנוסף ניתן לקבלם מודפסים על ידי פנייה לבעל הרישום, סאנופי-אוונטיס ישראל בע"מ, רח' בני גאון 10 נתניה. או בטלפון : 09-8633700.

להלן הקישור לאתר משרד הבריאות : <http://data.health.gov.il/drugs/index.html#/byDrug>

בברכה,

סאנופי-אוונטיס ישראל בע"מ