

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة (مستحضرات) - 1986

يسوق الدواء بدون وصفة طبيب

إكسيپان

جل 0.5%

قنينة رول - أون، ماسورة

پiroxicam 0.5% (Piroxicam 0.5%)

المواد غير الفعالة ومولدات الحساسية في المستحضر — انظر الفقرة 2 "معلومات هامة عن بعض مركبات المستحضر" والفقرة 6 في النشرة.

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للمستحضر. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن المستحضر.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، توجه إلى الطبيب أو الصيدلي.

عليك إستعمال المستحضر وفقاً لتعليمات المقدار الدوائي في الفقرة 3 من هذه النشرة. إستشر الصيدلي إذا كنت بحاجة لمعلومات إضافية.

عليك التوجه للطبيب في حال تفاقمت أعراض (symptoms) المرض أو لم تتحسن بعد أربعة أسابيع.

1) لأي غرض مخصص الدواء؟

إكسيپان جل مخصص كعلاج موضعي في حالات الإلتهاب التي تترافق بألم.

الفصيلة العلاجية: من المستحضرات المضادة للإلتهاب اللا ستيروئيدية (NSAIDs).

2) قبل إستعمال الدواء

لا يجوز إستعمال الدواء إذا:

- كنت حساساً (أليرجي) للمادة الفعالة **پiroxicam** أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها المستحضر.

- كنت حساساً (أليرجي) لمستحضرات الأسيپرين أو لمستحضرات أخرى مضادة للإلتهاب أو عندما سببت هذه المستحضرات أعراضًا جانبية من صعوبة في التنفس، زوائد أنفية، تهيج وإلتهاب في الجلد.

لا يجوز إستعمال المستحضر بدون إستشارة الطبيب قبل بدء العلاج:

• إذا كنت تعاني أو عانيت في الماضي من خلل في الأداء الوظيفي للكبد أو الكلى.

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال المستحضر

• إذا كنت حساساً لأي طعام أو لأي دواء، عليك إبلاغ الطبيب عن ذلك قبل إستعمال المستحضر.

• بلغ عن إستعمال إكسيپان جل بأنه متصل بظهور ردود فعل جلدية التي قد تشكل خطراً على الحياة (مثل: متلازمة ستيفنس - جونسون وإنحلال البشرة النخري السمي). الطفح الجلدي على الجسم يبدو في البداية على شكل نقاط حمراء مركزة أو بقع دائمة مع حويصلات في الوسط.

• أعراض إضافية يجب التتحقق منها تشمل: تقرحات في الفم، في الحنجرة، في الأنف، في الأعضاء التناسلية وإلتهاب ملتحمة العين (إحمرار وإنفاس العينين).

• ردود الفعل الجلدية هذه التي تشكل خطراً على الحياة تترافق غالباً بأعراض شبيهة بالإنفلونزا. من شأن الطفح أن ينتشر على شكل حويصلات أو على شكل تقرحات للجلد.

• الخطورة الأعلى لظهور ردود الفعل الجلدية هو في الأسبوع الأول من العلاج.

• إذا تطور لديك رد فعل جلدي خطير بعد إستعمال **پiroxicam** في السابق، فلا يجوز معاودة إستعماله.

• مع ظهور أعراض رد فعل جلدي خطير، يجب التوجه حالاً للطبيب وإطلاعه عن إستعمال إكسيپان جل.

• قد تسبب مستحضرات مضادة للإلتهاب لا ستيروئيدية، بما في ذلك إكسيپان جل، ضرراً للكلى أو فشلاً كلويًا.

تحذير! مادة قابلة للإشتعال، إحفظها من النار.

لا يجوز إشعال سيجارة أو التعرض للنار إلى أن يجف المستحضر تماماً.

الأطفال والمرأهقون

إكسيپان جل غير مخصص لعلاج أطفال دون عمر 12 سنة.

التدخلات/التفاعلات بين الأدوية

لا يعرف عن تفاعلات بين الأدوية ما بين إكسيپان جل وأدوية أخرى. إذا كنت تستعمل، أو إستعملت مؤخراً أدوية أخرى، بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إبك للطبيب أو الصيدلي عن ذلك.

الحمل، الإرضاع والخصوبة

إذا كنت تحاولين الحمل أو كنت تجتازين فحوص خصوبة، يجب دراسة التوقف عن العلاج بالمستحضر.

قد يزيد إكسيپان جل من خطورة حدوث إجهاض في المراحل المبكرة من الحمل.

يجب إستشارة الطبيب قبل بدء العلاج إذا كنت في فترة الحمل، تخاطبين لحصول حمل أو كنت في فترة الإرضاع.

السيادة وإستعمال الماكنت

من غير المتوقع أن يؤثر إستعمال إكسيپان جل على قدراتك على السيادة أو إستعمال الماكنت.

معلومات هامة عن بعض مركبات المستحضر

يحتوي إكسيپان جل على:

• بارابينات التي قد تؤدي إلى ردود فعل متاخرة.

(من الجائز حدوث ردود فعل متأخرة).

• يوجد حوالي 18.1 غرام إيثانول 95% في كل 100 غرام، الذي قد يؤدي إلى الشعور بحرق في الجلد المتضرر.

• مع ظهور أعراض رد فعل جلدي خطير، يجب التوجه حالاً للطبيب وإطلاعه عن إستعمال إكسيپان جل.

• قد تسبب مستحضرات مضادة للإلتهاب لا ستيروئيدية، بما في ذلك إكسيپان جل، ضرراً للكلى أو فشلاً كلويًا.

تحذير! مادة قابلة للإشتعال، إحفظها من النار.

لا يجوز إشعال سيجارة أو التعرض للنار إلى أن يجف المستحضر تماماً.

3) كيفية إستعمال الدواء؟

عليك الإستياضاح من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقاً بخصوص المقدار الدوائي وطريقة العلاج بالمستحضر.

المقدار الدوائي الإعتيادي هو عادة:

يجب دهن 1 غرام جل (حوالي 3 سم) في المكان المصاب 3-4 مرات في اليوم.

إذا لم تتحسن الأعراض، يجب إبلاغ الطبيب.

طريقة الإستعمال:

قنينة رول - أون:

يجب تدليك المنطقة المؤلمة بواسطة الكرة الصغيرة الموجودة في رأس القنينة لمدة حوالي نصف دقيقة.

بعد ذلك، بالإمكان تدليك المنطقة بواسطة اليد حتى الإمتصاص التام للجل في الجلد (إلى أن "يختفي" الجل).

يجب غسل اليدين بعد الإستعمال.

ملاحظة: في حال عدم إستعمال المستحضر بشكل متواصل، قد تتشكل على الكرة الصغيرة طبقة رقيقة.

ومائلة للون الأصفر ذات رائحة مميزة. هذه الطبقة لا تؤثر على جودة وفعالية الدواء، يجب مسح الكرة حتى زوال الطبقة والرائحة أيضاً.

MASOORA: يجب دهن الجل وتدليكه حتى إمتصاصه في الجلد. إذا لم يمتص الجل بشكل كامل، فمن الجائز حدوث بقع مؤقتة طفيفة على الجلد وكذلك بقع على الملابس.

لا يجوز إستعمال المستحضر لفترة تزيد عن أربعة أسابيع بدون إبلاغ الصيدلي أو الطبيب عن ذلك.

لا يجوز الدهن في منطقة العينين، الأنف، الفم، في

منطقة الأعضاء التناسلية أو فتحة الشرج، الأنسجة المخاطية أو في الأماكن التي يكون فيها الجلد مصاباً، أو في أي حالة أخرى في الجلد التي تؤثر على مكان العلاج. إذا لامس الجل هذه الأماكن، فيجب شطف المكان جيداً بواسطة الماء.

لا يجوز تغطية/تضميد المنطقة المعالجة بـ إكسيپان جل. لا يجوز تغطية/تضميد المستحضر بـ إكسيپان جل.

بعد إستعمال المستحضر: يجب إغلاق الماسورة أو قنينة الروول - أون جيداً وغسل اليدين.

لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به! إنتبه: لا يجوز البلع! إكسيپان جل مخصص للإستعمال الخارجي فقط، للدهن على الجلد.

إذا إستعملت كمية فائضة (مقدار دوائي أكبر مما ينبغي) أو إذا بلع شخص بالخطأ من المستحضر إن إستعمال كمية فائضة من المستحضر من غير المرجح أن تسبب أعراضًا جانبية.

إذا بلع شخص بالخطأ من الدواء، توجه حالاً للطبيب أو لغرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر عليه الدواء معك.

إذا نسيت إستعمال هذا المستحضر في الموعد المطلوب، فيجب إستعماله حالاً عند تذكرك بذلك إلا إذا كان ذلك موعد الإستعمال التالي. لا يجوز في أي حال من الأحوال إستعمال كمية مضاعفة!

إذا توقفت عن إستعمال المستحضر فإن الألم لديك قد يعود.

لا يجوز إستعمال أدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تستعمل فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال هذا الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

4) الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال إكسيپان جل قد يسبب أعراضًا جانبية عند بعض المستعملين. لا تتدesh من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني أي منها.

يجب التوقف عن إستعمال المستحضر والتوجه حالاً للطبيب إذا قاسيت من الأعراض التالية: صفير مفاجئ في التنفس، صعوبات في التنفس، سخونة، إنتفاخ الجفنين، الوجه أو الشفتين، طفح أو حكة منتشرتين على كامل الجسم. شيع هذه الأعراض هو نادر، لكنها قد تكون جدية.

رد فعل جلدي خطير الذي قد يشكل خطراً على الحياة ويتميز بطفح جلدي أحياناً يتراافق بحويصلات وجروح (مثل: متلازمة ستيفنس جونسون وإنحلال البشرة الأخرى السمي) - نادر جداً.

أعراض جانبية إضافية:

إحمرار، طفح و/أو حكة في منطقة الدهن (مثل: إكزيما، إلتهاب الجلد)، رد فعل جلدي عند التعرض لضوء الشمس.

أعراض جانبية إضافية تظهر في أوقات متباعدة: غثيان، إنزعاج وإضطرابات في الجهاز الهضمي.

هذه الأعراض الجانبية من المفترض أن تزول مع التوقف عن إستعمال الدواء.

إذا استمرت الإضطرابات في الجهاز الهضمي بعد التوقف عن إستعمال المستحضر، فعليك إستشارة طبيبك أو الصيدلي.

التبليغ عن أعراض جانبية:

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط «تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي» الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للت bliغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il>

بالإضافة لذلك، بالإمكان تبليغ شركة بيريچو بواسطة العنوان التالي:

www.perrigo-pharma.co.il

5) كيفية تخزين الدواء؟

● تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي و المجال رؤية الأطفال و/أو الرضع وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

● لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العلبة. تاريخ انقضاء الصلاحية يشير إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

رد فعل جلدي خطير الذي قد يشكل خطراً على الحياة ويتميز بطفح جلدي أحياناً يتراافق بحويصلات وجروح (مثل: متلازمة ستيفنس جونسون وإنحلال البشرة الأخرى السمي) - نادر جداً.

أعراض جانبية إضافية:

إحمرار، طفح و/أو حكة في منطقة الدهن (مثل: إكزيما، إلتهاب الجلد)، رد فعل جلدي عند التعرض لضوء الشمس.

أعراض جانبية إضافية تظهر في أوقات متباعدة: غثيان، إنزعاج وإضطرابات في الجهاز الهضمي.

هذه الأعراض الجانبية من المفترض أن تزول مع التوقف عن إستعمال الدواء.

إذا استمرت الإضطرابات في الجهاز الهضمي بعد التوقف عن إستعمال المستحضر، فعليك إستشارة طبيبك أو الصيدلي.

إذا ظهر عرض جانببي، إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

6) معلومات إضافية

● يحتوي الدواء بالإضافة للمادة الفعالة أيضاً:

Purified Water, Alcohol 95%, Diethylene Glycol Monoethyl Ether (Transcutol), Cetiol HE, Hydroxyethyl Cellulose (Natrosol), Poloxyl-(23)-Lauryl Ether (BRIJ 35), Trolamine, Arlacel 186, Methyl Parahydroxybenzoate (Methyl Paraben), Propyl Parahydroxybenzoate (Propyl Paraben)

● يحتوي المستحضر على حوالي 18.1 غرام إيثانول 95% في كل 100 غرام.

● كيف يبدو المستحضر وما هو محتوى العلبة: إكسيپان جل عبارة عن جل بلون شفاف - مائل للأصفر مع بياض من ماسورة تحتوي على 50 غرام أو قنينة رول-أون التي تحتوي على 90 مل.

● إسم المنتج، صاحب الإمتياز وعنوانه: بيريچو، إسرائيل فارماسيتكا م.ض.، ص.ب. 16، يروحام.

● تم إعدادها في تشرين الأول 2020.

● رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: 6511.27132

● من أجل سهولة وتهجين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.