



**كوليستيد<sup>™</sup>**  
حبوب

يحتوي كل كيس على: كوليستيدول هيدروكلوريد 5 غرامات  
**colestipol hydrochloride 5 g**

للقائمة المواد غير الفعالة ومبنيات الحساسية، انظر البند 6 "معلومات إضافية".

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها وذلك قبل البدء باستعمال الدواء. تجنبي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا كانت لديك أسلطة إضافية، فتوجه إلى الطبيب أو الصيدلي.

وعيف هذا الدواء من أيك. لا تتعطه لآخرين؛ لأنّه قد يضرهم، حتى لو بدا لك تشابة بين حالتك الصحية وحالتهم.

#### 1. لم أعد هذا الدواء؟

بخض كوليستيد<sup>™</sup> مستوى الكوليسترول في الدم إضافة إلى التغذية المراقبة.  
**المجموعة العلاجية:** رابط للأمراض الصفراوية.

#### 2. قبل استعمال الدواء إذا: يمنع استعمال الدواء إذا:

كنت حساساً (أيكي حساسية) لل المادة الفعالة أو لأي من المركبات الإضافية  
التي يحتوي عليها الدواء (انظر الفصل 6).

تحذيرات خاصة متعلقة باستعمال الدواء  
قبل بدء العلاج بـ كوليستيد<sup>™</sup> أخبر طبيبك إذا:

كنت تعاني من ارتفاع في إداء الغدة الدرقية (مشكلة في الكلى تسبب ظهور بروتينات في البول وأختناس السوائل في الجسم).

كنت تعاني من مركبة قليلة أو كبيرة جداً من البروتينات في الدم.

كنت تعاني من مشكلات في الكبد مثل اليرقان.

كنت تعاني من السكري.

#### الأطفال والمرأهون

لا يُعطى هذا الدواء عادة للأطفال. استشر الطبيب إذا وصف الدواء لطفلك.  
إذا وصف الدواء للأطفال أو للكبار الشبان، على الطبيب أن يتبع نموهم وتتطورهم بشكل منتظم.

#### التفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تتناول أو تناولت مoxa، أدوية أخرى، بما فيها أدوية دون وصفة طبية وكميات غذائية، أخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك. لا سيما إذا كنت تتناول:

أدوية للقلب مثل ديجوكسین وديجيتوسكسين.

• حاصرات بينا مثل بروبريلول لعلاج ضغط الدم المرتفع، نحمة صدرية (angina)، شقيقة أو أعراض القلق.

• أدوية مدرة للبول مثل كلوروتايزيد أو فوروسبييد المستعملة غالباً لمشاكل في القلب أو في الكلى.

• مضادات حيوانية مثل ترايساكلين هيدروكلوريد وبينسيلين G.

• جيمفيروزيل - دواء إضافي لخفض الكوليسترول.

• مثبطات جهاز المناعة مثل ميكروفيلولات موفيل.

يُحتمل أن يحتاج الطبيب إلى تغيير جرعة هذه الأدوية. إذا كنت تتناول بروبريلول قد يحتاج الطبيب إلى خفض الجرعة في بداية ونهاية الاستعمال بـ كوليستيدول.

#### استعمال الدواء والغذاء

لا يجوز تناول الدواء كمسحوق جاف، بل يجب خلطه مع مشروب أو طعام سائل (انظر البند كيف تستعمل الدواء).

#### الحمل، الإرضاع، والخصوبة

إذا كنت حاملة، مرضعة، تفكرين بذلك حامل، أو تحظين للحمل، عليك استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل بدء العلاج بهذا الدواء. قد يوقف الطبيب العلاج.

#### السياحة وأاستعمال الماكينات

لا يجوز كوليستيد<sup>™</sup> في القدرة على السياحة أو تشغيل الماكينات.

#### 3. كيف تستعمل الدواء؟

يجب استعمال المستحضر دائمًا حتى تعلميات الطبيب. عليك الحصول على الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكداً من الجرعة الدوائية ومن طريقة العلاج بالمستحضر. الجرعة وطريقة العلاج سيحددهما الطبيب، فقط.

#### يُمنع تناول الجرعة الموصى بها.

يُمنع تناول الدواء كمسحوق جاف. يجب خلطه مع مشروب أو طعام سائل. يجب خلط المسحوق جيداً مع 100 مل على الأقل من الماء أو مشروب آخر غير عالي كثافة مثل البرتقالي أو حليب قليل الدهن. بدلاً من ذلك، يمكن رش المسحوق فوق شورية أو جبنة حبوب أو خلطه مع مهروس الفواكه (مثل الجريب فروت) أو اللبن، أطعمة تحتوي على الأقل 100 مل أو أكثر من السائل.

الجرعة الابتدائية المتبعة هي كيس واحد أو كيسين من بيبات كوليستيد<sup>™</sup> في اليوم. يُحتمل أن يرفع الطبيب الجرعة كل شهر حتى يصل مستوى الكوليسترول إلى المستوى الأفضل لك. لا تغير عدد الأكياس التي تتناولها، إلا إذا أوصى لك الطبيب بذلك. لا يجوز تناول أكثر من 6 أكياس (30 غراماً) في اليوم. إذا تناولت أكثر من كيسين في اليوم، يفضل أن تزور عيادة إلى جر عين، وتقدّرها بفارق بضع ساعات بين الجرعة والأخرى، متلازماً مع جevity التطور والمناعة.

#### تناول كوليستيد<sup>™</sup> مع أدوية أخرى

إذا كنت تتناول أدوية أخرى، يجب تناولها على الأقل ساعة واحدة قبل أو أربع ساعات بعد تناول كوليستيد<sup>™</sup>. فيما إذا كنت تتناول جيمفيروزيل، عليك تناوله قبل ساعتين على الأقل أو بعد ساعتين من تناول كوليستيد<sup>™</sup>.

يُحتمل أن تحتاج إلى تناول كوليستيد<sup>™</sup> يومياً لفترة طويلة. من المهم أن تحافظ على الحمية الغذائية الموصى بها لك، وأن تتناول الدواء.

لا تذوب حبيبات الدواء، لهذا فإن النسج الذي يتم الحصول عليه هو "حببي"، لا سيما إذا لم يتم خلطها جيداً بالسائل المستعمل. يبرر مظهر الدواء الخبيث بشكل أساسى في السائل "المحفوظ" مثل الماء أو عصير الفواكه. في الحالات الحرجة مثل موزلى مع حليب، قد لا تشاهد حبيبات الدواء إطلاقاً. هناك أمثلتان يخلطون الدواء قبل ليلة من تناوله لتحسين النتيجة.

إذا تناولت كمية أكبر من كوليستيد<sup>™</sup> مما تحتاجها

لا يجوز تناول كمية أكبر من كوليستيد<sup>™</sup> مما وصفها لك الطبيب. أخبر الطبيب إذا تناولت جرعة أعلى من الجرعة التي وصفتك لك، لأنك قد تعاني من الإمساك.

إذا تناولت جرعة أعلى أو إذا اتبعت طرقاً بالخطأ من الدواء، توجه حالاً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ التابعة للโรงพยาบาล، مصطحبًا معك عينة الدواء.

إذا نسيت تناول الدواء في الوقت المحدد، لا يجوز لك تناول جرعة مضاعفة. تناول الدواء الثانية في الوقت الاعتيادي واستشر الطبيب.

يجب الصادمة على العلاج وفقاً لنصائح الطبيب.

يمنع تناول الأدوية في الظل! تحقق من المصطلح على عبوة الدواء ومن الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.

إذا كانت لديك أسللة إضافية تتعلق باستعمال الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

#### 4. الأعراض الجانبية

مثل أي دواء، يمكن أن يسبّب استعمال كوليستيد<sup>™</sup> أعراض جانبية لدى بعض المستخدمين. لا تفزع عن قراءة قائمة الأعراض الجانبية، فقد لا تعاني من أي منها.

توجه إلى الطبيب إذا كنت تعاني من أحد الأعراض بعد تناول الدواء:

- إمساك شديد، الذي قد يسبب انسداد الأمعاء. إذا حدث ذلك، فقد تحتاج إلى علاج حملة شرجية لتحرير الانسداد. قد يسبب الإمساك تفاقم الوساير، وقد تشاهد دمًا في البراز.

- حالات الصداع والتي قد تكون بعضها خطيرة (شقيقة، حالات الصداع الجيبي). آخر الطبيب إذا كنت تعاني من أحد الأعراض بعد تناول الدواء:

- أعراض جانبية شائعة جداً (قد تؤثر في حتى شخص واحد من بين 10 أشخاص) - إمساك، يمكن متلازماً غالباً ولا يستمر لفترة طويلة. إن تناول كمية أكبر من الآليات وشرب كمية كبيرة من السوائل يساعد غالباً.

- انتفاخ في البطن.

أعراض جانبية شائعة (قد تؤثر في حتى شخص واحد من بين 100 شخص): تجوّبات، غازات، غثيان، إسهال، طفح، عسر الهضم، شعور بالانتفاخ، ألام في المعدة في الظهر، شعور بالتعب.

أعراض جانبية ليست شائعة (قد تؤثر في حتى شخص واحد من بين 100 شخص): فقدان الشهية، صعوبات في النوم، شعور بالدوران، قروح في المعدة وزيف من قروح في المعدة تسبب ألام بطن خطيرة. إذا بدأت القرح تترزف، فقد يصبح

البراز داكنا جداً أو ربما تتفاها دماء التهاب كيس المرارة، حصى في المرارة أو جلد مائل إلى الصفرة؛ آلام في الصدر، انزعاج أو ضغط في الصدر (ذبحة صدرية)، **angina pectoris**، تبض سريع (tachycardia)؛ ضيق في التنفس أو صعوبات في التنفس؛ حكة في الجلد أو شرى، التهاب الجلد؛ مستويات مرتفعة أو غير سليمة لإنزيمات الكبد (ارتفاع ناقلة أمين الألانين، ارتفاع مستوى ناقلة أمين الأسبارتات)؛ ارتفاع مستوى الفوسفات الكلوي في الدم (مادة معينة في الدم)، تورم الكاحلين، راحتي القدمين أو أصابع اليدين (وذمة محيطية)؛ شعور بالضعف.

يؤثر **كوليستيد™** في الطريقة التي يمتص فيها جسمك الدهنيات وفي بعض الفيتامينات الذائبة في الدهن (E, A, D, K). قد يوصى الطبيب بتناول مكمل من الفيتامينات إذا كان يعتقد أن هذه الحالة قد تحدث.

يُحتمل أن يرتفع مستوى الدهنيات والفيتامينات في الدم. هذه الحالة تكون مؤقتة غالباً.

إذا ظهر عارض جانبي، إذا تفاقم أي من الأعراض الجانبية أو إذا عانيت من عارض جانبي لم يذكر في النشرة، عليك استشارة الطبيب.

يمكن إبلاغ وزارة الصحة بالأعراض الجانبية عبر الضغط على رابط "الإبلاغ عن الأعراض الجانبية بسبب العلاج الدوائي"، الموجود في الصفحة

الأكياس معبأة في عبوات تحتوي على 50 كيساً.  
صاحب التسجيل وعنوانه: فايزر بي. إف. إيه فارماسيكا إسرائيل م.ض.  
شارع سنكار 9، هرتسليا بيتوح، 46725.

الرئيسية لموقع وزارة الصحة ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il))، الذي يوجهك إلى استماراة على الإنترنت للإبلاغ عن الأعراض الجانبية، أو عبر الدخول إلى الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il>

## 5. كيف يخزن الدواء؟

- تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء، وكل دواء آخر، في مكان مغلق، بعيداً عن متناول أيدي و المجال روية الأولاد وأو الأطفال، وهكذا تتجنب التسمم. لا ثسبب التفقر دون تعليمات صريحة من الطبيب.
- يُمنع تناول الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) الظاهر على العبوة. يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- يجب التخزين بدرجة حرارة أقل من 25°C.

## 6. معلومات إضافية

إضافة إلى المادة الفعالة، يحتوي الدواء أيضاً على:

Silica colloidal anhydrous

### كيف يبدو الدواء وماذا تحوي العبوة:

كيس يحتوي على حبيبات لونها أصفر - برتقالي.

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة:  
كوليستيد™: 044-74-23527  
شارع سنكار 9، هرتسليا بيتوح، 46725.

لتبسيط قراءة هذه النشرة وتسهيلها ورد النص بصيغة المذكور. على الرغم من ذلك، الدواء معد لأبناء كلا الجنسين.

تم تحريرها في تشرين الثاني 2020 بموجب تعليمات وزارة الصحة.