

أوكسوپورين 400، حبسولات ذات تحرير متأنٍ

تحتوي كل حبسولة بيتوكسيفينلين 400 ملг (Pentoxifylline)

(المواد غير الفعالة ومسننات المساعدة في الدواء - أنظر

بند 6 "معلومات إضافية" في بند 2 "معلومات مهمة عن

جزء من مرتكبات الدواء".

اقرأ هذه النشرة بأعماق حتى نهايتها قبل أن تستعمل الدواء.

تحتوى هذه النشرة على معلومات ملخصة عن الدواء. إذا

كان لديك أي استثناء اضافية، اطلب إلى الطبيب أو الصيدلي.

وُصف هذه الدواء لأجلها، لا تطعمه إلى آخرين. فهد قد يسبب

الضرر لهم حتى لو بدا لك أن حالتهم الطبية مختلفة تماماً.

1. لاي غرض مخصوص الدواء؟

يشتمل الدواء لتحسين جرير الدم في الأوعية الدموية

الحيوية.

الفصيلة العلاجية: مشقة ميلكتاسين.

يُتبع الدواء قصيدة أدوية التي توسم الأوعية الدموية المحبطية.

يُبعَّر عن الدواء ريزاد جرير الدم لأندرز والجلين.

2. قبل استعمال الدواء إذا:

لا يجوز استعمال الدواء إذا:

إذا كنت حساساً (أرجح) لل المادة الفعالة (بيتوكسيفينلين).

أدوية شبيهة أخرى مثل ثيوفينلين أو أميفينين أو أي

واحد من المركبات الاضافية في التي تحتويها الدواء

(انظر بند 6). علامات رد فعل الأرجح تشمل: ملطف

مشكل في البowel والنفف، انتفاخ الشفاف، الوجه، الحقى

أو اللسان.

إذا كان لديك مشكل في القلب أو مرت مؤخراً بنيفة قلبية

كذلك تعلمي من خفف قلب وخيم (نظم قلب سريع جداً

غير منظم).

كذلك تعلمي من نزيف داخل العين (cerebral hemorrhage)

(retinal hemorrhage).

لا يجوز استعمال الدواء إذا كان واحد أو أكثر من الحالات

القصة أعلاه يطيق عليك إذا لم تكون متاكداً، استشر

الطبيب أو الصيدلي قبل تناول أوكسوپورين.

تحذيرات خاصة بخصوص استعمال الدواء

قبل العلاج بأوكسوپورين، أخبر الطبيب إذا:

كذلك تشعر بالدواء أو الأعفاء ضد انتقال السريع من

الآفات، أوكسوپورين، ضغطه منخفض

لا يجوز تناول الماء الذي تزويه الدم القلب التاجية عن

تناول أو تضيق الشريان.

إذا كنت تناولت في الكبد أو في الكلية

إذا لم تكون متاكداً إذا كان واحد أو أكثر من الحالات المفصلة

أعلاه يطيق عليك، استشر الطبيب قبل تناول أوكسوپورين.

تفاعلات مع الأدوية

إذا كنت تناول، أو إذا أخذت في الأونة الأخيرة، أدوية أخرى

بما في ذلك الوريد بدوافع طيبة وأضافات تغذية، آخر

الطبيب أو الصيدلي بذلك، تلك أوكسوپورين قد يؤثر

على فعالية أدوية معينة. بالإضافة لذلك، أدوية معينة قد تؤثر

على فعالية أوكسوپورين.

أخير الطبيب أو الصيدلي يوصى بما إذا كنت تأخذ:

أدوية لعلاج السكري يتمثل الأدوية بالإعطاء الفموي

إذا سببت تناول الدواء
إذا سببت تناول هذا الدواء في الوقت المحدد، لا
يجوز تناول جرعة مضاعفة من أجل التعويض.
عن الجرعة المناسبة.

إذا أظهر عرض جانبى، إذا أقام أحد الاعراض
الجانبية أو علماً تعالى عن عرض جانبى لم
يذكر في هذه النشرة، عليك استشارة الطبيب.

يمكن اكتساب
الصححة بواسطة الضغط على الرابط "الليلي"
عن الاعراض الجانبية، اضغط على الرابط "دولي"
في الصفحة الفنية لموقع "جرايد" (www.health.gov.il)

5. تغذية ذات الدواء
تجنب التسمم هذا الدواء وكل دواء آخر يجب
حظظه في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي
الأطفال والأرضي ونظفهم وديثم تمنع
النسم، لا تسبب التسمم دون أمر صريح من

الطبيب
أوكسوپورين اعراضها جانبية لدى بعض
المستخدمين. لا تزعم فرقاً قائمة الاعراض
الجانبية من الممكن أن تصاب بأي واحدة
منها.

4. الاعراض الجانبية
كما في كل دواء، قد يسبب استعمال
أوكسوپورين اعراضها جانبية لدى بعض
المستخدمين. لا تزعم فرقاً قائمة الاعراض
الجانبية من الممكن أن تصاب بأي واحدة
منها.

5. تغذية ذات الدواء
تجنب تناول الجلد
فيه موسي أو ماء في البراز

6. معلومات اضافية
اضافة المادة الماء، يحتوى الدواء أيضاً:
Lactose monohydrate, hypromellose,
magnesium stearate, titanium dioxide
(E171), macrogol 400, erythrosine
aluminum lake (E127), indigo
carmine aluminum lake (E132),
quinoline yellow aluminum lake
(E104), carnauba wax

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة
حبسولة بلون وردي، مع خط شطر في
الجهتين.

احجام العقوف المصادق عليها: 50 أو
100 جسمة. قد لا تكون جميع أحجام العبوات
مسوقة.

تم التقى في شباط 2021 حسب تعليمات
وزارة الصحة

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الحكومي
في وزارة الصحة: 011-41-23858-00.
من أجل التنبيه وتسهيل القراءة، تم صياغة
نشرة المعلومات للأدوية بناءً على المعايير
من ذلك، الدواء مخصص لابناء كلا الجنسين.

المنتاج وصاحب التسجيل:
دكسيل م.ص.

فحوصات دم
قد يغير أوكسوپورين مستويات إنزيمات الكبد،
التي يمكن تشخيصها في فحوصات دم.
تدل هذه الحالة على مشكل في فحوصات دم.
إذا ظهر عرض جانبى، إذا أقام أحد الاعراض
الجانبية أو علماً تعالى عن عرض جانبى لم
يذكر في هذه النشرة، عليك استشارة الطبيب.

يمكن اكتساب
الصححة بواسطة الضغط على الرابط "الليلي"
عن الاعراض الجانبية، اضغط على الرابط "دولي"
في الصفحة الفنية لموقع "جرايد" (www.health.gov.il)

6. معلومات اضافية
تجنب التسمم هذا الدواء بعد تاريخ انتهاء

الصلبية (دارك) الذي يظهر
على طبر المدوة، تاريخ انتهاء الصلاحية
الأخيرة على الأقل آخر من تاريخ النشر.
يرجع إلى الويب المتصفح عن طريق

شريط العنوان: جرب التذرين في مكان
مغلق، تحت 25 درجة مئوية.

لا يجوز التخلص من الأدوية عن طريق
صرف الصحي، aseptic meningitis)
إسال الصيدلي عن كيفية التخلص من
الأدوية التي تم تعدّي قيد الداء. هذه
الخطوات تساهم في الحفاظ على البيئة.

7. تحذيرات خاصة بخصوص استعمال الدواء
إذا كنت تناولت كثمات بهلوة أكثر من
المعتاد، ربما يسبب اضطراب في الدم (آفة
الصفرات) التي تسبب اضطراب في نظم قلب سريع

إذا كنت تناولت كثمات بهلوة أقل من
المعتاد، مما يزيد من انتفاخ العروق.
إذا كنت تناولت كثمات بهلوة أقل من
المعتاد، مما يزيد من انتفاخ العروق.

إذا كنت تناولت كثمات بهلوة أقل من
المعتاد، مما يزيد من انتفاخ العروق.

إذا كنت تناولت كثمات بهلوة أقل من
المعتاد، مما يزيد من انتفاخ العروق.

إذا كنت تناولت كثمات بهلوة أقل من
المعتاد، مما يزيد من انتفاخ العروق.

شارع دكسل 1، أور عكياً 3060000، إسرائيل