

نشرة طبية للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة  
(مستحضرات) - ١٩٨٦

اقرأ/ي النشرة بإمعان حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء.  
أقرت وزارة الصحة صيغة هذه النشرة وفحص محتواها ورخص من قبلها.

## قنوروتون ٣٠٠ ملغ كبسولات

التركيب:  
كل كبسولة تحتوي على:

o-(beta-hydroxyethyl) rutosides 300mg

المواد غير الفعّالة:

Macrogol 6000, Gelatin, Titanium dioxide, Yellow iron oxide, Water, Sodium laurilsulfate, Black ink

الفصيلة العلاجية: فلافونويدات حيوية (bioflavonoid)

الإستطباب:

لعلاج الأوردة الدواليّة وقُصور وريدي مزمن.

الدواء مخصص لتسكين آلام القدمين الناجمة عن خلل في تدفق الدم  
ولتخفيف وذمات (انتفاخات) في القدمين.

متى لا يجوز استعمال المستحضر؟

لا يجوز لك استعمال هذا الدواء إذا وجدت لديك حساسية لأحد  
مركباته.  
لا يجوز لك استعمال الدواء إذا كنت حاملا في الثلث الأول.

لا يجوز استعمال هذا الدواء دون استشارة الطبيب  
قبل بداية العلاج:  
إذا كنت حاملا أو مرضعة.

تحذيرات:

إذا كان لديك حساسية لغذاء أو دواء معين، عليك إبلاغ الطبيب  
بذلك قبل تناول الدواء.

التفاعلات بين الأدوية:

إذا كنت تتعاطي/ن دواء إضافيا، أو إذا أنهيت للتو العلاج بدواء  
آخر، عليك إعلام الطبيب المعالج، وذلك لتفادي الأخطار أو عدم  
النجاعة الناجمة عن التفاعلات بين الأدوية.

الأعراض الجانبية:

إضافة إلى الفعالية الطبية المرغوب فيها للدواء، فقد تظهر اثناء فترة  
استعماله بعض الأعراض الجانبية، مثل:  
نادرا : إضطراب في جهاز الهضم، غازات، إسهال، آلام بطن، عدم

ارتياح بالمعدة، صعوبات في الهضم، طفح، حكة، شرى (urticaria).

نادرا جداً: دوار، صداع، تعب، تورُّد، ردود فعل من الحساسية الزائدة، رد فعل تأقِّي، صَدْمَةٌ تَأَقِيَّةٌ (anaphylactic shock).

عادةً ما تكون الأعراض معتدلة. في حال كانت الأعراض شديدة أو استمرت لأكثر من عدة أيام، أوقف/ي العلاج وتوجه/ي فوراً للطبيب المعالج.

في حال ظهرت لديك أعراض جانبية لم تذكر في هذه النشرة ، أو إذا طرا أي تغيير على شعورك العام ، عليك عندئذ استشارة الطبيب حالاً.

### الجرعة الدوائية:

في حالة عدم وجود تعليمات أخرى من الطبيب الجرعة الدوائية الموصى بها: ٢-٣ كبسولات لليوم أثناء الوجبات.

لا يجوز تجاوز الجرعة الموصى بها.

يوصى بإكمال العلاج حتى اختفاء جميع الأعراض.

### كيفية الاستعمال:

لا يجوز المضغ! يجب بلع الدواء مع القليل من الماء.

يجب تناول الدواء مع أو بعد الوجبة.

### تجنب/ي التسمم!

يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن أيدي الأطفال و/أو الرضع وبذلك تمنع/ي التسمم.

إذا افترطت في تناول الجرعة الدوائية أو إذا بلع الطفل/ة بالخطأ من الدواء، توجه/ي إلى المستشفى حالاً، واصطحب/ي عبوة الدواء معك.

لا تسبب/ي التقيؤ دون تعليمات صريحة من الطبيب!

لا تتناول/ي الدواء في الظلام! تحقق/ي من المصق الموجود على الدواء والجرعة الدوائية في كل مرة تتناول/ين فيها الدواء. يجب وضع

النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

### التخزين:

يجب الحفظ دون ٢٥ درجة مئوية، يجب الوقاية من الرطوبة.

تبقى الأدوية صالحة لفترات محدودة فقط، حتى في ظروف التعليب/ التخزين الموصى بها. يرجى الانتباه لتاريخ إنتهاء صلاحية المستحضر!

في أي حالة شك، عليك استشارة الصيدلي الذي صرف لك هذا الدواء.

لا يجوز خزن أدوية مختلفة في نفس العبوة.

رقم تسجيل الدواء: ١١٥٩٦٢٢٩٤٦

المنتج: STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 61118 Bad-Vilbel, Germany

صاحب التسجيل: ديفريس وشركاؤه م.ض.، شارع هبرزل 32، تل-أبيب

تم تحديثها في أيار 2021.