

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ В СООТВЕТСТВИИ С ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМИ СТАНДАРТАМИ (ПРЕПАРАТЫ) – 1986

**Внимательно и полностью прочтите инструкцию
перед применением препарата.**

Формат данной инструкции установлен Министерством здравоохранения, содержание проверено и утверждено.

ЛЕМОСИН

ТАБЛЕТКИ ДЛЯ РАССАСЫВАНИЯ С ВИШНЕВЫМ / ЛИМОННЫМ ВКУСОМ

Состав:

Каждая таблетка для рассасывания содержит:

Активный компонент и его количество:

Lidocaine	1.00 mg
Tyrothricin	4.00 mg
Cetrimonium Bromide	2.00 mg

Неактивные компоненты:

Таблетки для рассасывания "Лемосин" с лимонным вкусом:

Sorbitol, Citric Acid, Talc, Lemon Flavoring, powdered, Guar Gum, Quinoline, Yellow Lake, Magnesium Stearate, Silicic Acid Colloidal, Saccharin Sodium, Green ZLT 601 Lake, Peppermint Flavoring, powdered.

Таблетки для рассасывания "Лемосин" с вишневым вкусом:

Sorbitol, Guar Gum, Citric Acid anhydrous, Talc, Polyvinylpyrrolidone, Saccharin Sodium, Magnesium Stearate, Cherry Flavoring, Iron Oxide Pigment Red.

Лекарственная группа:

Lidocaine – местный анестетик

Tyrothricin – антибактерик

Cetrimonium bromide – антисептик

Терапевтическое действие:

Для облегчения сильных болей в горле и болей связанных с инфекционными заболеваниями во рту.

Противопоказания к применению:

Противопоказано применение препарата при повышенной чувствительности к одному из его компонентов.

Предостережения:

Не принимайте данный препарат часто или на протяжении длительного времени, не проконсультирувшись с врачом.

Если у Вас повышенная чувствительность к какому-либо виду пищи или лекарственному препарату, Вы должны сообщить об этом врачу до того, как начнете принимать препарат.

Взаимодействие с другими препаратами:

Если Вы принимаете другой препарат, или если недавно закончили лечение другим лекарством, сообщите об этом лечащему врачу в целях предотвращения опасности или неэффективности лечения, связанных с взаимодействием с другими лекарствами.

Побочные эффекты:

Кроме желаемого эффекта, во время использования препарата могут возникнуть побочные эффекты.

Побочные эффекты, требующие особого внимания:

Раздражение, сыпь или местное воспаление (которых не было до начала применения лекарства) – (редко): прекратите лечение и обратитесь к врачу.

При появлении побочных эффектов, не упомянутых в данной инструкции, либо в случае изменения общего самочувствия следует немедленно обратиться к врачу.

Рекомендуемая дозировка при отсутствии других рекомендаций врача:

Легкая – средняя боль в горле: одна таблетка для рассасывания каждые 2-3 часа.

Сильная боль в горле: одна таблетка для рассасывания каждый час.

Дозировка не должна превышать 12 таблеток для рассасывания в день.

В случае если препарат пропадает вне аптеки он предназначен для взрослых и детей старше 12 лет.

Нельзя превышать рекомендуемую дозировку.

Разрешен для использования больными диабетом.

Если в течение двух дней Ваше состояние не улучшилось, следует обратиться к врачу.

При сильной или продолжительной боли в горле или при боли, сопровождающейся высокой температурой, головной болью или тошнотой и рвотой следует немедленно обратиться к врачу.

Обратите внимание:

Нельзя есть в течение часа после приема таблетки для рассасывания (анестезия может нарушить глотание или привести к прикусыванию языка).

Способ применения:

Нельзя жевать или ломать таблетку, следует медленно рассасывать ее, повторяя действие по мере необходимости.

Нельзя чистить зубы до или после приема препарата, поскольку это может снизить его эффективность.

Избегайте отравления!

Данное лекарство, как и любое другое, следует хранить в закрытом, недоступном для детей и/или младенцев месте, во избежание отравления.

Если Вы приняли большую дозу или ребенок по ошибке проглатил это лекарство, немедленно обратитесь в приемный покой больницы, захватив с собой упаковку лекарства.

Не высыпайте ровно, не получив на это четких указаний врача!

Не принимайте препарат в темноте! При каждом приеме препарата прочтите этикетку и проверьте дозировку. При необходимости пользуйтесь очками.

Хранение:

Хранить при температуре ниже 25°C и защищать от света и влажности.

Даже при соблюдении рекомендуемых правил хранения, срок хранения лекарства ограничен. Пожалуйста, обратите внимание на дату истечения срока годности препарата! При возникновении сомнений проконсультируйтесь с фармацевтом, выдавшим препарат.

Нельзя хранить разные лекарства в одной упаковке.

Регистрационный номер лекарства:

"Лемосин" с лимонным вкусом: 1178029908

"Лемосин" с вишневым вкусом: 1177929907

Изготовитель:

STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 61118 Bad-Vilbel, Germany

Владелец лицензии: «Деврис и Ко. ЛТД», ул. Хабарзель 32, Тель-Авив

Обновлено в мае 2021 года.

1817183 ILC

9299150 2012 IL (1926)