



نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة (مستحضرات) – 1986

يسوق الدواء بموجب وصفة طبيب فقط

إيميتريكس حقن

محلول للحقن 6 ملغ/0.5 ملل

كل محقنة جاهزة سلفاً ذات 0.5 ملل تحتوي:

سوماتريبتان (ك سوكسينات) 6 ملغ

Sumatriptan (as succinate) 6 mg

لقائمة المواد غير الفعالة ومولدات الحساسية في المستحضر أنظر الفقرة 6 "معلومات إضافية" والفقرة 2 "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء".

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.

وصف هذا الدواء من أجلك. لا تعطيه للآخرين. فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن حالتهم الطبية مشابهة لحالتك.

1) لأي غرض مخصص الدواء؟

إيميتريكس حقنة تحت الجلد يستعمل للتخفيف الحاد من نوبات الشقيقة، مع أو بدون هالة، وللعلاج الحاد بالصداع العنقودي (cluster headache). يجب إستعمال إيميتريكس حقن فقط عندما يكون هنالك تشخيص واضح لشقيقة أو لصداع عنقودي.

قد تحدث أعراض الشقيقة والصداع العنقودي نتيجة لتوسع مؤقت للأوعية الدموية في الرأس. إيميتريكس حقن يعتبر كخافض لتوسع تلك الأوعية الدموية. هذا الأمر بحد ذاته يساعد على تسكين الصداع والتخفيف من الأعراض الأخرى مثل الغثيان أو التقيؤ والحساسية للضوء والصوت.

الفصيلة العلاجية

مسكنات للألام: تريبتانات - من المقدرات الإنتقائية للمستقبل 5-HT₁.

2) قبل إستعمال الدواء

لا يجوز إستعمال الدواء:

- إذا كنت حساساً (أليرجي) لـ سوماتريبتان أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (المفصلة في الفقرة 6).
- إذا وجدت لديك مشكلة في القلب مثل تضيق الشرايين (مرض قلبي إقفاري) أو آلام في الصدر (ذبحة صدرية)، أو إذا حدثت لديك نوبة قلبية.
- إذا وجدت لديك مشاكل في جريان الدم في رجلتك التي تسبب لك آلام شبيهة بالثقلص أثناء المشي (مرض الأوعية الدموية المحيطية).
- إذا حدث لديك حادث دماغي أو حادث دماغي عابر (يسمى أيضاً نوبة إقفارية عابرة أو TIA).
- إذا وجد لديك ضغط دم مرتفع. من الجائز أن يكون بوسعك إستعمال إيميتريكس حقن إذا كان إرتفاع ضغط الدم لديك معتدلاً وقيد المعالجة.
- إذا وجد لديك مرض كبد حاد.

- مع أدوية أخرى للشقيقة، بما في ذلك تلك التي تحوي إرغوتامين، أو أدوية مشابهة مثل ميتيسيرجيد مالبات (methysergide maleate)؛ أو أي تريبتان أو مقلد لـ 5-HT₁ (مثل ناراتريبتان أو زولميتريبتان).
 - مع كل واحد من الأدوية المضادة للإكتئاب التالية:
 - مثبطات مونوأمين أوكسيداز (MAOIs) أو إذا تناولت MAOI في الأسبوعين الأخيرين.
- إذا كان واحد مما ذكر يخصك:
- ← بلغ طبيبك، ولا تستعمل إيميتركس حقن.

تحذيرات خاصة تتعلق باستخدام الدواء

قبل العلاج بـ إيميتركس حقن إحك للطبيب:

إذا وجدت لديك أية عوامل خطورة إضافية

- إذا كنت من المدخنين بكثرة أو تستعمل علاجاً ببدائل النيكوتين، وخاصة
- إذا كنت رجلاً تجاوز عمر 40 سنة، أو
- إذا كنت امرأة بعد سن اليأس

في حالات نادرة جداً، تطور لدى أشخاص مشاكل قلبية شديدة بعد استعمال إيميتركس حقن، على الرغم من أنه لم تكن لديهم علامات لمرض قلبي قبل ذلك. إذا كانت إحدى النقاط السابقة تخصك فمن الجائز أن تكون معرضاً لخطورة أكبر لتطويع مرض قلبي - لذلك:

← بلغ طبيبك ليتمكن من فحص وظيفة قلبك قبل أن يصف لك إيميتركس حقن.

إذا وجدت لديك سابقة لحدوث نوبات (إختلاجات)

أو إذا كانت لديك حالات أخرى قد تزيد من احتمال حدوث نوبة لديك - مثلاً، إصابة في الرأس أو الإدمان على الكحول:

← بلغ طبيبك لكي تكون تحت مراقبة حثيئة أكثر.

إذا كان لديك ضغط دم مرتفع، فمن الجائز أن إيميتركس حقن غير مناسب لك

← بلغ الطبيب أو الصيدلي الخاص بك قبل استعمال إيميتركس حقن.

إذا كان لديك مرض في الكبد أو في الكلية

إذا كان واحد مما ذكر يخصك:

← بلغ الطبيب أو الصيدلي الخاص بك قبل استعمال إيميتركس حقن.

إذا كنت حساساً لمضادات حيوية تسمى سولفوناميدات

إذا كنت حساساً، فمن الجائز أن تكون حساساً أيضاً لـ إيميتركس حقن. إذا كنت تعلم بأنك حساساً لمضاد حيوي ولكنك غير واثق من أنه سولفوناميد:

← بلغ الطبيب أو الصيدلي الخاص بك، قبل استعمال إيميتركس حقن.

إذا كنت تتناول أدوية مضادة للإكتئاب المسماة SSRIs

(مثبطات إنتقائية لإعادة إمتصاص السيروتونين) أو SNRIs (مثبطات إعادة إمتصاص سيروتونين

ونورأدرينالين) أو TCAs (مضادات الإكتئاب ثلاثية الحلقة)

← بلغ الطبيب أو الصيدلي الخاص بك، قبل استعمال إيميتركس حقن. أنظر أيضاً "التداخلات/التفاعلات بين الأدوية" في السياق.

قد تحتوي محقنة إيميتركس حقن على لثي (لاتكس)

واقى الإبرة الذي على المحقنة قد يحتوي على لاتكس.

← إحك لطبيبك إذا كنت حساساً للاتكس.

إذا كنت تستعمل إيميتركس حقن في أوقات متقاربة

إن تكرر استعمال إيميتركس حقن الزائد عن الحد قد يفاقم الصداع لديك.

← بلغ طبيبك إذا كان هذا الأمر يخصك. من شأن طبيبك أن يوصيك بالتوقف عن إستعمال إيميتركس حقن.

إذا كنت تشعر بألم أو بضغط في صدرك بعد إستعمالك لـ إيميتركس حقن تلك الأعراض قد تكون شديدة ولكنها عادة ما تزول بسرعة. إذا لم تزول بسرعة، أو إذا تفاقمت:
← توجه حالاً لتلقي مساعدة طبية. تحتوي الفقرة 4 (تظهر لاحقاً) على معلومات إضافية عن تلك الأعراض الجانبية المحتملة.

التداخلات/التفاعلات بين الأدوية:

هناك أدوية ممنوع تناولها مع إيميتركس حقن، وأخرى قد تسبب أعراضاً جانبية إذا تم تناولها مع إيميتركس حقن.

إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخراً، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إحك للطبيب أو الصيدلي عن ذلك. بالأخص إذا كنت تتناول:

- إرغوتامين الذي يستعمل أيضاً لعلاج الشقيقة، أو أدوية مشابهة مثل ميتيسيرجيد (أنظر الفقرة 2 "لايجوز إستعمال الدواء"). لا تستعمل إيميتركس حقن بنفس الوقت مع هذه الأدوية. توقف عن تناول هذه الأدوية قبل 24 ساعة على الأقل من إستعمال إيميتركس حقن. لا تتناول ثانية أي دواء يحوي إرغوتامين أو مركبات مشابهة لإرغوتامين بعد 6 ساعات على الأقل من إستعمال إيميتركس حقن.
- مستحضرات تريبتان/مقلدات المستقبل 5-HT₁ الأخرى (مثل ناراتريبتان، ريزاتريبتان، زولميتريبتان)، المستعملة أيضاً لعلاج الشقيقة (أنظر الفقرة 2 "لايجوز إستعمال الدواء"). لا تستعمل إيميتركس حقن في نفس الوقت مع هذه الأدوية. توقف عن تناول هذه الأدوية قبل 24 ساعة على الأقل من إستعمال إيميتركس حقن. لا تتناول مستحضر تريبتان/مقلد للمستقبل 5-HT₁ إضافي بعد 24 ساعة على الأقل من إستعمال إيميتركس حقن.
- أدوية MAOIs المستعملة لعلاج الإكتئاب. إذا تناولتها في الأسبوعين الأخيرين فلا تستعمل إيميتركس حقن.
- أدوية SSRI، SNRI، و- TCAs (مضادات الإكتئاب ثلاثية الحلقة) المستعملة لعلاج الإكتئاب. إن إستعمال إيميتركس حقن مع هذه الأدوية يمكن أن يسبب متلازمة السيروتونين (مجموعة أعراض التي يمكن أن تشمل قلة راحة، إرتباك، تعرق، هذيان، زيادة المنعكسات، تقلصات عضلية، قشعريرة، زيادة النبض ورجفة). بلغ طبيبك حالاً إذا تأثرت على هذا النحو.
- هيبيريكوم بيرفوراتوروم (St. John's Wort). إن تناول أدوية نباتية الحاوية على هيبيريكوم أثناء إستعمالك لـ إيميتركس حقن قد يزيد من إحتمال حدوث أعراض جانبية.

الحمل، الإرضاع والخصوبة

- إذا كنت في فترة الحمل، تعتقدين بأنه من الجائز أنك حامل أو تخططين للحمل، إستشيري الطبيب قبل إستعمال الدواء. هناك معلومات محدودة فقط حول سلامة إيميتركس حقن لدى النساء الحوامل، على الرغم من أنه لا يوجد حتى الآن أي دليل على حصول أية زيادة في الخطورة لحدوث عيوب خلقية. يناقشك طبيبك فيما إذا كنت بحاجة أو لست بحاجة لإستعمال إيميتركس حقن عندما تكونين حاملاً.
- لا ترضعي طفلك لمدة 12 ساعة بعد إستعمال إيميتركس حقن. إذا كنت تسحبين الحليب خلال هذه الفترة، إرمي الحليب ولا تعطيه لرضيعك.

السياقة وإستعمال الماكينات

قد يسبب لك دواءك أو أعراض الشقيقة الميل إلى النوم. في حال تأثرك، فلا تقم بقيادة مركبة أو تشغيل الماكينات.

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء

- الصوديوم: يحتوي هذا الدواء على أقل من 1 ميليمول صوديوم (23 ملغ) في المحقنة، لذا يعتبر بجوهره "خال من الصوديوم".

3) كيفية استعمال الدواء؟

يجب دائماً استعمال المستحضر حسب تعليمات الطبيب.
عليك الإستيضاح من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن واثقاً بخصوص المقدار الدوائي وطريقة العلاج بالمستحضر.

إيميتريكس حقن عادةً ما يحقن في الفخذ.
إيميتريكس حقن مخصص للحقن تحت الجلد. لا يجوز بأي حال من الأحوال حقن إيميتريكس حقن داخل الوريد.
هناك دليل مرحلة - تلو - الأخرى لإستعمال إيميتريكس حقن في نهاية هذه النشرة (أنظر الفقرة 7).

متى يجب إستعمال إيميتريكس حقن

- يفضل إستعمال إيميتريكس حقن في اللحظة التي تشعر فيها ببداية حدوث الشقيقة أو الصداع العنقودي (cluster headache)، رغم أنه يمكن إستعماله في أي وقت خلال النوبة.
 - لا يجوز إستعمال إيميتريكس حقن لمحاولة منع النوبة - يجب إستعماله فقط بعد بدء أعراض الشقيقة لديك.
- المقدار الدوائي وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط. المقدار الدوائي الإعتيادي هو عادة:

لكبار بأعمار 18 حتى 65

- المقدار الدوائي الإعتيادي لكبار بأعمار 18 حتى 65 يعانون من شقيقة أو صداع عنقودي هو حقنة واحدة ذات 6 ملغ.

الأطفال دون عمر 18

- إيميتريكس حقن غير مخصص للإستعمال لدى أطفال دون عمر 18 سنة.

بالغين (فوق عمر 65)

- إيميتريكس حقن غير مخصص للإستعمال لدى بالغين فوق عمر 65.

لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به.

في حال تجدد الأعراض لديك

- يمكنك إستعمال حقنة أخرى من إيميتريكس حقن إذا مرّت ساعة واحدة على الأقل من الحقنة الأولى، ولكن لا تستعمل أكثر من حقتين خلال 24 ساعة.

إذا لم تؤثر الحقنة الأولى

- لا تستعمل حقنة جديدة أو أي مستحضر آخر من إيميتريكس لنفس النوبة.

إذا لم يخف إيميتريكس حقن من الشقيقة لديك أبداً:

← راجع الطبيب أو الصيدلي الخاص بك للإستشارة.

إذا كنت تستعمل إيميتريكس حقن أكثر مما تحتاج

- لا تستعمل أكثر من حقتين من إيميتريكس خلال 24 ساعة.

إن إستعمال أكثر من اللازم من إيميتريكس حقن يمكن أن يسبب لك المرض. إذا إستعملت أكثر من حقتين خلال 24 ساعة:

← راجع طبيبك للإستشارة.

إذا إستعملت مقداراً دوائياً مفرطاً أو إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء، توجه حالاً إلى الطبيب أو إلى غرفة

الطوارئ في المستشفى وأحضر علبه الدواء معك.

إذا نسيت إستعمال هذا الدواء في الوقت المخصص، فلا تستعمل مقداراً دوائياً مضاعفاً. إستعمل المقدار الدوائي التالي في الموعد الإعتيادي وإستشر الطبيب.

يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب.

لا يجوز تناول الأدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

4) الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال إيميتريكس حقن قد يسبب أعراضاً جانبية عند بعض المستعملين. لا تندهش من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني أياً منها. بعض الأعراض قد تحدث نتيجة الشقيقة ذاتها.

رد فعل تحسسي: توجه حالاً إلى الطبيب لتلقي مساعدة

لقد حدثت الأعراض الجانبية التالية ولكن شيوها الدقيق غير معروف.

- علامات الحساسية تشمل طفح، شرى (طفح حاك)؛ صفير؛ إنتفاخ الجفنين، الوجه أو الشفتين؛ إنهيار تام للأجهزة.

إذا حدث لديك واحد من تلك الأعراض بعد وقت قصير من إستعمال إيميتريكس حقن:

← لا تستعمل الدواء ثانية. توجه حالاً إلى الطبيب.

أعراض جانبية شائعة جداً (تظهر لدى أكثر من مستعمل واحد من بين 10)

- ألم مؤقت في مكان الحقن
- شعور بحرقة أو حرق، إجمرار، إنتفاخ، كدمة ونزف في مكان الحقن.

أعراض جانبية شائعة (تظهر لدى حتى 1 من بين 10 مستعملين)

- ألم، ثقل، ضغط أو توتر في الصدر، في الحنجرة أو في أجزاء أخرى من الجسم، أو شعور غير عادي، الذي يشمل خدر، وخز وسخونة أو برودة. تلك الأعراض قد تكون شديدة ولكنها عادة ما تزول بسرعة.

إذا إستمرت أو تفاقت تلك الأعراض (خاصة الألم في الصدر):

← يجب أن تتلقى مساعدة طبية عاجلة. يمكن أن تحدث تلك الأعراض لدى عدد قليل جداً من الأشخاص نتيجة نوبة قلبية.

أعراض جانبية شائعة أخرى تشمل:

- غثيان أو تقيؤ، رغم أن هذا الأمر قد يحدث جراء الشقيقة نفسها
- إرهاق أو نعاس
- دوار، الشعور بضعف، أو هبات من الحر
- إرتفاع مؤقت بضغط الدم
- ضيق في التنفس
- آلام عضلية.

أعراض جانبية نادرة جداً (تظهر لدى حتى 1 من بين 10,000 مستعمل)

- تغيرات في الأداء الوظيفي للكبد. إذا كان لديك فحص دم لفحص وظيفة كبدك، بلغ طبيبك بأنك تستعمل إيميتريكس حقن.

قد يقاسي بعض المتعالجين من الأعراض الجانبية التالية لكن لا يعرف بأي وتيرة تحدث

- إختلاجات/نوبات، رجفان، تقلص عضلي، تصلب مؤخرة الرقبة
- إضطرابات في الرؤية مثل وميض، تدني الرؤية، إزدواجية الرؤية، فقدان الرؤية، لا بل قد يحدث في حالات معينة خلل غير عكوس في الرؤية (رغم أن هذه قد تحدث بسبب نوبة الشقيقة نفسها)
- مشاكل قلبية، قد يصبح فيها نبضك أسرع، أبطأ أو يتغير النظم، آلام في الصدر (نبحة صدرية) أو نوبة قلبية
- جلد شاحب، بلون مائل للأزرق و/أو ألم في الأصابع، في أصابع القدم، في الأذنين، في الأنف أو في الفك
- لديك كرد فعل للبرودة أو التوتر (ظاهرة رينو)
- الشعور بإغماء (قد ينخفض ضغط الدم)
- ألم في الجانب الأيسر السفلي من البطن وإسهال دموي (إلتهاب القولون الإقفاري)
- إسهال

- إذا حدثت لديك مؤخرًا إصابة أو إذا وجد لديك إلتهاب (مثل الروماتيزم أو إلتهاب في الأمعاء الغليظة) فقد تقاسي من ألم أو تفاقم للألم في مكان الإصابة أو الإلتهاب.
- ألم في المفاصل
- الشعور بقلق
- صعوبة في البلع
- تعرق مفرط.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقت إحدى الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il/>

5) كيفية تخزين الدواء؟

- تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العلبة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- يوصى بأن تحمل إيميتركس حقن معك تحسباً لحدوث نوبة شقيقة.
- إحفظ دائماً الحقن التابعة لك في العلبة التي رُودت بها، لحمايتها من الضوء. يجب التخزين دون 30 درجة مئوية.
- لا يجوز رمي الأدوية إلى المجاري أو في القمامة المنزلية. إستشر الطبيب أو الصيدلي عن كيفية التخلص بشكل آمن من عبوة الخرطوشة الفارغة.

6) معلومات إضافية

يحتوي الدواء بالإضافة للمادة الفعالة أيضاً -

Sodium Chloride

Water for Injection

- كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة
- كل عبوة علاج لـ إيميتركس حقن تتوفر بكاملها مع أداة للحقن (قلم) وعبوة خرطوشة تحوي محقنتين جاهزتين سلفاً. كل محقنة جاهزة سلفاً هي للإستعمال لمرة واحدة.
- صاحب الإمتياز والمستورد: چلاكسو سميثكلين (إسرائيل) م.ض.، شارع بازل 25، بيتخ تكفا.
- المنتج: چلاكسو أوبيرايشنس (إنكلترا) م.ض.، برنارد كاسل، إنكلترا.
- تم إعدادها في كانون الأول 2020 بموجب تعليمات وزارة الصحة.
- رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: 055-92-26920.
- من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.

العلامات التجارية هي بملكية أو بإمتياز مجموعة شركات GSK.

©2021 مجموعة شركات GSK أو صاحب الإمتياز الخاص بها.

7) دليل مرحلة - تلو - الأخرى لإستعمال عُدّة إيميتركس حقن الخاصة بك

تبين لك هذه النشرة كيفية شحن قلم الحقن وكيفية إستعماله بغية إعطاء مقدار دوائي من دواء إيميتركس حقن.


الرجاء قراءة هذه النشرة قبل إستعمال عِدّة الحقن.

عُدّة إيميتركس حقن الخاصة بشركة جلاكسوسميثكلابن مخصصة للإستعمال مع الدواء إيميتركس حقن.

كل عِدّة الحقن تتوفر بأكملها مع إيميتركس علبه خرطوشة.

تحوي علبه الخرطوشة محقنتين جاهزتين سلفاً.

إحفظ بعيداً عن مجال رؤية ومتناول أيدي الأطفال.



كيفية إعطاء حقنة عن طريق إستعمال قلم إيميتركس حقن

- إقرأ النشرة بأكملها بتمعن قبل إستعمال قلم حقن إيميتركس حقن.
- كل عِدّة الحقن لـ إيميتركس حقن تتوفر بأكملها مع علبه خرطوشة تحوي محقنتين جاهزتين سلفاً مع إيميتركس حقن.
- كل محقنة جاهزة سلفاً هي للإستعمال لمرة واحدة.
- إستعن بالصورة أعلاه للتعرف على الأجزاء المختلفة لعدة الحقن.
- لا تشحن القلم حتى تكون جاهزاً لإعطاء الحقنة.

1 إرفع وإفتح غطاء العلبه الحاملة.



2 مَزَق الختم الأحمر لإحدى المحاقن. إفتح الغطاء الأزرق تحت الختم.

3 أخرج قلم الحقن لـ إيميتريكس حقن من العلبة الحاملة. إحصص بأن القضيب الأبيض لا يبرز خارجاً بما يتجاوز طرف القلم (أنظر الصورة في الفقرة 11 في هذا الدليل).
إذا كان يبرز نحو الخارج، ضع القلم ثانية داخل العلبة الحاملة، إدفعه بقوة بحيث يجب أن يدخل القضيب لمكانه وسماع صوت طقة.
الآن، القلم جاهز للإستعمال.



4 إدفع قلم الحقن لـ إيميتريكس حقن بقوة داخل علبة الخرطوشة المفتوحة ولوليه بلطف بإتجاه عقارب الساعة (نصف دورة تقريباً) إلى حين عدم دورانه ثانية.



5 إحفظ إصبعك بعيداً عن زر التحرير (زر الحقن) الأزرق وإسحب قلم الحقن لـ إيميتريكس حقن خارج علبة الخرطوشة. من الجائز أن تضطر للسحب بقوة كافية من أجل عمل ذلك. هناك ماسكة أمان تمنع حقن خاطئ إلى أن تكون جاهزاً.



6 الآن يكون القلم المشحون جاهزاً للإستعمال الفوري.

لا تحاول إعادة القلم المشحون لداخل العلبة الحاملة إلا بعد إستعمالك للحقنة فقط، وإلا فقد يحصل عطب للإبرة كما أن القلم لن يحقن كما ينبغي.

7 إضغط القلم ذو الطرف الأزرق المطاول بقوة في مكان جلد نظيف - في الجانب الخارجي للفخذ غالباً (كما في الصورة) - بحيث ينزلق القسم الرمادي نحو الأسفل ويغطي قسم من الطرف الأزرق. هذا الأمر يحرر ماسكة الأمان.



8 إمسك القلم بقوة وإضغط على زر الحقن الأزرق في الطرف العلوي لقلم الحقن ل- إيميتريكس حقن. عد ببطء حتى 10 من خلال المحافظة على قلم الحقن إيميتريكس حقن ثابتاً جداً وزر الحقن مضغوطاً. لا تخرج القلم من الجلد مبكراً جداً لنلا يهدر قسم من الحقنة. بعد ذلك أخرج القلم وإحذر عدم لمس طرف الإبرة.

9 أعد المحقنة المستعملة للمكان الفارغ في علبة الخرطوشة حالاً.



10 إدفع القلم نحو الأسفل داخل علبة الخرطوشة ما أمكن، لولب القلم نحو الخارج عن طريق التدوير ضد إتجاه عقارب الساعة (نصف دورة تقريباً) إلى أن يخرج.



11 أخرج قلم الحقن لـ إيميتركس حقن من داخل علبة الخرطوشة.
إغلق الغطاء الأزرق على المحقنة المستعملة.



12 أدخل قلم الحقن لـ إيميتركس حقن ثانيةً للعلبة الحاملة وإدفعه نحو الأسفل حتى يثبت في مكانه. فهو يُسمع طقة عند عودته لمكانه.
قلم الحقن لـ إيميتركس حقن يكون جاهزاً للإستعمال حينئذٍ للمرة القادمة.



13 أغلق غطاء العلبة الحاملة إلى حين إضطرارك إستعمال المحقنة التالية.

Imi Inj PT v5A