



עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו - 1986
התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

אימיטרקס זריקות

תמיסה להזרקה 6 מ"ג/0.5 מ"ל
כל מזרק מוכן מראש של 0.5 מ"ל מכיל:
סומאטריפטאן (כ-סוקצינט) 6 מ"ג
Sumatriptan (as succinate) 6 mg

לרשימת החומרים הבלתי פעילים ואלרגנים בתכשיר ראה סעיף 6 "מידע נוסף" ובסעיף 2 "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה".

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

תרופה זו נרשמה עבורך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

1. למה מיועדת התרופה?

אימיטרקס זריקה תת-עורית משמשת להקלה אקוטית בהתקפי מיגרנה, עם או בלי אאורה, ולטיפול אקוטי בכאב ראש מקבצי (cluster headache). יש להשתמש באימיטרקס זריקות רק כאשר ישנה אבחנה ברורה של מיגרנה או של כאב ראש מקבצי.

תסמיני מיגרנה וכאב ראש מקבצי עלולים להגרם על-ידי התרחבות זמנית של כלי דם בראש. אימיטרקס זריקות נחשבת כמפחיתה את ההתרחבות של כלי דם אלה. זה כשלעצמו מסייע לשכך את כאב הראש ולהקל על תסמינים אחרים כגון בחילה או הקאה ורגישות לאור ולקול.

קבוצה תרפויטית

משככי כאבים: טריפטנים - אגוניסטים סלקטיביים לקולטן $5-HT_1$.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה:

- **אם אתה רגיש (אלרגי) לסומאטריפטאן או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (מפורטים בסעיף 6).**
- **אם יש לך בעיית לב** כגון היצרות של העורקים (מחלת לב איסכמית) או כאבים בחזה (תעוקת חזה), או אם היה לך התקף לב.
- **אם יש לך בעיות בזרימת הדם ברגליך** אשר גורמות לכאבים דמויי התכווצות בזמן שאתה הולך (מחלת כלי דם היקפיים).
- **אם היה לך ארוע מוחי או ארוע מוחי חולף (מכונה גם התקף איסכמי חולף או TIA).**
- **אם יש לך לחץ דם גבוה.** יתכן ותוכל להשתמש באימיטרקס זריקות אם לחץ הדם הגבוה שלך הוא מתון ומטופל.
- **אם יש לך מחלת כבד חריפה.**

- **עם תרופות אחרות למיגרנה**, כולל אלו המכילות ארגוטאמין, או תרופות דומות כגון מתיסרגיד מלאט (methysergide maleate); או כל טריפטן או אגוניסט ל- 5-HT₁ (כגון נאראטריפטאן או זולמיטריפטאן).
 - **עם כל אחת מהתרופות נוגדות דיכאון הבאות:**
 - **מעכבי מונואמין אוקסידאז (MAOIs)** או אם לקחת MAOI בשבועיים האחרונים.
- אם אחד מאלה מתייחס אליך:
← **ספר לרופא שלך, ואל תשתמש באימיטרקס זריקות.**

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה לפני הטיפול באימיטרקס זריקות ספר לרופא:

- אם יש לך גורמי סיכון נוספים כלשהם
 - **אם הנך מעשן כבד או משתמש בטיפול בתחליפי ניקוטין**, ובמיוחד
 - **אם הנך גבר מעל גיל 40, או**
 - **אם הינך אישה לאחר גיל המעבר**
- במקרים נדירים מאוד, אנשים פיתחו בעיות לב חריפות לאחר שימוש באימיטרקס זריקות, אף על פי שלא היו להם סימנים של מחלת לב לפני. אם אחת מהנקודות מעלה מתייחסת אליך יתכן שיש לך סיכון גדול יותר לפתח מחלת לב - לכן:
- ← **ספר לרופא שלך** כדי שתפקוד הלב שלך יוכל להבדק לפני שאימיטרקס זריקות נרשמת עבורך.

אם יש לך היסטוריה של התקפים (פרכוסים)
או אם יש לך מצבים אחרים אשר עלולים להגביר את הסיכוי שיהיה לך התקף - לדוגמה, פגיעת ראש או אלכוהוליסם:

← **ספר לרופא שלך כדי שתוכל להיות תחת השגחה הדוקה יותר.**

אם היה לך לחץ דם גבוה, יתכן ואימיטרקס זריקות אינה מתאימה לך
← **ספר לרופא או לרוקח שלך לפני השימוש באימיטרקס זריקות.**

אם יש לך מחלת כבד או כליה
אם אחד מאלה מתייחס אליך:
← **ספר לרופא או לרוקח שלך לפני השימוש באימיטרקס זריקות.**

אם אתה אלרגי לאנטיביוטיקות הנקראות סולפונאמידים
אם כך, יתכן שתהיה אלרגי גם לאימיטרקס זריקות. אם אתה יודע שאתה אלרגי לאנטיביוטיקה אך אינך בטוח אם היא סולפונאמיד:
← **ספר לרופא או לרוקח שלך, לפני השימוש באימיטרקס זריקות.**

אם אתה לוקח תרופות נוגדות דיכאון הנקראות SSRIs
(מעכבים סלקטיביים של ספיגה חוזרת של סרוטונין) או SNRIs (מעכבי ספיגה חוזרת של סרוטונין ונוראדרנלין) או TCAs (נוגדי דיכאון טריציקליים)
← **ספר לרופא או לרוקח שלך לפני השימוש באימיטרקס זריקות.** ראה גם "אינטראקציות/תגובות בין תרופתיות" להלן.

המזרק של אימיטרקס זריקות עלול להכיל צמג (לטקס)

מגן המחט שעל המזרק עלול להכיל צמג.
← **ספר לרופא שלך אם אתה אלרגי לצמג.**

אם אתה משתמש באימיטרקס זריקות לעיתים קרובות
שימוש תכוף מדי באימיטרקס זריקות עלול להחמיר את כאבי הראש שלך.
← **ספר לרופא שלך אם זה מתייחס אליך.** הרופא שלך עשוי להמליץ לך להפסיק להשתמש באימיטרקס זריקות.

אם אתה חש כאב או לחץ בחזה שלך אחרי שאתה משתמש באימיטרקס זריקות
תופעות אלה עלולות להיות עזות אך הן בדרך כלל חולפות במהירות. אם אינן חולפות במהירות, או שהן מחמירות:
← **פנה מיד לקבלת עזרה רפואית.** סעיף 4 (מופיע בהמשך) כולל מידע נוסף על תופעות לוואי אפשריות אלה.

אינטראקציות/תגובות בין תרופתיות:
ישנן תרופות שאסור לקחת עם אימיטרקס זריקות, ואחרות עלולות לגרום לתופעות לוואי אם הן נלקחות עם אימיטרקס זריקות.

אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. במיוחד אם אתה לוקח:

- **ארגוטאמין** שגם משמשת לטיפול **במיגרנה**, או תרופות דומות כגון מתיסרגיד (ראה סעיף 2 "אין להשתמש בתרופה"). אל תשתמש באימיטרקס זריקות באותו הזמן עם תרופות אלה. הפסק לקחת תרופות אלה לפחות 24 שעות לפני השימוש באימיטרקס זריקות. אל תקח שוב כל תרופה המכילה ארגוטאמין או מרכיבים הדומים לארגוטאמין לפחות 6 שעות לאחר השימוש באימיטרקס זריקות.
- **טריפטנים/אגוניסטים לקולטן 5-HT₁ אחרים** (כגון נאראטרפטאן, ריזאטרפטאן, זולמיטרפטאן), המשמשים גם לטיפול **במיגרנה** (ראה סעיף 2 "אין להשתמש בתרופה"). אל תשתמש באימיטרקס זריקות באותו הזמן עם תרופות אלה. הפסק לקחת תרופות אלה לפחות 24 שעות לפני השימוש באימיטרקס זריקות. אל תקח טריפטן/אגוניסט לקולטן 5-HT₁ נוסף לפחות 24 שעות לאחר השימוש באימיטרקס זריקות.
- **תרופות MAOIs** המשמשות לטיפול **בדיכאון**. אם לקחת אותן בשבועיים האחרונים אל תשתמש באימיטרקס זריקות.
- **תרופות SSRIs, SNRIs ו-TCAs (נוגדי דיכאון טריציקליים)** המשמשות לטיפול **בדיכאון**. שימוש באימיטרקס זריקות עם תרופות אלה יכול לגרום לתסמונת סרוטונין (אוסף של תסמינים שיכולים לכלול חוסר מנוחה, בלבול, הזעה, הזיות, רפלקסים מוגברים, התכווצויות שרירים, צמרמורת, עלייה בדופק ורעד). ספר לרופא שלך מיידית אם אתה מושפע באופן זה.
- **היפריקום פרפורטום** (St. John's Wort) נטילת תרופות צמחיות המכילות **היפריקום** בעת שימוש באימיטרקס זריקות עלולה להעלות את הסבירות לתופעות לוואי.

הריון, הנקה ופוריות

- **אם הינך בהריון, חושבת שיתכן שהינך בהריון או מתכננת להרות,** היוועצי ברופא לפני השימוש בתרופה. יש מידע מוגבל בלבד על הבטיחות של אימיטרקס זריקות בנשים בהריון, אם כי עד כה אין ראיה לעלייה כלשהי בסיכון למומים מולדים. הרופא שלך ידון איתך האם את צריכה או לא צריכה להשתמש באימיטרקס זריקות כשאת בהריון.
- **אל תניקי את תינוקך במשך 12 שעות לאחר השימוש באימיטרקס זריקות.** אם את שואבת חלב במהלך זמן זה, השליכי את החלב ואל תתני אותו לתינוקך.

נהיגה ושימוש במכוונות

התרופה שלך או תסמיני המיגרנה עלולים לגרום לך לנמנום. **אם אתה מושפע, אל תנהג או תפעיל מכוונות.**

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

- **נתרן:** תרופה זו מכילה פחות מ- 1 מילימול נתרן (23 מ"ג) במזרק, לכן נחשבת במהותה "נטולת נתרן".

3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר. אימיטרקס זריקות בדרך כלל מוזרקת לירך. אימיטרקס זריקות מיועדת להזרקה תת-עורית. בשום מקרה אין להזריק אימיטרקס זריקות לתוך הווריד.

קיים מדריך שלב-אחר-שלב לשימוש באימיטרקס זריקות בסוף עלון זה (ראה סעיף 7).

מתי להשתמש באימיטרקס זריקות

- עדיף להשתמש באימיטרקס זריקות **ברגע שאתה מרגיש שמיגרנה או כאב ראש מקבצי (cluster headache) מתחילים**, אם כי אתה יכול להשתמש בה בכל זמן במהלך התקף.
- **אין להשתמש באימיטרקס זריקות** כדי לנסות למנוע התקף - השתמש בה רק לאחר שתסמיני המיגרנה שלך מתחילים.

המינון ואופן הטיפול יקבעו על-ידי הרופא בלבד. המינון המקובל בדרך כלל הוא:

מבוגרים בגיל 18 עד 65

- **המינון המקובל למבוגרים בגיל 18 עד 65** עם מיגרנה או כאב ראש מקבצי הוא זריקה אחת של 6 מ"ג.

ילדים מתחת לגיל 18

- **אימיטרקס זריקות** אינה מיועדת לשימוש בילדים מתחת לגיל 18 שנים.

מבוגרים (מעל גיל 65)

- **אימיטרקס זריקות** אינה מיועדת לשימוש במבוגרים מעל גיל 65.

אין לעבור על המנה המומלצת.

אם התסמינים שלך מתחילים לחזור

- אתה יכול להשתמש בזריקה שנייה של אימיטרקס זריקות אם חלפה לפחות שעה אחת מהזריקה הראשונה, אך **אל תשתמש ביותר משתי זריקות ב- 24 שעות**.

אם לזריקה הראשונה לא הייתה השפעה

- **אל תשתמש בזריקה חדשה** או בכל תכשיר אימיטרקס אחר לאותו התקף.

אם אימיטרקס זריקות לא הקלה עליך כלל:

← **פנה לרופא או לרוקח שלך לקבלת ייעוץ.**

אם אתה משתמש ביותר אימיטרקס זריקות ממה שאתה צריך

- **אל תשתמש ביותר משתי זריקות אימיטרקס ב- 24 שעות**. שימוש רב מדי באימיטרקס זריקות יכול לגרום לך לחלות. אם השתמשת ביותר משתי זריקות ב- 24 שעות:

← **פנה לרופא שלך לקבלת ייעוץ.**

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך.

אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן המיועד, אין ליטול מנה כפולה. קח את המנה הבאה בזמן הרגיל והיוועץ ברופא.

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על-ידי הרופא.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהנך לוקח תרופה. הרכב משקפיים אם הנך זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש באימיטרקס זריקות עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. יתכן ולא תסבול מאף אחת מהן. חלק מהתסמינים עלולים להגרם על-ידי המיגרנה עצמה.

תגובה אלרגית: פנה מיד לרופא לקבלת עזרה

תופעות הלוואי הבאות התרחשו אך שכיחותן המדויקת אינה ידועה.

• **סימני האלרגיה כוללים פריחה, חרלת (פריחה מגרדת); צפצופים; עפעפיים, פנים או שפתיים נפוחים; קריסת מערכות מוחלטת.**

אם אתה מקבל אחד מתסמינים אלה זמן קצר לאחר השימוש באימיטרקס זריקות:
← **אל תשתמש יותר. פנה מיד לרופא.**

תופעות לוואי שכיחות מאוד (מופיעות ביותר ממשתמש אחד מתוך 10)

- כאב זמני במקום ההזרקה
- תחושת צריבה או שריפה, אדמומיות, נפיחות, חבלה ודימום במקום ההזרקה.

תופעות לוואי שכיחות (מופיעות ב-עד 1 מתוך 10 משתמשים)

- כאב, כבדות, לחץ או מתח בחזה, בגרון או בחלקים אחרים של הגוף, או תחושות לא רגילות, הכוללות חוסר תחושה, עקצוץ וחום או קור. תופעות אלה עלולות להיות עזות אך בדרך כלל חולפות במהירות.

אם תופעות אלה ממשיכות או מחריפות (במיוחד הכאב בחזה):

← **קבל עזרה רפואית בדחיפות.** במספר קטן מאוד של אנשים תסמינים אלה יכולים להגרם על-ידי התקף לב.

תופעות לוואי שכיחות אחרות כוללות:

- בחילה או הקאה, אם כי זה עלול להיות עקב המיגרנה עצמה
- עייפות או נמנום
- סחרחורת, תחושת חולשה, או גלי חום
- עלייה זמנית בלחץ דם
- קוצר נשימה
- שרירים כואבים.

תופעות לוואי נדירות מאוד (מופיעות ב-עד 1 מתוך 10,000 משתמשים)

- שינויים בתפקוד הכבד. אם יש לך בדיקת דם לבדיקת תפקוד הכבד שלך, ספר לרופא שלך שאתה משתמש באימיטרקס זריקות.

חלק מהמטופלים עלולים לחוות את תופעות הלוואי הבאות אך לא ידוע באיזו תדירות הן מתרחשות

- פרכוסים/התקפים, רעידות, התכווצות שרירים, קשיון עורף

- הפרעות ראייה כגון הבהוב, ירידה בראייה, ראייה כפולה, אובדן ראייה, ובמקרים מסוימים אפילו ליקויים בלתי הפיכים בראייה (אם כי אלה עלולים להיות בגלל התקף המיגרנה עצמו)
- בעיות לב, בהן הדופק שלך עלול להיות מהיר יותר, איטי יותר או לשנות קצב, כאבים בחזה (תעוקת חזה) או התקף לב
- עור חיור, בגוון כחלחל ו/או כאב באצבעות, בבהונות, באוזניים, באף או בלסת שלך בתגובה לקור או למתח (תופעת ריינו)
- תחושת עילפון (לחץ הדם עלול לרדת)
- כאב בצד השמאלי התחתון של הבטן ושלשול דמי (דלקת איסכמית של המעי הגס)
- שלשול
- אם הייתה לך לאחרונה פציעה או אם יש לך דלקת (כמו שיגרון או דלקת במעי הגס) אתה עלול לחוות כאב או החמרת כאב במקום הפציעה או הדלקת.
- כאב במפרקים
- תחושת חרדה
- קושי בבליעה
- הזעת יתר.

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור:

<https://sideeffects.health.gov.il/>

5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל-ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
- מומלץ לשאת אימיטרקס זריקות איתך למקרה של התקף מיגרנה.
- שמור תמיד את הזריקות שלך באריזה שסופקה, כדי להגן עליהן מפני אור. אחסן מתחת ל-30°C.
- אל תשליך תרופות לביוב או לפסולת הביתית. התייעץ עם הרופא או הרוקח כיצד להיפטר מאריזת המחסנית הריקה בצורה בטיחותית.

6. מידע נוסף

- נוסף על המרכיב הפעיל התרופה מכילה גם -
- Sodium Chloride
- Water for Injection
- כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה
- כל אריזת טיפול של אימיטרקס זריקות מגיעה במלואה עם אביזר הזרק (עט) ואריזת מחסנית המכילה שני מזרקים מוכנים מראש. כל מזרק מוכן מראש הוא לשימוש חד-פעמי.
- בעל הרישום והיבואן: גלקסוסמיתקליין (ישראל) בע"מ, רח' בזל 25, פתח תקוה.

- יצרן: גלקסו אופריישנס (אנגליה) בע"מ, ברנרד קאסל, אנגליה.
 - נערך בדצמבר 2020 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.
 - מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 055-92-26920.
 - לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.
- סימני מסחר הינם בבעלות או בזכיונות של קבוצת החברות של GSK.
- © 2021 קבוצת החברות של GSK או הזכיון שלה.


7. מדריך שלב-אחר-שלב לשימוש במערכת אימיטרקס זריקות שלך

עלון זה מראה לך כיצד להטעין את עט ההזרקה וכיצד להשתמש בו כדי לתת מנה של תרופת אימיטרקס זריקות.

קרא בבקשה עלון זה לפני שימוש במערכת ההזרקה.

מערכת אימיטרקס זריקות של חברת גלקסוסמיתקליין מיועדת לשימוש עם התרופה אימיטרקס זריקות.

כל מערכת הזרקה מגיעה במלואה עם אימיטרקס אריזת מחסנית. אריזת המחסנית מכילה שני מזרקים מוכנים מראש. שמור הרחק מטווח ראייתם והישג ידם של ילדים.



כיצד לתת זריקה על-ידי שימוש בעט אימיטרקס זריקות

- קרא את העלון במלואו ובעיון לפני שימוש בעט הזרקה אימיטרקס זריקות.
- כל מערכת ההזרקה של אימיטרקס זריקות מגיעה במלואה עם אריזת מחסנית שמכילה שני מזרקים מוכנים מראש עם אימיטרקס זריקות. כל מזרק מוכן מראש הוא לשימוש חד-פעמי.
- העזר בתמונה למעלה כדי לזהות את החלקים השונים של מערכת ההזרקה.
- אל תטעין את העט עד שאתה מוכן לתת את הזריקה.


1 הרם ופתח את מכסה אריזת הנשיאה.



- 2** קרע את האטם האדום מאחד המזרקים. פתח את המכסה הכחול מתחת לאטם.
- 3** הוצא את עט ההזרקה של אימיטרקס זריקות מאריזת הנשיאה. בדוק שהמוט הלבן אינו בולט החוצה מעבר לקצה העט (ראה תמונה בסעיף 11 במדריך זה).
אם הוא בולט החוצה, מקם את העט חזרה לתוך אריזת הנשיאה, דחוף בחוזקה והמוט צריך להכנס למקומו ולהשמיע קליק.
עתה, העט מוכן לשימוש.



- 4** דחף את עט ההזרקה של אימיטרקס זריקות בחוזקה לתוך אריזת המחסנית הפתוחה והברג אותו בעדינות בכיוון השעון (כחצי סיבוב) עד שהוא לא יסתובב יותר.



5 שמור על האצבע שלך רחוק מלחצן השחרור (כפתור ההזרקה) הכחול ומשוך את עט ההזרקה של אימיטרקס זריקות מחוץ לאריזת המחסנית. יתכן שתצטרך למשוך די חזק על מנת לעשות זאת. ישנה נצרה המונעת הזרקה בשוגג עד שאתה מוכן.



6 העט הטעון מוכן עתה לשימוש מיידי.
אל תנסה להחזיר את העט הטעון לתוך אריזת הנשיאה אלא רק לאחר שהשתמשת בזריקה, אחרת המחט תינזק והעט לא יזריק כראוי.
7 לחץ את העט עם הקצה הכחול המאורך בחוזקה אל אזור עור נקי - לרוב בצד החיצוני של הירך (כמו בתמונה) - כך שהחלק האפור יחליק למטה ויכסה חלק מהקצה הכחול. זה משחרר את הנצרה.



8 אחוז בעט בחוזקה ולחץ על כפתור ההזרקה הכחול בקצה העליון של עט ההזרקה של אימיטרקס זריקות. ספור באיטיות עד 10 תוך כדי שמירה על עט ההזרקה של אימיטרקס זריקות יציב מאוד וכפתור ההזרקה לחוץ.
אל תוציא את העט מהעור מוקדם מדי שמא חלק מהזריקה יתבזבז.
לאחר מכן הוצא את העט החוצה והיזהר שלא לגעת בקצה המחט.
9 החזר את המזרק המשומש למקום הריק באריזת המחסנית מיד.




10 דחף את העט למטה לתוך אריזת המחסנית ככל האפשר, הברג החוצה את העט על-ידי סיבוב נגד כיוון השעון (כחצי סיבוב) עד שהוא יוצא.



11 הוצא את עט ההזרקה של אימיטרקס זריקות מתוך אריזת המחסנית. סגור את המכסה הכחול מעל המזרק המשומש.



12 הכנס את עט ההזרקה של אימיטרקס זריקות בחזרה לאריזת הנשיאה ודחוף אותו למטה עד שהוא יתקבע למטה. הוא ישמיע קליק עם חזרתו למקום. עט ההזרקה של אימיטרקס זריקות יהיה מוכן אז לשימוש בפעם הבאה.



13 סגור את המכסה של אריזת הנשיאה עד שתצטרך להשתמש במזרק הבא.

Imi Inj PT v5A