

التبلیغ عن اعراض جانبية
بإمكانك التبليغ عن اعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة
الضغط على الرابط «[تبليغ عن اعراض جانبية عقب علاج دوائي](#)» الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة
الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى
النموذج المباشر للتبلیغ عن اعراض جانبية، أو عن طريق
تصفح الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il>

بالاضافة لذلك، بإمكانك تبليغ شركة "يونيفارم م.ض."

٥ كيفية تزخين مبرو؟

- تختلف التسميم بغير حفظ هذه الدواء وكل دواء آخر في مكان ملعق بعيدا عن متناول أيدي ومجايل رؤية الأطفال وأو الرصاص، وذلك لتفادي إصابتهم بالسم.
- لا يجوز تناول مبرو بعد انتهاء تاريخ الصلاحية (exp date) الذي يظهر على كل العبة. يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير في نفس الشهر.
- شروط التخزين: يجب تخزين الدواء بدرجة حرارة دون 25 درجة مئوية وفي مكان مهمن من الضوء.
- لا يجوز رمي الأدوية في المجرى أو في القمامدة المنزلية. إسأل الصيدلي عن كيفية الخالص من أدوية لم تقدر الاستعمال. هذه الوسائل تساعده في الحفاظ على البيئة.

٦ معلومات إضافية

يحتوي الدواء بالإضافة للمادة الفعالة أيضاً على مركبات غير فعالة:

Microcrystalline cellulose, Lactose (anhydrous), Sodium starch glycollate, Colloidal silicon dioxide, Magnesium stearate, Opadry OY-8704.
يحتوي كل قرص من مبرو **٣٠** على 60 ملغ لكتوز.
يحتوي كل قرص من مبرو **٤٥** على 90 ملغ لكتوز.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة:
اقراص مبرو هي أقراص مطلية، مستديرة، معدية من كل الجانحين، لها برتقالي وهي ذات خط للشطر من جانب واحد.

تتوفر الأقراص ضمن علب ذات **١٥، ١٠، ٢٠** أو **٣٠**. هي معبأة ضمن لوحيات (بليست) داخل علب كرتون.

من الجائز أن تسترق كافحة أحさま العلب.

اسم صاحب الإنتشار وعنوانه: يونيفارم م.ض، ص.ب.

٦١٢١٣٠١ ٢١٤٢٩

اسم المنتج وعنوانه: يونيفارم م.ض، بار الصناعة "ماقو كرمل".

أرقام سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة

الصحة:

ميرو ٣٠: ١٢٨ ٦٢ ٣٠٧٣٨ ٠٢

ميرو ٤٥: ١٢٨ ٦٣ ٣٠٧٣٩ ٠٢

من أجل سهولة وتوفير القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.

تم إعدادها في أيار 2021.

شائعة (من شأنها أن تؤثر على حتى 1 من بين 10 أشخاص):

Lethargy).

- نوم دوار.
- غثيان.
- إسهال.
- تقيّق.
- إمساك.
- ظفح أو طفح جلدي (exanthema).
- آلام في المفاصل (arthralgia) أو آلام عضلية (myalgia).
- ألم في الظهر.
- الشعور بدوران أو إغماء عند الإنفاق الوضعي الوقوف بشكل مفاجئ (انخفاض ضغط الدم الانتحاري).
- إنفاس عادمة في الكاحلين أو في راحتي القدمين (الناتج عن إنحباس السوائل (وذمة)).
- إرهاق.
- أحشاء حقيقة.
- ارتياخ.
- الشعور بقلق.
- مشاكل في النوم.

غير شائعة (من شأنها أن تؤثر على حتى 1 من بين 100 شخص):

paresthesia).

- أحاسيس شاذة في الجلد، مثل، حرق، وخز، دغدغة أو تشنف (paresthesia).
- اضطرابات العصب (syncope).
- خدران في الفم (نقص الحس في الفم).
- انتفاخ ضغط الدم.
- كوايس.
- الشعور بهيجان.
- هلوسة.
- الرغبة في الحركة.

نادرة (من شأنها أن تؤثر على حتى 1 من بين 1,000 شخص):

myoclonus).

- تشنفات أو تقلصات عضلية (myoclonus).
- عدم وعي.
- غير معروف (لا يمكن تقييم الشعور من المعلومات المتقدمة).
- علامات لتلوك سخونة مرتفعة مجهولة السبب، ألم في الحجرة أو تفرحات في الدم (agranulocytosis)، في حالات نادرة، قد يسبب ميراتازيبين اضطرابات في إنتاج خلايا دم (تيبيت خاتم العظم)، بعض الأشخاص يصبحون أقل مقاومة للتلوك نظراً لأن ميراتازيبين يمكن أن يؤدي لنقص مؤقت في خلايا الدم البيضاء (granulocytopenia).
- أحاسيس شاذة في الفم (تتشمل في الفم).
- إنفاس في الفم (وذمة في الفم).
- إنفاس في الجسم (وذمة عام).
- إنفاس موضعي.

غير معروف (نسبة الصوديوم في الدم (hyponatremia).

(eosinophilia).

- إرهاق غير سليم للهؤرون، الذي ينظم نسب الماء في الدم (السيروتونين)، إسالة، اضطرابات ضلليلة (somnambulism).
- المشي خلال النوم (somnambulism).
- اضطرابات في النطق.
- إنفاس في نسب الكرياتين كيتاز في الدم.
- صعوبة في التبول (احتباس البول).
- تزايد سلس اللاب.
- تزايد سلس اللاب.

غير معروف (نسبة البرولاكتين في الدم (fertro-

برولاكتين) في الدم، بما في ذلك أعراض لتخضيم الثديين وأفراز حليب من المлечتين).

أعراض جانبية إضافية لدى الأطفال والراهقين

شائعة جداً (من شأنها أن تؤثر على أكثر من 1 من بين 10 أشخاص):

- زيادة شهادة الطعام وزيداً الوزن.
- نفاس أو ميل للنوم.
- صداع.
- غفاف في الفم.
- زيادة ملحوظة في الوزن، شري وإرتفاع التريليزيريدات في الدم.
- إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية، أو عندما تعايني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك إستشارة الطبيب فوراً.

أعراض جانبية شائعة (من شأنها أن تؤثر على 1 من بين 10 أشخاص):

أعراض جانبية غير شائعة (من شأنها أن تؤثر على حتى 1 من بين 100 شخص):

- الشعور بمعنويات عالية أو «بانثناء» عاطفي (هوس).
- أمراض جانبية نادرة (قد تؤثر على حتى 1 من بين 1,000 شخص):
- إصفرار لون العينين أو الجلد: الأمر الذي من شأنه أن يشير إلى حدوث إضطراب في الأداء الوظيفي الكبد (يرقات).
- ألم خطير في أعلى البطن الذي يظهر أحياناً سوية مع غثيان وقيءات (التهاب في البنكرياس).

أعراض جانبية شائعة غير معروف (لا يمكن تقييم الشعور من المعلومات المتقدمة) (آفات).

آفات

- آفات خطيرة المعروفة بالعامي ممتددة الأشتكي (آفات حادة، ينفسخية - مائلة للأحرار على العين، حادة، خاصة على راحتي اليدين أو ياطن راحتي القدمين: مانع متنفسة شبيهة بالبشرة تترتفع فوق الجلد؛ في المناطق الحساسة على الفم، العينين والأنف والأعضاء التناسلية، التي من شأنها أن تترافق بسوغة وارهاق).
- طفح حفيظ، حوصلات (bullous dermatitis).
- آفات حمراء على الجسم على شكل بقع دائرة ذات تشنف (paresthesia).
- اضطرابات العصب (syncope).
- خدران في الفم (نقص الحس في الفم).
- انتفاخ ضغط الدم.
- كوايس.
- الشعور بهيجان.
- هلوسة.
- الرغبة في الحركة.

غير شائعة (من شأنها أن تؤثر على حتى 1 من بين 100 شخص):

أحاسيس شاذة في الدم (ذاتية ذات

- مركز لأذن أكثر (شبيهة بلوح الهوفن). تترافق عادة بحوسيات، تتشعر للجلد، تترافق في الفم، الحجرة، الأنف، العينين أو الأعضاء التناسلية. يسبق هذا الطفح الخطير سخونة وأعراض شبيهة بالإنفلونزا (أعراض لرد فعل جلدي شديد يسمى متلازمة سيفنس جوتون أو إنحلال البشرة التخزيري المسمى).
- طفح واسع، ارتفاع درجة حرارة الجسم وتضخم الغدد الليمفاوية (متلازمة DRESS أو متلازمة فرط الحساسية).
- علامات لتلوك سخونة مرتفعة مجهولة السبب، ألم في الحجرة أو تفرحات في الدم (agranulocytosis)، في حالات نادرة، قد يسبب ميراتازيبين اضطرابات في إنتاج خلايا دم (تيبيت خاتم العظم)، بعض الأشخاص يصبحون أقل مقاومة للتلوك نظراً لأن ميراتازيبين أو إنحلال البشرة التخزيري المسمى.

غير معروف (لا يمكن تقييم الشعور من المعلومات المتقدمة).

agranulocytopenia).

- تشنفات أو تقلصات عضلية (myoclonus).
- عدم وعي.
- غير معروف (نسبة الصوديوم في الدم (hyponatremia).
- إرهاق غير سليم للهؤoron، الذي ينظم نسب الماء في الدم (السيروتونين)، إسالة، اضطرابات ضلليلة (somnambulism).
- المشي خلال النوم (somnambulism).
- اضطرابات في النطق.
- إنفاس في نسب الكرياتين كيتاز في الدم.
- صعوبة في التبول (احتباس البول).
- تزايد سلس اللاب.
- تزايد سلس اللاب.

غير معروف (نسبة البرولاكتين في الدم (fertro-

برولاكتين) في الدم، بما في ذلك أعراض لتخضيم الثديين وأفراز حليب من المлечتين).

أعراض جانبية محتملة أخرى بإستعمال ميراتازيبين

هي:

- شائعة جداً (من شأنها أن تؤثر على أكثر من 1 من بين 10 أشخاص):
- زيادة شهادة الطعام وزيداً الوزن.
- نفاس أو ميل للنوم.
- صداع.
- غفاف في الفم.
- إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية، أو عندما تعايني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك إستشارة الطبيب فوراً.

متى يمكنك توقيع بدء شعور بشكل أفضل: عادة، بياد ميرو بالتأثير بعد 1-2 أيام وبعد 2-4 أيام من شانك أن تبدأ بالشعور بشكل أفضل.

من المهم أن تتحدث مع طبيبك خلال الأسبوع الأول من العلاج، بخصوص تأثيرات ميرو:

٤-٤ أسابيع بعد بدء العلاج بـ ميرو، إحك طبيبك كيف أثر علىك الواء.

إذا لم تشعر بشكل أفضل حتى الآن، فمن شأن طبيبك أن يصف لك جرعة دوائية موافقة بـ ميرو بعد 2-4 أيام إضافية.

عادة، يتوجب عليك مواصلة تناول ميرو حتى زوال أعراض الكتاب لديك لمدة 4-6 أشهر.

إذا تناولت من ميرو أكثر مما أنت بحاجته إذا تناولت بالخطأ جرعة كبيرة، في هذه الحالة تحدث العلامات الأكثر شيوعاً لارتفاع الجرعة الدوائية من ميرو (دون أدوية إضافية أو كحول) هي نعاس، توهان وتزايد نظم القلب، إذا تناولت جرعة دوائية مفرطة أو إداً بطفيل بالخطأ في الدواء، توجه حالاً للطبيب أو غرغوة الطوارئ في المستشفى، وأحضر عليه الدواء معك.

إذا نسيت تناول ميرو في اليوم التالي، في الوقت المناسب، يجب تناول جرعة دوائية مرتين

• لا يجوز تناول جرعة دوائية مضاعفة للتعويض عن الجرعة الدوائية المنسية. يجب تناول الجرعة الدوائية مرة أخرى في الوقت الإعتيادي.

إذا كان من المفترض عليك تناول جرعة دوائية مرتين في اليوم، فيجب تناول جرعة الدوائية المنسية ببساطة تناولها مع الجرعة الدوائية المنسية في الصباح.

إذا نسيت تناول الجرعة الدوائية المنسية، فلا يجوز تناولها مع جرعة الصباح التالي؛ ببساطة قوتها وبشكل متزامن، وباستعمال جرعات الدواء الصباحية والمتساوية للعتمادية الخاصة بك.

إذا توقفت عن تناول الجرعين الدوائيتين، فلا تحاول التعويض عن الجرعات الدوائية المنسية، فوت الجرعين الدوائيتين وواصل في اليوم التالي بإستعمال جرعات الصباح والمتساوية للعتمادية الخاصة بك.

إذا توقفت عن تناول ميرو فقط بعد إشتارة طبيبك، إذا توقفت بشكل أكثر مما ينتهي، فقد يعود الكتاب. في لحظة شعورك بشكل أفضل، تحدث مع طبيبك.

قد يقر طبيبك من يملك التوقف عن العلاج. لا توقفت عن تناول ميرو بشكل مفاجئ، حتى ولو زال الكتاب الخاص بك، إذا تشعر بغير ميرو فقط بعد إشتارة طبيبك، يمكن أن يحدث لديك صداع، بإهتزاج أو بقلق، وهذا الأعراض من طرق النظارات الطبية إذا لم الأمزد ذلك.

طبيبك كيف قلل الجرعة الدوائية بالتدريج، كيف يمكن المساعدة في نجاح العلاج؟

لا يجوز تناول ميرو فقط في اللعنة يجب تشخيص طبيع الدواء والتأكد من أن المتساوية في كل مرة تتناول فيها دواء، ضع النظارات الطبية حول استعمال الدواء، إذا توفرت لديك إستثير الطبيب أو الصيدلي.

٤) الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن استعمال ميرو قد يسبب أعراض جانبية عند بعض المستعملين.

لا تندفع من قائمة الأعراض الجانبية من الجائز أبداً تعاني أي منها.

إذا كنت تقاسي من كل من الأعراض الجانبية الجدية التالية، فتوقف عن تناول ميراتازيبين وإحك طبيبك حالاً.