

## الحمل، الإرضاع والخصوبة

هذا المستحضر الطبي غير مُخصص للعلاج لدى النساء.

### 3. كيف تستعمل الدواء؟

يجب دائماً استعمال الدواء وفقاً لتعليمات الطبيب. عليك أن تفحص مع الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا بخصوص الجرعة وطريقة العلاج بالمستحضر. الجرعة وطريقة العلاج تُحددان من قبل الطبيب فقط. الجرعة الاعتيادية عادةً هي 2 كبسولات في اليوم، مع الوجبات.

لا يجوز تجاوز الجرعة الموصى بها. يجب تناول الدواء مع الوجبة. يجب بلع الدواء مع كأس ماء. لا يجوز فتح الكبسولة ونثر محتوياتها.

إذا تناولت عن طريق الخطأ جرعة أعلى، قد تظهر اضطرابات عابرة في الجهاز الهضمي (الأم بطن).

إذا تناولت بالخطأ جرعة مُفرطة، أو إذا بلع طفل أو شخص آخر من الدواء، توجه فوراً إلى الطبيب أو لغرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر عبوة الدواء معك.

إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المطلوب، لا يجوز تناول جرعة مضاعفة. خذ الجرعة التالية في الوقت المعتاد واستشر الطبيب.

يجب المداومة على العلاج كما أوصى من قبل الطبيب. حتى إذا طرأ تحسن على حالتك الصحية، لا يجوز إيقاف العلاج بالدواء دون استشارة الطبيب أو الصيدلي.

لا يجوز تناول أدوية في الظلام! يجب التحقق من المصق والجرعة في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.

إذا كانت لديك أسئلة إضافية بخصوص استعمال الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

### 4. الأعراض الجانبية

كما في كل دواء، قد يسبب استعمال پرميكسون 160 ملغ أعراضاً جانبية لدى جزء من المستخدمين. لا تفرع عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية. من الممكن أن لا تعاني من أي واحد منها.

أعراض جانبية شائعة (تظهر لدى 10-1 مستخدمين من بين 100)

- الرأس (الثقيقة)
- الأم بطن
- أعراض جانبية غير شائعة (تظهر لدى 10-1 مستخدمين من بين 1,000)
- غثين
- ارتفاع في إنزيم gamma-glutamyl

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدالة

(مستحضرات) - 1986

يُسوق الدواء بموجب وصفة طبيب فقط

## پرميكسون 160 ملغ كبسولات

التركيب:

المادة الفعالة وكميتها - كل كبسولة تحتوي على:

Lipidosterolic Extract of  
Serenoa Repens 160mg

160 ملغ من خلاصة دهنية (ستيروولات) من نبتة البلميط المنشاري (Serenoa Repens).

مواد غير فعالة ومُورجات في المستحضر: أنظر بند 6.

اقرأ النشرة بإمعان حتى نهايتها قبل أن تستعمل الدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات ملخصة عن الدواء. إذا كانت لديك أسئلة إضافية، توجه إلى الطبيب أو إلى الصيدلي.

هذا الدواء وُصف للعلاج من أجلك. لا تعطه إلى آخرين. فهو قد يسبب الضرر لهم حتى لو بدا لك أن حالتهم الطبية مماثلة لحالتك.

### 1. لأي غرض مُخصص الدواء؟

الدواء مُخصص لعلاج مشاكل التبول المتعلقة بتضخم غدة لدى رجال بالغين.

الفصيلة العلاجية: مستحضر طبي المُستعمل في علاج تضخم حميد في غدة البروستات.

### 2. قبل استعمال الدواء

لا يجوز استعمال الدواء إذا:

- كنت حساساً (أرجي) للمادة الفعالة lipidosterolic extract of serenoa repens أو لأي واحد من المركبات الإضافية التي يحتوي عليها الدواء (أنظر بند 6).

تحذيرات خاصة متعلقة باستعمال الدواء

- أخذ الدواء على معدة خاوية قد يسبب الغثيان.
- أثناء استعمال الدواء هناك حاجة بأن تكون تحت مراقبة منتظمة من قبل طبيبك. لا يشكل پرميكسون بديلاً عن جراحة لإزالة غدة البروستات في حال كانت الجراحة ضرورية.

تداخلات/تفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تأخذ، أو إذا أخذت في الآونة الأخيرة، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبيب وإضافات تغذية، أخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك.

استعمال الدواء والغذاء

يجب تناول الدواء مع الطعام.

- transpeptidase, ارتفاع مُعتدل في إنزيم
- transaminase (إنزيمات الكبد)
- شرى (طفح في الجلد)
- تضخم الثديين لدى الرجال (gynecomastia) –
- عكوس من بعد وقف استعمال الدواء

تم التبليغ عن العرض الجانبي التالي, لكن تواتره الدقيق غير معروف ولذلك شيوعه غير معروف:

- وذمة

إذا ظهر عرض جانبي, إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية, أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يُذكر في النشرة, عليك استشارة الطبيب.

### التبليغ عن الأعراض الجانبية

يمكن التبليغ عن الأعراض الجانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "التبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) الذي يوجّه إلى الاستمارة الإلكترونية للتبليغ عن الأعراض الجانبية, أو عن طريق دخول الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il>

بالإضافة إلى ذلك, يمكن التبليغ لشركة بيريجو بواسطة العنوان التالي: [www.perrigo-pharma.co.il](http://www.perrigo-pharma.co.il)

### 5. كيفية تخزين الدواء؟

- تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيدًا عن متناول أيدي الأطفال و/أو الرضع ومجال نظرهم وبذلك تمنع التسمم. لا تسبب التقيؤ دون أمر صريح من الطبيب.
- لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على العبوة. تاريخ انتهاء الصلاحية يرجع إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- خزّن دون الـ 25 درجة مئوية.

### 6. معلومات إضافية

- إضافة إلى المادة الفعالة, يحتوي الدواء أيضًا على: Polyethylene glycol 10,000, Titanium dioxide E171, Yellow iron oxide E172, Indigotin E132, Gelatin
- كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة: كبسولة صلبة بلون أخضر فاتح.
- عبوات من 30, 56, 60 و 100 كبسولة, المعبئة ببليسترات (لويحات).
- قد لا تكون جميع أحجام العبوات مُسوّقة.
- اسم المنتج وعنوانه: بيير فابره مديكمنت, بولون, فرنسا.
- صاحب التسجيل وعنوانه: بيريجو إسرائيل وكالات م.ض, شارع ركيفت 1, شوهم.
- تم التنقيح في حزيران 2021 وفقًا لتعليمات وزارة الصحة.
- رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: 11318.28916
- للتبسيط وتسهيل القراءة, تمّت صياغة نشرة المعلومات هذه بلسان المنكر. بالرغم من ذلك, الدواء مُخصّص لكلا الجنسين.