

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים
(כתב-שירים) התשמ"ו - 1986

התרופה משוקקת על פי מרשם רופא בלבד

פרמיקסון 160 מ"ג כמוסות

החומר הפעיל וכמותו - כל כמוסה מכילה:

Lipidosterol Extract of Serenoa
Repens 160mg

160 מ"ג של תמצית שומנית (סטרוילם) של
צמח הדקל הננסי (Serenoa Repens).
חומרים בלתי פעילים ואלרגנים בתכשיר:

ראה טעיף 6.

**קרא בעיון את העלון על סופו בטרם
תשתמש בתרופה.** עלון זה מכיל מידע

תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות
נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

התרופה זו נרשמה לטיפול עבורך. אל תעביר
אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו
אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

1. למה מיועדת התרופה?

התרופה מיועדת לטיפול בבעיות העלת שתי
הקשורות לגדלה של בלוטת הערמונית
גבבירם מבוגרים.

קבוצה תרפויטית: תכשיר רפואי המשמש
לטיפול בהגדלה שפירה של הערמונית.

2. לפני השימוש בתרופה:

אין להשתמש בתרופה אם:

• אתה גריש (אלרגי) לחומר הפעיל
lipidosterol extract of serenoa
repens

או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר
מכילה התרופה (ראה טעיף 6).

**אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש
בתרופה**

• לקחת התרופה על בטן ריקה עלולה לגרום
לבלחילה.

• בזמן השימוש בתרופה יש צורך להיות במעקב
סדיר של הרופא שלך. פרמיקסון אינו מהווה
תחליף לניתוח הסרת הערמונית במידה
והניתוח הכרחי.

אינטראקציות/תגובות בין תרופות

אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחריה,
תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם
ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.

שימוש בתרופה אומון

יש ליטול את התרופה עם הארוחה.

הריון, הנקה ופריון

תכשיר רפואי זה אינו מיועד לטיפול בנשים.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

תמיד יש להשתמש לפי הוראות הרופא. עלִיך

לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח
בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.

המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא
בלבד. המינון המקובל בדרך כלל הוא

2 כמוסות ביום, עם הארוחות.

אין לעבור על המנה המומלצת. יש ליטול
את התרופה עם הארוחה. יש לבלוע את

התרופה עם כוס מים. אין לפתוח ולפזר את
תוכן הכמוסה.

אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר, תיתכן
הופעת הפרעות חולפיות במערכת העיכול
(כאבי בטן).

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד
אם משהו אחר מן התרופה, פנה מיד לרופא
או לאחד מיון של בית חולים והבא את אריזת
התרופה איתך.

אם סכחת ליטול תרופה זו בזמן הדרוש, אין
ליטול מנה כפולה. קח את המנה הבאה בזמן
הרגיל והיועץ ברופא.

יש להתימד בטיפול כפי שהומלץ על ידי
הרופא.

גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין
להפסיק את הטיפול בתרופה ללא התייעצות
עם הרופא או הרוקח.

אין ליטול תרופות בחושך! בודק את התווית
והמנה בכל פעם שהינך נוטל תרופה. הרכב
משקפיים אם הינך נזקק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש
בתרופה, היועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בפרמיקסון
160 מ"ג עלול לגרום לתופעות לוואי. בחלק
מהמשתמשים, אל תיבהל למקרא רשימת
תופעות הלוואי. ייתכן שלא תסבול מאף אחת
מןן.

תופעות לוואי שיכחות (מופיעות ב- 1-10
משתמשים מתוך 100)

• כאב ראש (מיגרנה)

• כאבי בטן

תופעות לוואי שאינן שיכחות (מופיעות ב-
1-10 משתמשים מתוך 1,000)

• בחילה

• עלייה באנזים גמא-גלואטמיל טרנסאמפטידאז,
עליה מתוונה באנזים טרנסאמינאזה (אנזימי
הכבד)

• סרפדת (פריחה בעור)

• הגדלת שדיים בגברים (ג'נקומסטיה) - הפיך
לאחר הפסקת השימוש בתרופה

**תופעות הלוואי הבאה דווחה, אך תדירותה
המדויקת אינה ידועה ולכן שיכחותה אינה
ידועה:**

• בצקת

•

•

•

אם הייתה תופעת לוואי, אם אתה
מתופעת הלוואי מחמירה, או כאשר אתה
סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עלִיך
להתייעץ עם הרופא.

דיוח על תופעות לוואי

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות
באמצעות לחיצה על הקישור "דיוח על
תופעות לוואי" עקב טיפול תרופתי" שממצא
בדף הבית של אתר משרד הבריאות
(www.health.gov.il) המפנה לטופס

המקוון לדיוח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה
לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

בנוסף, ניתן לדווח לחברת פריגו באמצעות
הכתובת הבאה:

www.perrigo-pharma.co.il

5. איך לאחסן את התרופה?

• שמור הערלה! תרופה זו חל תרופה אחרת יש
למנוע במקום סגור וכולי הישג ידם וטווח
ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל-ידי כך
תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה
מפורשת מרופא.

• אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה
(exp. date). המופיע על גבי האריזה. תאריך
התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

• אחסן מתחת ל-25°C.

6. מידע נוסף

**נוסף על החומר הפעיל, התרופה מכילה
גם:**

Polyethylene glycol 10,000, Titanium
dioxide E171, Yellow iron oxide E172,
Indigotin E132, Gelatin

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:

כמוסה קשה בצבע ריזוק בהיר.
אריזות של 30, 56, 60 ו-100 כמוסות,
הארוזות בבליסטרים (מגשיות).

ייתכן שלא כל גדלי האריזות משווקים.

שם היצרן וכתובתו: פייג פברה מדיקמנט,
בלון, צרפת.

בעל הרישום וכתובתו: פריגו ישראל סוכנויות
בע"מ, רח' הרפת 1, שדה.

נעדר בינוי 2021 בהתאם להנחיות משרד
הבריאות.

**מספר רישום התרופה בפקס התרופות
הממלכתית במשרד הבריאות:** 11318.28916

בלשן הפטנט ולקהילת הקריאה, עלון זה נוסח
שלשום זכר. ככל עף זאת, התרופה מיועדת לשני
המינים.

01.06.2021