

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו – 1986

התרופה משוקעת על פי מרשם רופא בלבד

אקטיק® 200 מיקרוגרם אקטיק® 400 מיקרוגרם אקטיק® 600 מיקרוגרם אקטיק® 800 מיקרוגרם אקטיק® 1200 מיקרוגרם אקטיק® 1600 מיקרוגרם

טבליות דחוסות על מקל למתן דרך ריריות חלל הפה

הרכב: כל טבליה דחוסה על מקל מכילה:

אקטיק 200 מק"ג: פנטניל (כציטראט) 200 מק"ג (Fentanyl [as citrate] 200 mcg)
אקטיק 400 מק"ג: פנטניל (כציטראט) 400 מק"ג (Fentanyl [as citrate] 400 mcg)
אקטיק 600 מק"ג: פנטניל (כציטראט) 600 מק"ג (Fentanyl [as citrate] 600 mcg)
אקטיק 800 מק"ג: פנטניל (כציטראט) 800 מק"ג (Fentanyl [as citrate] 800 mcg)
אקטיק 1200 מק"ג: פנטניל (כציטראט) 1200 מק"ג (Fentanyl [as citrate] 1200 mcg)
אקטיק 1600 מק"ג: פנטניל (כציטראט) 1600 מק"ג (Fentanyl [as citrate] 1600 mcg)

למידע על מרכיבים בלתי פעילים ואלרגניים ראה סעיף 2 "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" וסעיף 6 – "מידע נוסף".

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות או חששות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

תרופה זו נרשמה לטיפול עבורך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם גם אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

תרופה זו אינה מיועדת לשימוש בילדים ובמתבגרים מתחת לגיל 16 שנים.

<div>תרופות ממשפחת האופיואידים עלולות לגרום להתמכרות, בעיקר בשימוש ממושך, והינן בעלות פוטנציאל לשימוש לרעה ולמינון יתר. תגובה למינון יתר יכולה להתבטא בנשימה איטית ואף לגרום למוות. ודא כי הינן כמות את שם המינון, המינון והשינן לוקח, תדירות המתן, משך הטיפול, תופעות הלוואי והסיכונים הפוטנציאליים. מידע נוסף היכול לתלות והתמכרות ניתן למצוא בקישור: הpdf https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MTI/Drugs/risk/Doc/Lib/opioids</div>
<p>נטילת תרופה זו עם תרופות ממשפחת הבנזודיאזפינים, תרופות אחרות הנדאכות מערכת עצבים מרכזית (כולל סמים) או אלכוהול עלולה לגרום לתחושת ישנוניות עמוקה, קשיי נשימה (דיכוי נשימתי), תרדמת ומוות.</p>

1. למה מיועדת התרופה?

אקטיק נועד לטיפול בכאב מתפרץ בחולי־ סרטן מבוגרים ומתבגרים מגיל 16 ומעלה שכבר נוטלים תרופות אופיואידיות אחרות לשיכון כאבים מתמשכים, ושגופם התרגל לטיפול (סבלות לאופיואידים).

קבוצה תרפויטית

משכך כאבים מקבוצת האופיואידים (נרקוטיקה).

כאב מתפרץ הוא כאב פתאומי נוסף, המתרחש פתאום, על אף נטילת התרופות הרגילות שלך לשיכון כאבים.

2. לפני השימוש בתרופה

<div>אין להשתמש בתרופה אם:</div> <div><ul style="list-style-type: none">אינך משתמש באופן קבוע בתרופה האופיואידית שנרשמה עבורך (כגון קודאין, פנטניל, הידרומורפון, מורפין, אקסידוקון, פתידין), כל יום לפי לחץ זמנים קבוע, בשמש שוב לפחות, לשיכון כאבים מתמשכים. אם אינך משתמש בתרופות אלו אין ליטול אקטיק, מאחר והדבר עלול להגדיל את הסיכון לכך שהנשימה תהיה איטית ו/או שחית באופן מסוכן, או אפילו להפסקת הנשימה.אתה רגיש (אלרגי) לפנטניל או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (מפורטים בסעיף 6).אתה נוטל מטבכי אוקסידאז (MAOIs) (תרופות לטיפול בדיכאון חמור) או נטלת אותם בשבועיים האחרונים (במקרה שנימה תופעה) תחת "לפני הטיפול באקטיק, ספר לרופא אם".אתה סובל מבעיות נשימה חמורות או מבעיות ריאה חמורות המלוות בחסימה ריאתית.אתה סובל מכאב קצר טווח (כגון כאב הנובע מפציעות, ניתוח, כאבי ראש או מגרונת), שאינו כאב מתפרץ. אל תשתמש באקטיק אם אחד מהמבצים המפורטים לעיל לרונטי עבורך. אם אינך בטוח, היוועץ ברופא שלך או ברוקח לפני שימוש באקטיק.</div>

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

במהלך הטיפול באקטיק יש להמשיך להשתמש בתרופה האופיואידית לשיכון הכאבים המתמשכים הנובעים מהסרטן.

שימוש חוזר באקטיק עלול לגרום לכך שהתכשיר יהיה פחות יעיל (אתה מתרגל אליו) או לגרום לך להיות תלוי בו. הרופא שלך יעקוב אחר המצבים אלו.

לפני הטיפול באקטיק, ספר לרופא אם:

- עדיין אינך מאוזן עם תרופה אופיואידית אחרת לכאבים מתמשכים (מסביב לשועון) של מחלת הסרטן.
- אתה חולה במחלה המשפיעה על הנשימה שלך (כגון אסטמה, צפצופים, או קוצר נשימה).
- אתה סובל מחבלת ראש או מאובדן הכרה כלשהו.
- יש לך בעיות בלב, במיוחד קצב לב איטי.
- יש לך בעיות בכבד או בכליות – זה ישפיע על אופן פירוק התרופה בגופך.
- יש לך לחץ דם נמוך כתוצאה מכמות נמוכה של נוזלים במחזור הדם.
- יש לך סוכרת.
- אתה מעל גיל 65 – ייתכן שתצטרך מינון נמוך יותר. כל העלאת מינון יתבחן בזהירות רבה על ידי הרופא שלך.
- אתה נוטל תרופה ממשפחת הבנזודיאזפינים (ראה סעיף 2 תחת "תגובות בין תרופתיות"). שימוש בבנזודיאזפינים עלול להגביר את הסיכון לתופעת תופעות לוואי חמורות כולל מוות.
- אתה משתמש בתרופות נגדות דיכאון או תרופות אנטי־פסיכוטיות (מעכבי ספיגה חוזרת סלקטיביים או סרטונין [SSRIs], מעכבי ספיגה חוזרת של סרטונין ונוראפינפרין [SNRIs], מעכבי מנוזאמין אוקסידאז [MAOIs]; ראה סעיף 2 תחת "אין להשתמש בתרופה אם" ותחת "תגובות בין תרופתיות"). שימוש בתרופות אלו יחד עם אקטיק יכול להוביל **למצב שעלול להיות מסכן חיים הנקרא 'הסמנות סרטונין'** (ראה סעיף 2 תחת "תגובות בין תרופתיות").
- השתמש לרעה או התמכרת לאופיואידים או תרופות אחרות, אלכוהול או סמים אל חוקיים.
- פיתחת בעבר, במהלך שימוש באופיואידים, אי־ספיקת יותרת הכליה, מצב בו בלוטות יותרת הכליה אינן מייצרות מספיק הורמונים, או חוסר בהורמוני מין (חוסר באנדורגנים) (ראה סעיף 4 תחת "תופעות לוואי חמורות"). אתה צורך אלכוהול; אנא ראה סעיף "שימוש בתרופה וצריכת אלכוהול".

במהלך הטיפול באקטיק היוועץ ברופא אם:
אתה חווה כאב או רגישות מוגברת לכאב (היפראלגיה) אשר אינו מגיב למינון גבוה יותר של התרופה כפי שנרשם על ידי הרופא שלך.

יש לך סימנים של געשית. אקטיק מכיל כ-2 גרם סוכר; שימוש תכוף עלול להגביר את הסיכון לעששית שעלולה להיות חמורה. חשוב לטפל היטב בשיניים במהלך הטיפול באקטיק.

אתה חווה שלוב של התסמינים הבאים: בחילה, הקאה, חוסר תיאבון, עייפות, חולשה, סחרחורת ולחץ דם נמוך. תופעת תסמינים אלו יחד עלולים להעיד על מצב שעלול להיות מסכן חיים הנקרא כשל יותרת הכליה – במצב זה בלוטות יותרת הכליה אינן מייצרות מספיק הורמונים.

אתה מתקשה לנשום בזמן השינה (אפנאה – דום נשימה).

פנה לעזרה רפואית מיידידת אם:

אתה חווה תסמינים כגון קושי בנשימה או סחרחורת, נפיחות של הלשון, השפתיים או הגרון במהלך השימוש באקטיק. אלו עלולים להיות תסמינים מוקדמים לתגובות אלרגיות חמורות (אנפילקסיס/רגישות יתר, ראה סעיף 4 תחת "תופעות לוואי חמורות").

ילדים ומתבגרים

אקטיק אינו מיועד לילדים ומתבגרים מתחת לגיל 16 שנים.

תגובות בין תרופתיות

אל תשתמש בתרופה וספר לרופא או לרוקח אם:

אתה נוטל תכשירי לעששית אחרים שגרשמו לך בעבר לכאב מתפרץ. אם אתה עדיין מחזיק בחלק פנטנילי או פנטניל אלה בבית עליך היוועץ ברוקח לגבי אופן השמדתם.

אתה נוטל תרופות מקבוצת מעכבי מנוזאמין אוקסידאז (MAOIs) (תרופות לדיכאון חמור) או נטלת אותם בשבועיים האחרונים (ראה סעיף 2 תחת "אין להשתמש בתרופה אם" ותחת "לפני הטיפול באקטיק, ספר לרופא אם").

אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ונוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. במיוחד אם אתה לוקח:

תרופות הרגעה כמו בנזודיאזפינים או תרופות דומות – שימוש בו זמני עם אקטיק מעלה את הסיכון לישנוניות, קשיים בנשימה (דיכוי נשימה), תרדמת ועלול להיות מסכן חיים. כלן רק אם אפשריות טיפול אחרות אינן אפשריות, שימוש משולב ילקח בחשבון.

אם הרופא שלך יחליט על טיפול משולב, המינון ומשך הטיפול יוגבלו על ידו.

ספר לרופא על כל תרופות ההרגעה שאתה נוטל (לדוגמא כדורי שינה, תרופות לטיפול בחרדה, תרופות מסוימות לטיפול בתגובות אלרגיות (אנטי־היסטימינים) או תרופות הרגעה אחרות). יש למלא אחר הוראות הרופא בקפידה. מומלץ שתסביר לתבריים ולקורבים שלך איך לזהות את הסימנים והתסמינים שתוארו לעיל. צור קשר עם הרופא שלך כאשר אתה חווה תסמינים כאלה.

תרופות מסוימות להרפיית שרירים לדוגמא כלופן, דיזאפאם (ראה גם "אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה").

תרופות לעלולות להשפיע על פירוק אקטיק בגופך, כגון ריטובניר או תרופות אחרות המסייעות לשלוט בשימוש HIV, תרופות אחרות המנוונות "מעכבות CYP3A4" כגון סטרקוזול, איטראקונזול, או פלקוזול (משמשות לטיפול בזיהומים פטרייתיים), טרוילדינמיץ, קלריתרמיציץ, או אריתרמיציץ (תרופות לזיהומים חיידקיים) ותרופות מבחנות "משפעלי CYP3A4" כגון אריפאפיציץ, או אריפאפיציץ (תרופות לזיהומים חיידקיים), קרבמזפיץ, פנוברטיסאל, או פניטואץ (תרופות המשמשות לטיפול בפרוכוסים).

סוגים מסוימים של משככי כאבים חזקים הנקראים אגוניסטים חלקיים/אנטגוניסטים כגון בופרמרפין, נלבופין ופנטאזסין (תרופות לטיפול בכאב). אתה עלול לחוות תסמונת גמילה (חולשה, הקאה, נטילת חרדה, עצמורות, רעד והזעה) במהלך השימוש בתרופות אלו.

תכשירים רפואיים סרטונורגיים המשמשים לטיפול בדיכאון (תרופות נגודות דיכאון כגון: מעכבי ספיגה חוזרת סלקטיביים של סרטונין [SSRIs], מעכבי ספיגה חוזרת של סרטונין ונוראפינפרין [SNRIs] או תרופות אנטי־פסיכוטיות), השימוש בתרופות אלו יחד עם אקטיק יכול להוביל למצב שעלול להיות מסכן חיים הנקרא "הסמנות סרטונין" (ראה סעיף 2 תחת "לפני הטיפול באקטיק, ספר לרופא אם" ו"אין להשתמש בתרופה אם"). התסמינים של תסמונת סרטונין יכולים לכלול שינויים במצב נפשי (כגון אי־שקט, הזיות ותרדמת) והשפעות אחרות כגון חום גוף מעל 38°C, עלייה בקצב הלב, לחץ דם לא יציב, התעצמות רפלקסים, קישיון שרירים, חוסר קואורדינציה ו/או תופעות במערכת העיכול (כגון בחילה, הקאה, שלשול). הרופא ישקול האם אקטיק שמים, עבורך.

אם אתה לוקראת ניתוח הדורש הרדמה מלאה היוועץ ברופא.

שימוש בתרופה ומזון ושתיה

ניתן ליטול אקטיק לפני או אחרי ארוחות, אבל אין להשתמש במהלך הארוחות.

ניתן לשתות מעט מים לפני נטילת אקטיק על מנת להרטיב את הפה, אבל אין לשתות או לאכול דבר בזמן השימוש באקטיק.

אין לשתות מין אשכוליות במהלך השימוש באקטיק מאחר והדבר עלול להשפיע על פירוק התרופה בגוף.

שימוש בתרופה וצריכת אלכוהול

אין לצרוך אלכוהול במהלך השימוש באקטיק. הדבר עלול להגביר את השכיחות לתופעות לוואי חמורות כולל מוות.

היריון והנקה

אם את ברייון או מיניקה, חושבת שיתכן שאת ברייון או מתכננת היריון, יש להיוועץ ברופא לפני השימוש בתרופה.

היבין

אין להשתמש בתרופה במהלך ההיריון אלא בהוראת הרופא שלך. אם נעשה שימוש ממושך באקטיק במהלך ההיריון, קיים סיכון לתופעת תסמיני גמילה אצל היילוד שעלולים להיות מסכני חיים אם לא יזוהו ויטופלו על ידי הרופא (ראי סעיף 4 תחת "תופעות לוואי ששכיחותן אינה ידועה").

אין להשתמש באקטיק במהלך הלידה מאחר ופנטניל עלול לגרום לקשיי נשימה ביילוד.

הנקה

פנטניל יכול להיות מופרש בחלב האם ועלול לגרום לתופעות לוואי בתינוק יונק. אין להשתמש באקטיק אם את מיניקה. אל תתחילי בהנקה עד לפחות 5 ימים מהמנה האחרונה של אקטיק.

נהיגה ושימוש במכוונת

התרופה עלולה להשפיע על יכולתך לנהוג או להשתמש בכלים או במכוונת. היוועץ ברופא האם בטוח עבורך לנהוג או להשתמש בכלים או במכוונת במשך השעות הראשונות לאחר שימוש באקטיק. אין לנהוג או להפעיל מכוונת אם אתה מגיב שינוי או מסוחרר, יש לך טשטוש ראייה או ראייה כפולה או אם יש לך קושי להתרכז. חשוב שתדע כיצד אתה מגיב לאקטיק לפני נהיגה או שימוש בכלים או במכוונת.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

אקטיק מכיל סוכרוז ולקטוז. אם הרופא שלך אמר לך שיש לך אי סבילות לסוגים מסוימים של סוכר, היוועץ ברופא לפני השימוש באקטיק.

כל טבליה מכילה כ-2 גרם גלוקוז. אם יש לך סוכרת, עליך לקחת זאת בחשבון.

הגדולוקו טבליה עלול להזיק לשיניים. יש לצמצא שיניים בקביעות.

תרופה זו מכילה פחות מ- 23 מ"ג נתרן בטבליה ולפיכך נחשבת נטולת נתרן.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתרופה תמיד בהתאם להוראות הרופא.

המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד.

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתרופה.

אין לעבור על המנה המומלצת.

כאשר התחיל לראשונה להשתמש באקטיק, הרופא יקבע יחד איתך את המינון המתאים לשיכון הכאב המתפרץ. חשוב מאוד שתשתמש באקטיק בדיוק כפי שהרופא הורה לך.

אין לשנות את המינונים של אקטיק או של תרופות אחרות לכאב על דעת עצמך. שינוי במינון חייב להירשם ולהיבדק על ידי הרופא.

אם אינך בטוח לגבי המינון המתאים או אם יש לך שאלות בנוגע לשימוש בתרופה עליך לפנות לרופא.

כיצד התרופה נספגת בגופך

כאשר אתה ממקם את הטבליה פיך:

• הטבליה מתמוססת והחומר הפעיל משתחרר. התהליך אורך כ- 15 דקות.

• החומר הפעיל נספג דרך ריריות חלל הפה אל תוך מחזור הדם.

שימוש בתרופה באופן זה מאפשר ספיגה מהירה, כלומר התרופה תשכך את הכאב המתפרץ במהירות.

במהלך התאמת המינון

במהלך השימוש באקטיק אתה אמור להתחיל להרגיש הקלה מסוימת באופן מהיר. עם זאת, במהלך התאמת המינון ששולט בכאב המתפרץ, ייתכן שלא תחוש הקלה מספקת בכאב 30 דקות לאחר תחילת שימוש ביחידת אקטיק אחת (15 דקות מסיום השימוש ביחידת אקטיק). במקרה זה, ייתכן שהרופא יאפשר לך להשתמש ביחידת אקטיק שנייה באותו החוזק עבור אותו אירוע של כאב מתפרץ. אין להשתמש ביחידה שנייה אלא בהוראת הרופא בלבד. בשום אופן אין להשתמש ביותר משתי יחידות לטיפול באירוע בודד של כאב מתפרץ.

במהלך התאמת המינון, ייתכן שתצטרך להזדיק בביתך יותר מחוץ אחד של יחידות אקטיק. עם זאת, יש לשמור רק יחידות אקטיק בחוזק שהינן גרייך. על מנת למנוע אפשרות של בלבול או מינון יתר, היוועץ ברוקח כיצד להשליך את יחידות שאינך זקוק להן.

בכמה יחידות יש להשתמש

לאחר שנמצא המינון המתאים יחד עם הרופא שלך, השמשם ביחידה אחת עבור אירוע של כאב מתפרץ. פנה לרופא אם המינון המתאים של אקטיק אינו משכך את הכאב המתפרץ לאחר מספר אירועים רצופים של כאב מתפרץ. הרופא יחליט אם יש צורך לשנות את המינון.

עליך לספר מיד לרופא אם אתה משתמש באקטיק יותר מ- 4 פעמים ביום, כיוון שיתכן שיש צורך בשינוי מסטר הטיפול שלך. ייתכן שהרופא ישנה את הטיפול בכאבים המתמשכים שלך; כאשר הכאב המתמשך נמצא תחת שליטה, הרופא ישקול שינוי במינון של אקטיק. אם הרופא שלך חושד שפיתחת רגישות מוגברת לכאב (היפראלגיה) שקשורה לאקטיק, ייתכן שהוא ישקול הפחתה במינון של אקטיק (ראה סעיף 2 תחת "אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה"). להשגת הקלה מיטבית, ספר לרופא על הכאב שלך וכיצד אקטיק משפיע עליך, על מנת לשנות את המינון במידת הצורך.

כיצד יש להשתמש בתרופה זו?


פתיחת האריזה – כל יחידה של אקטיק אטומה באריזת בלייטר נפרדת.

• פתח את אריזת הבלייטר כאשר אתה מוכן להשתמש באקטיק. אל תפתח חלק אותה מראש.

• הרוקח את אריזת המגשית כאשר החלק המודפס במקך.

• החזק את הקצה הקצר של אריזת המגשית.

• מקם את המספריים קרוב לקצה של יחידת האקטיק וחתוך את קצה הלשונית הארוך (כפי שמצג).



• הפרד את החלק המודפס מאריזת המגשית ומשוך את מכל המגשית.

• הוצא את יחידת האקטיק מאריזת המגשית לאחר שהחלק המודפס אותה מיד לפה.

שימוש ביחידת האקטיק

• הנח את הטבליה בין הלחי לחניכיים.

• תוך שימוש במקל, סובב את הטבליה בחלל פיך, במיוחד לאורך הלחי. סובב את המקל לעיתים קרובות.



• סיים את הטבליה תוך 15 דקות להשגת ההקלה המירבית. אם תסיים מהר מדי – תבלע יותר מהתרופה ותשיג פחות הקלה בכאב המתפרץ.



• אין לנגוס או ללעוס את הטבליה. משמעות הדבר היא רמות יותר נמוכות בדם ופחות הקלה בכאב לעומת שימוש בהתאם להוראות.

• אם מסביב כלשהי אינך מסיים את כל הטבליה בכל פעם שיש לך כאב מתפרץ, ספר לרופא שלך.

מהי תדירות השימוש באקטיק?

• אל תשתמש ביותר מ- 4 יחידות אקטיק ביום, לאחר מציאת המינון ששולט ביעילות בכאב שלך. אם אתה חושב שיייתכן שתצטרך להשתמש ביותר מ- 4 יחידות אקטיק ביום, ספר לרופא מיד.

כמה יחידות אקטיק יש ליטול

• אין להשתמש ביותר משתי יחידות לטיפול בכל אירוע בודד של כאב מתפרץ.

אם נטלת בטעות מנת יתר

תופעות הלוואי השכיחות ביותר כתוצאה משימוש יתר: תחושת ישנוניות, בחילה, או סחרחורת.

• אם אתה מתחיל לחוש מסוחרר, בחילה או ישוניי מאוד לפני התמוססות מלאה של הטבליה, עליך להוציאה מהפה ולהזעיק עזרה.

תופעת לוואי חמורה של אקטיק הינה נשימה איטית ו/או שטחית. דבר זה עלול לקרות אם המינון של אקטיק גבוה מדי או אם נטלת יותר מדי אקטיק.

• אם זה קורה, יש לפנות באופן מיידי לקבלת עזרה רפואית.

אם בטעות ילד או מבוגר נטל אקטיק

אם אתה חושב שמישהו השתמש בטעות באקטיק, הזעק עזרה רפואית מיד. יש להשתדל להשאיר את האדם עירני (באמצעות קריאה בשמו ועל ידי טיטולו היד או הכתף שלו) עד להגעת העזרה הרפואית.

אם שכחת ליטול את התרופה

אם אתה עדיין סובל מהכאב המתפרץ, אתה יכול להשתמש באקטיק בהתאם להנחיית הרופא שלך. אם הכאב המתפרץ נפסק, אל תשתמש באקטיק עד לאירוע הבא.

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

אם אתה מפסיק את נטילת התרופה

עליך להפסיק את השימוש באקטיק כאשר אינך סובל עוד מכאב מתפרץ. עם זאת, אתה חייב להמשיך לקחת את התרופה האופיואידית הקבועה שלך לשיכון כאבים על מנת לטפל בכאב הסרטן המתמשך. כפי שהרופא שלך הנחה אותך, עם הפסקת השימוש באקטיק, ייתכן שתחווה תסמיני גמילה הדומים לתופעות הלוואי האפשריות של אקטיק, אם אתה חווה תסמיני גמילה או אם אתה מודאג בנוגע להקלת הכאב שלך, פנה לרופא שלך. הרופא יעריך אם אתה צריך תרופה להפחתת או העלמת תסמיני הגמילה.

אין ליטול תרופות בחושן! בדוק תהויות והמנה בכל פעם שאתה נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם אתה זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש באקטיק עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן שלא תסבול מאף אחת מהן.

תופעות לוואי חמורות

• **תופעות הלוואי החמורות ביותר:** נשימה שטחית, לחץ דם נמוך ושוק (הלם)
• **עליך או על המטפל שלך להוציא את יחידת האקטיק מהפה, ליצור קשר עם הרופא ולקדוא מיד לעזרה רפואית דחופה אם אתה חש באחת מתופעות הלוואי החמורות הבאות – ייתכן שתצטרך טיפול רפואי דחוף:**

• אתה נעשה מאוד ישוניי או חווה נשימה איטית ו/או שטחית.

• קשיי נשימה או סחרחורת, נפיחות בשפתיים או בלשון העלולים להצביע על סימנים מוקדמים של ת