

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة

(مستحضرات) - 1986

يسوّق الدواء بموجب وصفة طبيب فقط

ميكوفينولات تيفع 500 ملغ

أقراص

التركيب

يحتوي كل قرص على:

ميكوفينولات موفيتيل 500 ملغ

(Mycophenolate mofetil 500 mg)

لمعلومات عن المركبات غير الفعالة ومولدات الحساسية أنظر الفقرة 2 تحت البند «معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء» والفقرة 6 - «معلومات إضافية».

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.

- إحتفظ بالنشرة. من الجائز أن تحتاج إلى قراءتها ثانية.
- وصف هذا الدواء لعلاج مرضك فقط. لا تعطيه للآخرين. فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن حالتهم الطبية مشابهة لحالتك.
- إذا وجدت لديك أية أعراض جانبية، توجه للطبيب أو للصيدلي. ذلك يشمل أعراض جانبية محتملة لم تذكر في هذه النشرة (أنظر الفقرة 4 - «الأعراض الجانبية»).

معلومات هامة إقرأها بتمعن

- تحذير: يؤدي ميكوفينولات (mycophenolate) إلى إجهاضات وغيوب خلقية. لا يجوز بدء العلاج بميكوفينولات تيفع لدى نساء في سن الخصوبة، بدون فحص حمل سلبي قبل بداية العلاج.
- يجب الإنصياح لتعليمات منع الحمل التي أعطيت لك من قبل الطبيب المعالج.
- قبل تناول المستحضر، يجب إستشارة الطبيب ثانيةً وذلك في حال عدم فهمك لكامل التعليمات. لمعلومات إضافية، أنظر الفقرة «تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء» وفقرة «الحمل، منع الحمل والإرضاع».
- ينتمي الدواء لمجموعة الأدوية المثبطة للجهاز المناعي.
- إن الحرص على إتباع تعليمات الطبيب (الجرعة الدوائية، كيفية الإستعمال ومدة العلاج) يزيد من إحتتمالية نجاح العلاج. على أية حال، لا يجوز التوقف عن العلاج بدون إستشارة الطبيب المعالج. الرجاء إقرأ الفقرتين 2 و-4 بإمعان للحصول على معلومات موسعة حول الأمان.

1) لأي غرض مخصص الدواء؟

يستعمل الدواء ميكوفينولات تيفع، بمشاركة سيكلوسبورين وكورتيكوستيروئيدات، لمنع رفض عضو مزروع لدى زارعي الكلية، القلب أو الكبد.

الفصيلة العلاجية

أدوية مثبطة لجهاز المناعة

(Immunosuppressants).

2) قبل إستعمال الدواء

لا يجوز إستعمال الدواء إذا:

- كنت حساساً (أليرجي) لـ ميكوفينولات موفيتيل (mycophenolate mofetil)، لحمض ميكوفينوليك (mycophenolic acid)، أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (لقائمة المركبات غير الفعالة، أنظر الفقرة 6 - «معلومات إضافية»).
 - كنت امرأة في سن الخصوبة ولم تجتازي فحص حمل سلبي قبل الحصول على الوصفة الطبية الأولى لـ ميكوفينولات تيفع، ذلك لأن ميكوفينولات (mycophenolate) يسبب إجهاضات وغيوب خلقية.
 - كنت في فترة الحمل، تخططين للحمل أو تعتقدين بأنك حامل.
 - كنت امرأة في سن الخصوبة ولا تستعملين طرقاً ناجعة لمنع الحمل (لمعلومات إضافية، أنظري الفقرة «الحمل، منع الحمل والإرضاع»).
 - كنت مرضعة.
- إذا إنطبقت عليك إحدى الحالات المفصلة أعلاه، لا تتناول الدواء.
- إذا لم تكن واثقاً، راجع طبيبك المعالج أو الصيدلي قبل تناول ميكوفينولات تيفع.

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء

لا يجوز بدء العلاج بميكوفينولات تيفع ويجب مراجعة الطبيب المعالج حالاً إذا:

- وجدت لديك علامة لتلوث، مثل: سخونة أو ألم في الحنجرة.
- وجدت لديك كدمات أو أنزفة غير متوقعة.
- كنت تعاني أو عانيت في الماضي من مشاكل في الجهاز الهضمي (مثل: قرحة في المعدة).
- كنت تخططين للحمل، أو إذا أصبحت حاملاً خلال فترة العلاج بالدواء.
- إذا إنطبقت عليك إحدى الحالات المذكورة أعلاه (أو إذا لم تكن واثقاً)، راجع الطبيب المعالج حالاً، قبل تناول الدواء.

تأثير ضوء الشمس على العلاج

يُضعف ميكوفينولات تيفع من الآليات الدفاعية لجسمك. ونتيجة لذلك، تزداد الخطورة لتطور سرطان جلد. عليك الحد من تعرضك للشمس ولأشعة UV، وذلك بواسطة:

- إرتداء ملابس واقية التي تغطي أيضاً رأسك، رقبتك، ذراعيك ورجليك.
- إستعمال واقيات الأشعة ذات عامل وقاية مرتفع.

ميكوفينولات تيفع والأدوية الأخرى

إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخراً، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إحك للطبيب أو الصيدلي عن ذلك.

- من المهم القيام بذلك لأن الدواء ميكوفينولات تيفع قد يؤثر على طريقة عمل أدوية أخرى، وأدوية أخرى قد تؤثر على طريقة عمل ميكوفينولات تيفع. يجب إبلاغ الطبيب أو الصيدلي بالأخص إذا كنت تتناول الأدوية التالية وذلك قبل بدء العلاج بميكوفينولات تيفع:
- آزاثيوبرين أو أدوية أخرى مثبطة لجهاز المناعة، التي تعطى بعد عملية الزرع.
- كوليستيرامين - دواء لعلاج الكولسترول المرتفع.
- ريفامبيسين - مضاد حيوي مخصص لمنع وعلاج تلوّثات مثل السل (TB).
- مضادات الحموضة، أو مثبطات مضخة البروتونات (PPIs) - مستحضرات لعلاج مشاكل فرط الحموضة في المعدة مثلاً لعلاج عسر الهضم.
- مستحضرات رابطة للفوسفات - تعطى للمتعالجين الذين يعانون من قصور مزمن في الكلى، وذلك لتقليل كمية الفوسفات التي تمتص للدّم.
- مضادات حيوية - تستعمل لعلاج التلوثات الجرثومية.
- إيسافوكونازول - يستعمل لعلاج التلوثات الفطرية.
- تيلميسرتان - يستعمل لعلاج ضغط الدم المرتفع.

اللقاحات

إذا توجب عليك تلقي لقاح (لقاح حي - مضعف) بينما لا تزال متعالجاً بميكوفينولات تيفع، فعليك التوجه أولاً إلى الطبيب أو الصيدلي الخاص بك. يقدم لك الطبيب المعالج الإستشارة حول أي من اللقاحات يمكنك أن تتلقى.

التبرع بالدم

لا يجوز التبرع بالدم خلال فترة العلاج بميكوفينولات تيفع وحتى 6 أسابيع على الأقل بعد إنتهاء العلاج.

إستعمال الدواء والطعام

لا يوجد للطعام والشراب تأثير على العلاج بميكوفينولات تيفع.

الحمل، منع الحمل والإرضاع

منع الحمل لدى نساء يتناولن ميكوفينولات تيفع

لدى نساء في سن الخصوبة اللواتي وصف لهن علاج بميكوفينولات تيفع، يتوجب عليهن إستعمال طريقة ناجعة لمنع الحمل:

- قبل بدء العلاج بميكوفينولات تيفع.
 - خلال كامل فترة العلاج بميكوفينولات تيفع.
 - لمدة 6 أسابيع بعد التوقف عن العلاج بميكوفينولات تيفع.
- يجب إستشارة الطبيب المعالج بخصوص الوسائل الأكثر ملاءمة من أجلك لمنع الحمل. تحدد وسائل منع الحمل هذه بحسب حالتك. من المفضل إستعمال طريقتين من وسائل منع الحمل لأن هكذا تقل الخطورة لحدوث حمل غير مخطط له.
- يجب مراجعة الطبيب بأسرع ما يمكن إذا كنت تعتقدين بأن وسيلة منع الحمل لم تكن ناجعة أو إذا نسيت تناول قرص منع الحمل.
- إذا كان واحد من المعايير التالية ينطبق عليك، فأنت غير قادرة على الحمل:
- كنت امرأة بفترة سن اليأس، أي: عمرك 50 سنة على الأقل وتلقيت طمثك الأخير قبل أكثر من سنة (إذا توقف الطمث لديك جراء علاج السرطان، فلا يزال هناك إحتتمال أن تصبجي حاملاً).
 - إجترت عملية جراحية لإستئصال البوقين والمبيضين (Bilateral salpingo-oophorectomy).
 - إجترت عملية جراحية لإستئصال الرحم (Hysterectomy).
 - مبيضيك لا يعملان (فشل مبيضي مبكر، الذي تم تشخيصه من قبل طبيب مختص بالأمراض النسائية).
 - ولدت ولديك واحداً من الحالات النادرة التالية، التي لا تتمكن من الحمل: نمط جيني XY (XY genotype)، متلازمة تورنر (Turner syndrome) أو عدم تطور الرحم (Uterine agenesis).
 - كنت طفلة أو مراهقة، ولم تبدئي بعد بتلقي الطمث.

منع الحمل لدى رجال يتناولون ميكوفينولات تيفع

في حال يتناول الأب ميكوفينولات، لا تدل المعطيات المتوفرة على إرتفاع الخطورة لعيوب أو إجهاضات.

ومع ذلك، من غير الممكن النفي تماماً إمكانية الخطورة.

إذا كنت تخطط للحمل مع زوجتك، تحدث مع الطبيب حول المخاطر الممكنة والعلاجات البديلة.

الحمل والإرضاع

يجب إستشارة الطبيب المعالج أو الصيدلي قبل تناول المستحضر، وذلك إذا كنت في فترة الحمل، الرضاعة، تخططين للحمل أو تعتقدين بأنك حامل.

يتحدث معك الطبيب حول المخاطر خلال فترة الحمل وعن العلاجات البديلة التي يمكن تناولها من أجل منع رفض العضو المزروع، وذلك في الحالات التالية:

- كنت تخططين للحمل.
- لم تتلقي أو تعتقدين بأنك لم تتلقي الطمث، لديك نزف طمثي مختلف عن المعتاد، أو تشكين بأنك حامل.
- مارست علاقة جنسية دون إستعمال وسيلة منع حمل ناجعة.

يجب إبلاغ الطبيب حالاً إذا أصبحت حاملاً خلال فترة العلاج بميكوفينولات تيفع. مع ذلك، يجب مواصلة تناول ميكوفينولات تيفع حتى مقابلتك مع الطبيب.

الحمل

يؤدي ميكوفينولات إلى إجهاضات بشيوع عال جداً (50%) ولعيوب خلقية خطيرة (23%-27%). العيوب الخلقية التي بلغ عنها تشمل: عيوب في الأذنين، في العينين، في الوجه (إنشقاق الشفة/إنشقاق الحنك)، في نمو الأصابع، القلب، المريء (الأنبوب الذي يربط ما بين الحنجرة والمعدة)، في الكلى والجهاز العصبي (مثلاً إنشقاق العمود الفقري - عظام العمود الفقري لا تنمو كما ينبغي). قد يصاب رضيعك بواحد أو أكثر من العيوب المذكورة أعلاه.

لا يجوز بدء العلاج بميكوفينولات تيفع لدى نساء في سن الخصوبة، بدون فحص حمل سلبي قبل بدء العلاج. يجب الإنصياح لتعليمات منع الحمل التي أعطيت لك من قبل الطبيب المعالج. بإمكان الطبيب أن يطلب منك إجراء فحص حمل إضافي ليضمن بأنك لست حاملاً قبل بدء العلاج.

الإرضاع

لا يجوز إستعمال ميكوفينولات تيفع إذا كنت مرضعة، لأن كميات ضئيلة من الدواء قد تنتقل إلى حليب الأم.

السياقة وإستعمال الماكينات

ل ميكوفينولات تيفع تأثير متوسط على القدرة على السياقة أو إستعمال المعدات والماكينات. إذا شعرت بنعاس، خدر أو إرتباك، تحدث مع الطبيب أو الممرضة ولا تقوم بالسياقة أو إستعمال المعدات أو الماكينات إلى أن تشعر بشكل أفضل.

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء

يحتوي الدواء على المركب FD&C Red #40/Allura Red AC (E129) Aluminium lake، الذي قد يسبب ردود فعل تحسسية.

إن محتوى الدواء من الصوديوم هو أقل من 23 ملغ للقرص، بحيث يعتبر الدواء فعلياً خال من الصوديوم.

يتبع

3) كيفية إستعمال الدواء؟

يجب دائماً إستعمال الدواء حسب تعليمات الطبيب.

عليك الإستيضاح من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن واثقاً بخصوص الجرعة الدوائية وطريقة العلاج بالدواء.

الجرعة الدوائية الإعتيادية

الجرعة الدوائية وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط. تتعلق الجرعة الدوائية بنوع عملية الزرع التي إجتزتها. الجرعات الدوائية الإعتيادية مدوّنة أدناه.

يستمر العلاج لطالما هنالك حاجة في منع جسمك من رفض العضو المزروع.

لا يجوز تجاوز الجرعة الدوائية الموصى بها.

زراعة الكلية

الكبار:

• تغطي الجرعة الدوائية الأولى خلال 3 أيام من عملية الزرع.

• الجرعة الدوائية اليومية هي 2 غرام من ميكوفينولات تيفع، مقسمة إلى جرعتين دوائيتين منفردتين: 1 غرام في الصباح

و- 1 غرام في المساء.

الأطفال (بأعمار سنتين حتى 18 سنة):

• تتعلق الجرعة الدوائية بحجم الطفل.

• يحدد الطبيب المعالج الجرعة الدوائية الأنسب بحسب طول ووزن طفلك.

زراعة القلب

الكبار:

• تغطي الجرعة الدوائية الأولى خلال 5 أيام من عملية الزرع.

• الجرعة الدوائية اليومية هي 3 غرام من ميكوفينولات تيفع، مقسمة إلى جرعتين دوائيتين منفردتين: 1.5 غرام في الصباح

و- 1.5 غرام في المساء.

الأطفال:

• لا تتوفر معلومات بخصوص إعطاء ميكوفينولات تيفع للأطفال بعد زراعة قلب.

زراعة الكبد

الكبار:

• تغطي لك الجرعة الدوائية الأولى من ميكوفينولات تيفع بعد

4 أيام على الأقل من عملية الزرع وعندما تكون قادراً على بلع الأدوية.

• الجرعة الدوائية اليومية هي 3 غرام من ميكوفينولات تيفع، مقسمة إلى جرعتين دوائيتين منفردتين: 1.5 غرام في الصباح

و- 1.5 غرام في المساء.

الأطفال:

• لا تتوفر معلومات حول إعطاء ميكوفينولات تيفع للأطفال بعد زراعة الكبد.

كيفية إستعمال الدواء

يجب بلع الأقراص بشكلها الكامل، مع كأس من الماء.

لا يجوز مضغ، كسر أو سحق الأقراص. لا يجوز شطر الأقراص.

يجب تجنب التماس بين المسحوق وبين الجلد، العينين والفم.

إذا كسر القرص بالخطأ، فيجب غسل بقايا المسحوق عن الجلد بالماء والصابون. إذا دخل المسحوق في العينين / الفم، فيجب

الغسل جيداً بواسطة الكثير من الماء.

إذا تناولت بالخطأ جرعة دوائية أكبر أو إذا بلع طفل أو شخص

آخر بالخطأ من الدواء، توجه حالاً إلى الطبيب أو لغرفة الطوارئ

في المستشفى وأحضر معك علبة الدواء.

إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المطلوب، يجب تناول

جرعة دوائية حال تذكرك ومواصلة تناول الدواء في الأوقات

المحددة. لا يجوز تناول جرعة دوائية مضاعفة للتعويض عن

الجرعة الدوائية المنسية.

يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب.

إذا توقفت عن تناول الدواء

لا تتوقف عن العلاج بـ ميكوفينولات تيفع، إلا إذا أوصاك طبيبك

بفعل ذلك. إذا توقفت عن العلاج فقد تزيد من خطورة رفض العضو

المزروع.

لا يجوز التوقف عن العلاج بالدواء بدون إستشارة الطبيب حتى

ولو طراً تحسن على حالتك الصحية.

لا يجوز تناول أدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء

والتأكد من الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع

النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال الدواء، إستشر

الطبيب أو الصيدلي.

4) الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال ميكوفينولات تيفع قد يسبب أعراضاً

جانبية عند بعض المستعملين. لا تندش من قائمة الأعراض الجانبية.

من الجائز ألا تعاني أياً منها.

عليك التوجه إلى الطبيب في الحال إذا كنت تلاحظ واحداً من

الأعراض الجانبية الخطيرة التالية، من الجائز أن تحتاج لعلاج

طبي طارئ:

• لديك علامة لتلوث، مثل سخونة أو ألم في الحنجرة.

• كنت تعاني من كدمات أو أنزفة غير متوقعة.

• كنت تعاني من طفح، إنتفاخ في الوجه، في الشفتين، في اللسان أو

في الحنجرة، مع صعوبة في التنفس - من الجائز أن لديك رد فعل

تحسسي حاد للدواء (مثل صدمة إستهدافية، وذمة وعائية).

أعراض جانبية شائعة

بعض الأعراض الجانبية الشائعة أكثر هي: إسهال، قلة كريات الدم

البيضاء أو الحمراء في الدم، تلوث وتقيؤات. يجري الطبيب المعالج

فحوص دم منتظمة لتشخيص تغييرات في:

- عدد خلايا دمك أو علامات لحدوث تلوثات

قد يعاني الأطفال من الأعراض الجانبية التالية بإحتمال أكبر مما

هو عليه لدى الكبار: إسهال، تلوثات، قلة كريات الدم البيضاء وقلة

كريات الدم الحمراء.

الوقاية من التلوثات

يُضعف الدواء ميكوفينولات تيفع من الآليات الدفاعية لجسمك، وذلك

لمنعك من رفض العضو المزروع. نتيجة لذلك، فإن قدرة جسمك

على محاربة التلوثات تكون أقل جودة من الطبيعي. وبالتالي، قد

تصاب بتلوثات أكثر من المعتاد، بما في ذلك: تلوثات في الدماغ،

الجلد، الفم، المعدة، الأمعاء، الرئتين والجهاز البولي.

سرطان الجلد والليمفا

كما قد يحدث لدى متعالجين يتناولون أدوية من هذا النوع (أدوية

تثبط الجهاز المناعي)، فإن عدداً قليلاً جداً من المتعالجين الذين

تناولوا ميكوفينولات تيفع، طُوروا لديهم سرطان الأنسجة اللمفاوية

والجلد.

أعراض جانبية إضافية

قد تعاني من أعراض جانبية عامة التي تؤثر على كامل الجسم حيث

تشمل: ردود فعل تحسسية خطيرة (مثل صدمة إستهدافية، وذمة

وعائية)، سخونة، شعور بإرهاق شديد، صعوبات في النوم، آلام

(مثل: آلام في البطن، آلام في الصدر، آلام في المفاصل أو العضلات)،

صداع، أعراض الإنفلونزا وإنتفاخ.

أعراض جانبية أخرى يمكن أن تشمل:

مشاكل في الجلد، مثل: حب الشباب، قروح البرد، عقبولة المنطقة،

أورام في الجلد، تساقط الشعر، طفح وحكة.

مشاكل في الجهاز البولي، مثل: دم في البول.

مشاكل في الجهاز الهضمي والفم، مثل:

- إنتفاخ في اللثة وتقرحات في الفم.

- إلتهاب في البنكرياس، في الأمعاء الغليظة أو في المعدة.

- إضطرابات في الجهاز الهضمي تشمل نرف.

- إضطرابات في الكبد.

- إسهال، إمساك، غثيان، صعوبات هضمية، فقدان الشهية للطعام،

نفخة (غازات في الجهاز الهضمي).

مشاكل في الجهاز العصبي، مثل:

- دوار، ميل إلى النوم أو خدر.

- إرتجاف، تقلصات عضلية، تشنجات.

- الشعور بقلق أو إكتئاب، تغيرات في المزاج أو في الأفكار.

مشاكل قلبية ومشاكل في جهاز الدم، مثل:

- تغيرات بضغط الدم، نظم متسارع للقلب، توسع الأوعية

الدموية.

مشاكل في الرئتين، مثل:

- إلتهاب الرئتين، إلتهاب القصبات الهوائية (bronchitis).

- ضيق تنفس، سعال الذي قد ينتج عن توسع القصبات الهوائية

(bronchiectasis) - حالة تتوسع فيها الطرق الهوائية في الرئتين

بشكل شاذ) أو تليف رئوي (تندب في الرئتين). يجب إستشارة

الطبيب إذا تطور لديك سعال لا يتوقف أو ضيق في التنفس.

- سوائل في الرئتين أو في جوف الصدر.

- مشاكل في الجيوب الأنفية.

مشاكل إضافية مثل: انخفاض في الوزن، داء النقرس (gout)،

نسبة مرتفعة للسكر في الدم، أنزفة وكدمات.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم إحدى الأعراض الجانبية أو

عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك

إستشارة الطبيب حالاً.

التبليغ عن أعراض جانبية

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط

على الرابط «تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي» الموجود

على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.au)

(أ) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبليغ عن أعراض جانبية،

أو عن طريق تصفح الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.au>

5) كيفية تخزين الدواء؟

تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق

بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأطفال و/ أو الرضع، وذلك

لتفادي إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة

من الطبيب.

لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنقضاء تاريخ الصلاحية (Exp. Date)

الذي يظهر على ظهر العلبة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير

من نفس الشهر.

شروط التخزين: يجب التخزين في العلبة الأصلية، في مكان

جاف ومظلم، دون 25 درجة مئوية.

لا يجوز رمي الأدوية في المجاري أو سلة القمامة المنزلية. إسأل

الصيدلي عن كيفية التخلص من أدوية لم تعد قيد الإستعمال. إن إتخاذ

هذه الوسائل يساعد في الحفاظ على البيئة.

6) معلومات إضافية

يحتوي الدواء بالإضافة للمادة الفعالة أيضاً:

Microcrystalline cellulose, Croscarmellose sodium, Povidone,

Magnesium stearate.

HPMC 2910, Titanium dioxide, Macroglol/PEG 400, Talc,

FD&C Red #40/Allura Red AC Aluminium lake (E129), FD&C

Blue #2/Indigo carmine Aluminium lake.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة:

توجد بكل علبة أقراص بيضوية الشكل، الأقراص مطلية، ولونها

بنفسجي. مطبوع في جانب واحد من القرص الرقم 93، وفي الجانب

الثاني مطبوع الرقم 7477.

بكل علبة هناك 10، 30، 50 أو 60 قرصاً ضمن عبوة لويحة

(بليستر).

من الجائز ألا تسوّق كافة أحجام العلب.

إسم المنتج وصاحب الإمتياز وعنوانه:

تيفع للأدوية والمستحضرات الطبية م.ض.، ص.ب. 3190،

بيتح - تكفا.

تم إعداد النشرة في تشرين الثاني 2020، بموجب تعليمات وزارة

الصحة.

رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:

142.37.32978

من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة

المذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.