

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة
(مستحضرات) - 1986
يسوق الدواء بموجب وصفة طبيب فقط

كابيسيتابين تيقع كابيسيتابين تيقع 150 ملغ 500 ملغ

أقراص مطالية
التركيب:

يحتوي كل قرص على:

Capecitabine 500 mg Capecitabine 150 mg
كابيسيتابين 500 ملغ كابيسيتابين 150 ملغ

لمعلومات عن المواد غير الفعالة أنظر الفقرة 2 - «معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء» والفقرة 6 - «معلومات إضافية».

إنـاـنـشـرـةـ بـتـمـعـنـ حـتـىـ نـهـاـيـهـاـ قـبـلـ إـسـتـعـمـالـ لـلـدـوـاءـ.ـ تـحـتـويـ هـذـهـ

الـنـشـرـةـ عـلـىـ مـلـوـعـاتـ مـوجـزـةـ عـنـ الدـوـاءـ.ـ إـذـاـ توـفـرـ لـدـيـكـ أـسـتـهـلـ

إـضـافـيـةـ،ـ رـاجـعـ طـبـيـبـ أـوـ صـيـدـلـيـ.ـ

● إـحـفـظـ النـشـرـةـ مـنـ الجـائزـ أـنـ تـحـتـاجـ لـقـرـاءـتـهـ ثـانـيـةـ.

● وـصـفـ هـذـاـ دـوـاءـ لـعـاجـ مـرـضـكـ.ـ لـأـتـعـطـيـهـ لـلـآـخـرـينـ.ـ فـهـوـ قدـ يـضـرـهـ حـتـىـ

ولـوـ بـدـاـ لـكـ أـنـ مـرـضـهـ مـشـابـهـ لـمـرـضـكـ.ـ

● إـذـاـ وـجـدـتـ لـدـيـكـ أـيـةـ أـعـراضـ جـانـبـيـةـ،ـ رـاجـعـ طـبـيـبـ أـوـ صـيـدـلـيـ.ـ ذـلـكـ

يـشـمـلـ أـعـراضـ جـانـبـيـةـ مـحـتمـلـةـ لـمـ تـذـكـرـ فـيـ هـذـهـ النـشـرـةـ (ـأـنـظـرـ الفـقـرـةـ 4ـ

ـ «ـالـأـعـراضـ جـانـبـيـةـ»ـ).

1) لأـيـ غـرـضـ مـخـصـصـ الدـوـاءـ؟

يـنـتـمـيـ الدـوـاءـ كـابـيـسـيـتـابـينـ تـيقـعـ إـلـىـ فـصـيـلـةـ الـأـدوـيـةـ الـمـسـمـاـةـ «ـأـدوـيـةـ الرـكـوـدـ

الـخـلـويـ»ـ،ـ الـتـيـ تـوـقـعـ تـطـورـ الـخـلـاـيـاـ السـرـطـانـيـةـ.ـ كـابـيـسـيـتـابـينـ تـيقـعـ بـحـدـ

مـضـادـ لـلـسـرـطـانـ بـعـدـ إـمـتـصـاصـهـ فـيـ الـجـسـمـ فـقـطـ (ـفـيـ نـسـيجـ الـوـرـمـ أـكـثـرـ مـاـ

هـوـ عـلـىـ فـيـ نـسـيجـ الـطـبـيـعـيـ).

إـنـ إـسـتـعـمـالـ الدـوـاءـ كـابـيـسـيـتـابـينـ تـيقـعـ هـوـ لـمـعـالـجـ سـرـطـانـ الـثـيـ بـعـدـ عـلـاجـاتـ

سـاـبـقـةـ،ـ سـرـطـانـ الـمـعـدـةـ وـسـرـطـانـ الـقـولـونـ وـالـمـسـتـقـيمـ.ـ إـضـافـيـةـ لـذـلـكـ،ـ يـسـتـعـمـلـ

كـابـيـسـيـتـابـينـ تـيقـعـ لـمـعـنـ تـكـرـ سـرـطـانـ الـقـولـونـ،ـ وـذـلـكـ بـعـدـ إـسـتـئـصـالـ كـامـلـ

لـلـوـرـمـ بـوـاسـطـةـ عـلـيـةـ جـراـحـيـةـ.ـ

بـالـإـمـكـانـ تـناـولـ الدـوـاءـ كـابـيـسـيـتـابـينـ تـيقـعـ لـوـحـدـهـ أـوـ بـمـشارـكـةـ أـدوـيـةـ إـضـافـيـةـ.

الفصيلة العلاجية

من قرائين البيريميدين.

2) قبل إستعمال الدواء

لا يجوز إستعمال الدواء إذا:

● كنت حساساً (اليرجي) لل المادة الفعالة (Capecitabine) أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (أنظر الفقرة 6 - «معلومات إضافية»). عليك إبلاغ طبيبك إذا كنت تعرف بأن لديك اليرجيا أو حساسية لهذا الدواء.

● حدثت لديك في الماضي ردود فعل خطيرة للعلاج بـفلوروبيريميدينات (مجموعة أدوية مضادة للسرطان مثل فلوروفوراسييل).

● كنت في فترة الحمل أو الرضاعة وُجد لديك نسب منخفضة جداً في الدم لخلايا الدم البيضاء أو الصفائح الدموية (قلة كريات الدم البيضاء، قلة العدلات أو قلة الصفائح الدموية).

● وُجد لديك مشاكل خطيرة في الكبد أو في الكلى.

● علمت بأنه لا يوجد لديك أي نشاط في الإنزيم المسمى Dihydropyrimidine dehydrogenase (DPD).

● كنت تتعالج حالياً أو عولجت خلال الأسابيع الأربع الأخيرة بـبريفودين (بريفودين herpes zoster) كجزء من العلاج بـherpes zoster (جدرى الماء أو عقبولة المنطقة).

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء

قبل العلاج بـ كابيسيتابين تيقع إحدى طبيبي إذا:

● علمت بأن لديك نقص جزئي في نشاط الإنزيم Dihydropyrimidine dehydrogenase (DPD).

● كنت تعاني من أمراض في الكبد أو في الكلى.

● كنت تعاني أو عانيت في الماضي من مشاكل قلبية (مثلاً، عدم إنتظام نظم القلب أو آلام في الصدر، في الفك وفي الظهر ناتجة عن جهد بدني، وكتنجة مشاكل في جريان الدم إلى القلب).

● كنت تعاني من أمراض متعلقة بالدماغ (مثلاً، سرطان الذي ينتشر للدماغ أو مرض عصبي محيطي - اعتلال عصبي).

● كنت تعاني من عدم توازن بمستويات الكالسيوم (الذي يظهر في فحوص الدم).

● كنت تعاني من السكري.

● كنت قادر على إبقاء طعام أو شراب في جسمك بسبب غثيان وتقيؤات شديدة.

● كنت تعاني من إسهالات.

● كنت تعاني من فقدان سوائل (تجفاف).

● كنت تعاني من عدم توازن الشوارد في دمك (نقص في توازن الشوارد الكهربائية، الذي يظهر في فحوص الدم).

● عانيت في الماضي من مشاكل في العينين، من الجائز أن تحتاج لإجراء متابعة إضافية لحالة عينيك.

● لديك رد فعل جلدي شديد.

نقص في DPD

نقص في DPD هي حالة خلقيّة نادرة ليس لها عادة صلة بمشاكل صحية، إلا إذا كنت تتناول أدوية معينة. إذا كنت تعاني من نقص في DPD غير مشخص وكانت ت تعالج بالدواء كابيسيتابين تيقع، فأنت معرض لخطورة زائدة في أن يتتطور لديك بشكل حاد ومبكر شكل خطير من الأعراض الجانبية، كما هو مفصل في الفقرة 4 - «الأعراض الجانبية». إنّصّل بطبّيتك الذي يعالجك بشكل فوري إذا كنت قلقاً بشأن إحدى الأعراض الجانبية أو إذا لاحظت أعراض جانبية إضافية لم تذكر في هذه النشرة (أنظر الفقرة 4 - «الأعراض الجانبية»).

الأطفال والمرأهقون

هذا الدواء غير مخصص للعلاج لدى الأطفال والمرأهقين. لا يجوز إعطاء الدواء كابيسيتابين تيقع للأطفال والمرأهقين.

التدخلات بين الأدوية

إذا كنت تتناول مؤخراً أو من شأنك أن تتناول أدوية أخرى، بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إحدى طبيبي أو الصيدلي عن ذلك. من المهم جداً فعل ذلك لأن تناول عدة أدوية بنفس الوقت يمكن أن يزيد أو يضعف من تأثير الأدوية.

لا تتناول بريقوودين (دواء مضاد للفيروسات لعلاج عقبولة المنطقة أو جدرى الماء) بالتزامن مع العلاج بـ كابيسيتابين (بما في ذلك خلال كافة فترات التوقف بين العلاجات (فترات الراحة) عندما لا تتناول أية أقراص كابيسيتابين).

إذا تناولت بريقوودين فعليك الإنظار 4 أسابيع على الأقل بعد التوقف عن العلاج بـ بريقوودين قبل بدء تناول أي من كابيسيتابين. أنظر أيضاً الفقرة «لا يجوز إستعمال الدواء إذا».

بالإضافة لذلك، يجب توخي الحذر خاصة إذا كنت تتناول:

● أدوية لعلاج داء القرنس (gout) (اللوپورينول).

● أدوية لتمييع الدم (كومارين، وارفارين).

● أدوية لإخلالات أو الرجفان (فينيتوكين).

● إنترفيرون ألفا.

علاجاً بالأشعة وأدوية معينة لمعالجة السرطان [حمض الفولينيك (acid folinic)، أوكساليپلاتين (oxaliplatin)، بيفاسيزوماب (bevacizumab)، سيسيلاتين (cisplatin)، إيرينوتican (irinotecan)].

● أدوية لمعالجة نقص حمض الفوليك.

إستعمال الدواء مع الطعام والشراب

يتوجب عليك تناول الدواء ليس أكثر من 30 دقيقة بعد وجبة الطعام.

الحمل والإرضاع

إذا كنت في فترة الحمل أو مرضعة، تعتقدين بأنك حامل أو تخططين للحمل، إستشيري الطبيب أو الصيدلي قبل إستعمال الدواء.

ممنوع عليك تناول كابيسيتابين تيقع إذا كنت حاملاً أو إذا كنت تعتقدين بأنك حامل. ممنوع عليك الإرضاع خلال فترة العلاج بـ كابيسيتابين تيقع وأسبوعين بعد تناول الدواء كابيسيتابين تيقع، فإذا كنت إمراة بإمكانها الحمل فعليك إستعمال وسائل منع حمل ناجحة خلال العلاج بـ كابيسيتابين تيقع وخلال مدة 6 أشهر بعد تناول المقدار الدوائي الأخير.

إذا كنت متعالجاً ذكراً وزوجتك بإمكانها الحمل، فعليكما إستعمال وسائل منع حمل ناجحة خلال فترة العلاج بـ كابيسيتابين تيقع وخلال مدة 3 أشهر بعد تناول المقدار الدوائي الأخير.

السيارة وإستعمال الماكينات

إن إستعمال هذا الدواء قد يؤدي إلى حدوث دوار، غثيان أو إرهاق ولذلك من الجائز أن يضعف كابيسيتابين تيقع من قدرتك على القيادة بالسيارة أو تشغيل الماكينات.

نقط في DPD

نقط في DPD هي حالة خلقيّة نادرة ليس لها عادة صلة بمشاكل صحية، إلا إذا كنت تتناول أدوية معينة. إذا كنت تعاني من نقص في DPD غير مشخص وكانت ت تعالج بالدواء كابيسيتابين تيقع، فأنت معرض لخطورة زائدة في أن يتتطور لديك بشكل حاد ومبكر شكل خطير من الأعراض الجانبية، كما هو مفصل في الفقرة 4 - «الأعراض الجانبية».

● كنت تعاني أو عانيت في الماضي من مشاكل قلبية (مثلاً، عدم إنتظام نظم القلب أو آلام في الصدر، في الفك وفي الظهر ناتجة عن جهد بدني، وكتنجة مشاكل في جريان الدم إلى القلب).

● كنت تعاني من أمراض متعلقة بالدماغ (مثلاً، سرطان الذي ينتشر للدماغ أو مرض عصبي محيطي - اعتلال عصبي).

● كنت تعاني من عدم توازن بمستويات الكالسيوم (الذي يظهر في فحوص الدم).

● كنت تعاني من السكري.

● كنت قادر على إبقاء طعام أو شراب في جسمك بسبب غثيان وتقيؤات شديدة.

لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به.

يمكن لطبيتك أن يوصي على مزيج من أقراص كابيسيتابين تيقع 150 ملغ و 500 ملغ بكل مقدار دوائي.

طريقة الإستعمال

● عليك تناول الأقراص في الصباح وفي المساء، كما وصف لك الطبيب.

● عليك تناول الأقراص خلال 30 دقيقة بعد الإنتهاء من وجبة الطعام (وجبة الصباح ووجبة المساء).

● لا يجوز سحق، شطر أو مضغ الأقراص. إن تعرض العلاج أو المتاعج لفقرن كابيسيتابين تيقع، فأنت معرض لخطر انتشار المرض.

● فقط طبيب مختص بالعلاج بالأدوية المضادة للسرطان (مختص بالأورام يمكنه أن يصف الدواء كابيسيتابين تيقع).

● المقدار الدوائي الإعتيادي للكمار هو، عادة، 1250 ملغ لمتر مربع من مساحة سطح الجسم، مرتين في اليوم (في الصباح والمساء).

فيما يلي مثالين للتوضيح: شخص وزنه 64 كلغ وطوله 1.64 متر، يكون

ذو مساحة سطح جسم 1.7 متر مربع ويتعجب عليه تناول 4 أقراص من عيار 500 ملغ وقرص واحد من عيار 150 ملغ مرتبطة بـDPD.

شخص وزنه 80 كلغ وطوله 1.80 متر، يكون ذو مساحة سطح جسم 2.0 متر مربع، ويتعجب عليه تناول 5 أقراص من عيار 500 ملغ مرتبطة بـDPD.

● يرجى تناول المقدار الدوائي الموصى به.

● يمكن لطبيتك أن يوصي على مزيج من أقراص كابيسيتابين تيقع 150 ملغ و 500 ملغ بكل مقدار دوائي.

الإرشادات

● عليك تناول الأقراص في الصباح وفي المساء، كما وصف لك الطبيب.

● عليك تناول الأقراص خلال 30 دقيقة بعد الإنتهاء من وجبة الطعام (وجبة الصباح ووجبة المساء).

● لا يجوز سحق، شطر أو مضغ الأقراص. إن تعرض العلاج أو المتاعج لفقرن كابيسيتابين تيقع، فأنت معرض لخطر انتشار المرض.

● فقط طبيب مختص بالعلاج بالأدوية المضادة للسرطان (مختص بالأورام يمكنه أن يصف الدواء كابيسيتابين تيقع).

● المقدار الدوائي الإعتيادي للكمار هو، عادة، 1250 ملغ لمتر مربع من مساحة سطح الجسم، مرتبطة بـDPD.

فيما يلي مثالين للتوضيح: شخص وزنه 64 كلغ وطوله 1.64 متر، يكون

ذو مساحة سطح جسم 1.7 متر مربع ويتعجب عليه تناول 4 أقراص من عيار 500 ملغ وقرص واحد من عيار 150 ملغ مرتبطة بـDPD.

شخص وزنه 80 كلغ وطوله 1.80 متر، يكون ذو مساحة سطح جسم 2.0 متر مربع، ويتعجب عليه تناول 5 أقراص من عيار 500 ملغ مرتبطة بـDPD.

لا يجوز تناول أدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكيد من المقدار الدوائي في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

4) الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال كاپيسیتابین تيقع قد يسبب أعراضًا جانبية عند بعض المستعملين. لا تنهش من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني أي منها.

توقف عن تناول كاپيسیتابین تيقع بشكل فوري وتوجه إلى الطبيب إذا ظهرت إحدى الأعراض التالية:

- إسهالات: إذا كان عدد مرات التبرز لديك في اليوم أكبر بـ 4 مرات أو أكثر مقارنة بالحالة العاديه أو إذا عانيت من إسهال خلال الليل.
- تقبيات: إذا تقيأت أكثر من مرة واحدة خلال 24 ساعة.
- غثيان: إذا كنت تعاني من فقدان الشهية للطعام ونقص واضح بكمية الطعام التي تستهلكها في اليوم.
- إلتهاب مخاطية الفم (stomatitis): إذا كنت تعاني من ألم، إحمرار، إنتفاخ أو حساسية في الفم /أو في الحنجرة.
- رد فعل جلدي في راحتي اليدين والقدمين: إذا كنت تعاني من ألم، إنتفاخ، إحمرار أو وحز في اليدين /أو في راحتي القدمين.
- سخونة: إذا كنت تعاني من سخونة قدرها 38 درجة مئوية وما فوق.
- تلوث: إذا وجدت لديك علامات لتلوث ناتج عن جرثوم أو فيروس، أو كائنات عضوية أخرى.
- ألم في الصدر: إذا كنت تعاني من آلام في منطقة مركز الصدر، خاصة إذا كانت تحدث أثناء نشاط.
- متلازمة ستيفنس - جونسون: إذا كنت تعاني من طفح أحمر أو مائل للبنفسجي، مؤلم، ومنتشر، وحويصلات و/أو آفات أخرى تبدأ في الظهور في الأنسجة المخاطية (مثلاً، في الفم والشفتين)، خاصة إذا كانت لديك قبل ذلك حساسية للضوء، تلوثات في جهاز التنفس (مثلاً، إلتهاب مخاطية الفم (stomatitis)، إلتهاب الأنسجة المخاطية، إسهال، قلة عدد العدلات في الدم (neutropenia)، تسمم متعلق بالجهاز العصبي).

نقص في DPD: إذا كان من المعلوم بأن لديك نقص في إنزيم Dihydropyrimidine dehydrogenase (DPD) فأنت معرض لخطورة زائدة لتطور تسمم حاد ومبكر وأعراض جانبية خطيرة تتشكل خطراً على الحياة أو قد تسبب حدوث الوفاة ناجمة عن كاپيسیتابین تيقع [مثلاً، إلتهاب مخاطية الفم (stomatitis)، إلتهاب الأنسجة المخاطية، إسهال، قلة عدد العدلات في الدم (neutropenia)، تسمم متعلق بالجهاز العصبي].

إذا تم تشخيص تلك الأعراض الجانبية في مرحلة مبكرة، فسوف يحدث عادة تحسن في الأعراض خلال يومين - ثلاثة أيام من التوقف عن العلاج. إذا ما زالت الأعراض الجانبية مستمرة رغم ذلك، توجه حالاً إلى الطبيب المعالج. من الجائز أن يرشدك الطبيب بدء العلاج من جديد بمقدار دوائي أخفض. رد فعل جلدي في راحتي اليدين الذي قد يؤثر على التعرف عليك بواسطة قارئ بصمات الأصابع، عندما يكون كاپيسیتابین تيقع علاجاً منفردًا فإن أعراض جانبية شائعة جداً - (very common)، التي تظهر لدى أكثر من مستعمل واحد من بين عشرة هي:

- ألم في البطن
- طفح، جفاف أو حكة في الجلد
- إرهاق
- فقدان الشهية للطعام (anorexia).

تلك الأعراض الجانبية قد تتفاقم، ولذلك من المهم دائمًا التوجّه إلى الطبيب المعالج حالاً مع ظهور عرض جانبي. من الجائز أن يرشدك الطبيب المعالج بتحفيض المقدار الدوائي و/أو التوقف عن العلاج بـ كاپيسیتابین تيقع بشكل مؤقت، وذلك للتقليل من إحتمال إستمرار أو تفاقم العرض الجانبي.

أعراض جانبية إضافية:

أعراض جانبية شائعة (common) أعراض تظهر لدى حتى مستعمل واحد من بين 10:

- إنخفاض في عدد خلايا الدم البيضاء أو الحمراء (الذي يظهر في فحوص الدم)
- تجفاف، تناقص الوزن
- أرق (insomnia)، إكتئاب
- صداع، الميل للنوم، دوار، شعور شاذ في الجلد (خدر أو الشعور بوحـز).
- تغيرات في المذاق
- تهيج في العين، إفراز زائد للدموع، إحمرار العين (إلتهاب ملتحمة العين)
- إلتهاب في الأوردة (إلتهاب الوريد الخثاري - thrombophlebitis)
- ضيق تنفس، رعاف، سعال، رشح
- جروح البرد أو تلوثات أخرى للعقوبة
- تلوثات في الرئتين أو في جهاز التنفس (مثلاً، إلتهاب الرئتين أو إلتهاب القصبات الهوائية - bronchitis)
- نزف من الجهاز الهضمي، إمساك، آلام في أعلى البطن، صعوبات هضمـية، فانصـفـنـ منـ الغـازـاتـ، جـفـافـ الـفـمـ
- طفح جلدي، تساقط شعر (alopecia)، إحمرار الجلد، جفاف الجلد، حـكةـ فيـ الجـلدـ، تـغـيـرـاتـ بـلـوـنـ الجـلدـ، فـقـدانـ جـلـدـ، إـلـهـابـ الجـلدـ، مشـاـكـلـ فـيـ الأـظـافـرـ
- آلام في المفاصل أو في الأطراف، آلام في الصدر، آلام في الظهر
- سخونة، إنتفاخ الأطراف، الشعور بوعـكةـ
- مشاكل في الأداء الوظيفي للقلب (التي تظهر في فحوص الدم) وإرتفاع نسبة البيليروبين (الذى يتم إفرازه من الكبد) في الدم

أعراض جانبية غير شائعة (uncommon) أعراض تظهر لدى حتى مستعمل واحد من بين 100:

- تلوث في الدم، تلوث في المسالك البولية، تلوث في الجلد، تلوثات في الأنف والحنجرة، تلوثات فطرية (تشمل تلوثات في الفم)، إنفلونزا، إلتهاب الرئتين أو إلتهاب المعدة والأمعاء (gastroenteritis)، خراج (abscess) في الأسنان
- كتل من تحت الجلد (أورام في النسيج الشحمي - lipoma)
- تناقص عدد خلايا الدم يشمل الصفيحات الدموية، تبعيـنـ الدـمـ (يـظـهـرـ فيـ فـحـوصـ الدـمـ)
- حساسية
- سكري، تناقص نسب البوتاسيوم في الدم، سوء تغذية، إرتفاع نسب التريجيـلـيسـيرـيدـاتـ فيـ الدـمـ
- الشعور بإرتباك، نوبات من القلق، مزاج إكتئابـيـ، تناقص الرغبة الجنسـيةـ
- صعوبات في النطق، ضرر في الذاكرة، تضرر التنفسـ والـحرـكةـ، إختـلالـ التـوازنـ، إـغـماءـاتـ، إـصـابةـ عـصـبـيـ (اعتـلالـ عـصـبـيـ)ـ وإـضـطـرـابـاتـ فيـ الـحسـ
- تشوش الرؤية أو إزدواج الرؤية
- ترنج (دوخـةـ)، ألم في الأذنـينـ
- عدم إنتظام نظم القلب وضربات قلب (لا نظمـيـةـ)، آلام في الصدر ونبـوةـ قـلـبيـةـ
- خرارات دموية في الأوردة العميقة، ضغطـ دـمـ مرـتفـعـ أوـ منـخـفـضـ، هـبـاتـ منـ الحرـ، الشـعـورـ بـبـرـودـةـ فيـ الأـطـرافـ، بـقـعـاـ حـمـراءـ حرـشـفـيـةـ/ـمـقـشـرـةـ نـتـيـجـةـ مـرـضـ فيـ جـهاـزـ الـمنـاعـةـ

أعراض جانبية نادرة جداً (very rare) أعراض تظهر لدى حتى مستعمل واحد من بين 10000:

- رد فعل جلدي خطير، مثل طفح جلدي، تقرحات وحويصلات يمكن أن تظهر في الفم، في الأنف، في الذاكرة، تضرر التنفسـ والـحرـكةـ، إختـلالـ التـوازنـ، إـغـماءـاتـ، إـصـابةـ عـصـبـيـ (اعتـلالـ عـصـبـيـ)ـ وإـضـطـرـابـاتـ فيـ الـحسـ
- إنتفاخ في العين يسبب ألمًا في العين ومشاكل محتملة في الرؤية
- إلتهاب في الجلد يسبب بقعًا حمراء حرشـفـيـةـ/ـمـقـشـرـةـ نـتـيـجـةـ مـرـضـ فيـ جـهاـزـ الـمنـاعـةـ

أعراض جانبية نادرة جداً (very rare) أعراض تظهر لدى حتى مستعمل واحد من بين 100000:

- إنتفاخات معينة في فحص التخطيط الكهربائي للقلب (إطالة مقطع QT).
- أنواع معينة لإضطرابات في نظم القلب (تشمل رجفان بطيني، اضطراب torsade de pointes في القلب)
- كتل من تحت الجلد (أورام في النسيج الشحمي - lipoma)
- تناقص عدد خلايا الدم يشمل الصفيحات الدموية، تبعيـنـ الدـمـ (يـظـهـرـ فيـ فـحـوصـ الدـمـ)
- 斯基ـرـيـ، تـنـاـقـصـ نـسـبـ الـبـوتـاسـيـوـمـ فيـ الدـمـ، سـوـءـ تـغـذـيـةـ، إـرـتـفـاعـ نـسـبـ التـريـجيـلـيسـيرـيدـاتـ فيـ الدـمـ
- الشعور بإرتباك، نوبات من القلق، مزاج إكتئابـيـ، تناقص الرغبة الجنسـيةـ
- صعوبـةـ التـبـولـ، دـمـ أوـ بـرـوتـينـ فيـ الـبـولـ
- علامات لإصـابةـ أوـ رـدـ فعلـ فيـ مـكـانـ الـحـقـنـ (نـاتـجـةـ عنـ الأـدوـيـةـ الـتـيـ تـعـطـىـ بـالـحـقـنـ فيـ نـفـسـ الـوقـتـ)

أعراض جانبية نادرة (rare) أعراض تظهر لدى حتى مستعمل واحد من بين 1000:

- تقرحات في الجلد وحويصلات، رد فعل جلدي لضوء الشمس، إحمرار راحتي اليدين، إنتفاخ أو ألم في منطقة الوجه
- إنتفاخ أو تصلب المفاصل، آلام في العظام، ضعف أو تصلب العضلات
- تراكم سوائل في الكلى، التبول بتواء أكبر خلال الليل، سلس البول، دم في البول، إرتفاع نسبة الكرياتينين في الدم (علامة لمشكلة في الكلى).
- نزف شاذ من المهبـلـ
- إنتفاخ (وذمة)، قشرـيرـةـ وـرـجـفـانـ

قسم من تلك الأعراض الجانبية يحدث بشيوع أكبر بالإستعمال المشترك كـ كاپيسیتابین تيقع مع أدوية أخرى لعلاج السرطان.

أعراض جانبية إضافية التي تم ملاحظتها عند إستعمال هذا المزيج وهي:

- إنخفاض نسب الصوديوم، المغنيزيوم أو الكالسيوم في الدم، إرتفاع نسبة السكر في الدم
- ألم عصبي
- أزيز أو طنين في الأذنين (tinnitus)
- إلتهاب الوريد
- حـازـوـقةـ، تـغـيـرـاتـ فيـ الصـوـتـ
- ألم أو شعور مختلف/ شاذ في الفم، ألم في الفك
- تـعرـقـ، تـعرـقـ لـلـيـلـيـ
- تـقلـصـاتـ عـضـلـيةـ
- صـعـوبـةـ التـبـولـ، دـمـ أوـ بـرـوتـينـ فيـ الـبـولـ
- علامات لإصـابةـ أوـ رـدـ فعلـ فيـ مـكـانـ الـحـقـنـ (نـاتـجـةـ عنـ الأـدوـيـةـ الـتـيـ تـعـطـىـ بـالـحـقـنـ فيـ نـفـسـ الـوقـتـ)

أعراض جانبية شائعة (common) أعراض تظهر لدى حتى مستعمل واحد من بين 10:

- عدم تناول نسب الصوديوم، المغنيزيوم أو الكالسيوم في الدم في الفم، إرتفاع نسبة السكر في الدم
- ألم عصبي
- أزيز أو طنين في الأذنين (tinnitus)
- إلتهاب الوريد
- حـازـوـقةـ، تـغـيـرـاتـ فيـ الصـوـتـ
- ألم أو شعور مختلف/ شاذ في الفم، ألم في الفك
- تـعرـقـ، تـعرـقـ لـلـيـلـيـ
- تـقلـصـاتـ عـضـلـيةـ
- صـعـوبـةـ التـبـولـ، دـمـ أوـ بـرـوتـينـ فيـ الـبـولـ
- علامات لإصـابةـ أوـ رـدـ فعلـ فيـ مـكـانـ الـحـقـنـ (نـاتـجـةـ عنـ الأـدوـيـةـ الـتـيـ تـعـطـىـ بـالـحـقـنـ فيـ نـفـسـ الـوقـتـ)

أعراض جانبية نادرة (rare) أعراض تظهر لدى حتى مستعمل واحد من بين 100:

- تقرحات في الجلد وحويصلات، رد فعل جلدي لضوء الشمس، إحمرار راحتي اليدين، إنتفاخ أو ألم في منطقة الوجه
- إنتفاخ أو تصلب المفاصل، آلام في العظام، ضعف أو تصلب العضلات
- تراكم سوائل في الكلى، التبول بتواء أكبر خلال الليل، سلس البول، دم في البول، إرتفاع نسبة الكرياتينين في الدم (علامة لمشكلة في الكلى).
- نزف شاذ من المهبـلـ
- إنتفاخ (وذمة)، قشرـيرـةـ وـرـجـفـانـ

أعراض جانبية نادرة جداً (very rare) أعراض تظهر لدى حتى مستعمل واحد من بين 1000:

- إنتفاخات معينة في فحص التخطيط الكهربائي للقلب (إطالة مقطع QT).
- أنواع معينة لإضطرابات في نظم القلب (تشمل رجفان بطيني، اضطراب torsade de pointes في القلب)
- كتل من تحت الجلد (أورام في النسيج الشحمي - lipoma)
- تناقص عدد خلايا الدم يشمل الصفيحات الدموية، تبعيـنـ الدـمـ (يـظـهـرـ فيـ فـحـوصـ الدـمـ)
- 斯基ـرـيـ، تـنـاـقـصـ نـسـبـ الـبـوتـاسـيـوـمـ فيـ الدـمـ، سـوـءـ تـغـذـيـةـ، إـرـتـفـاعـ نـسـبـ التـريـجيـلـيسـيرـيدـاتـ فيـ الدـمـ
- الشعور بإرتباك، نوبات من القلق، مزاج إكتئابـيـ، تناقص الرغبة الجنسـيةـ
- صـعـوبـةـ التـبـولـ، دـمـ أوـ بـرـوتـينـ فيـ الـبـولـ
- علامات لإصـابةـ أوـ رـدـ فعلـ فيـ مـكـانـ الـحـقـنـ (نـاتـجـةـ عنـ الأـدوـيـةـ الـتـيـ تـعـطـىـ بـالـحـقـنـ فيـ نـفـسـ الـوقـتـ)

أعراض جانبية نادرة (rare) أعراض تظهر لدى حتى مستعمل واحد من بين 10000:

- تقرحات في الجلد وحويصلات، رد فعل جلدي لضوء الشمس، إحمرار راحتي اليدين، إنتفاخ أو ألم في منطقة الوجه
- إنتفاخ أو تصلب المفاصل، آلام في العظام، ضعف أو تصلب العضلات
- تراكم سوائل في الكلى، التبول بتواء أكبر خلال الليل، سلس البول، دم في البول، إرتفاع نسبة الكرياتينين في الدم (علامة لمشكلة في الكلى).
- نزف شاذ من المهبـلـ
- إنتفاخ (وذمة)، قشرـيرـةـ وـرـجـفـانـ

أعراض جانبية نادرة جداً (very rare) أعراض تظهر لدى حتى مستعمل واحد من بين 100000:

- إنتفاخات معينة في فحص التخطيط الكهربائي للقلب (إطالة مقطع QT).
- أنواع معينة لإضطرابات في نظم القلب (تشمل رجفان بطيني، اضطراب torsade de pointes في القلب)
- كتل من تحت الجلد (أورام في النسيج الشحمي - lipoma)
- تناقص عدد خلايا الدم يشمل الصفيحات الدموية، تبعيـنـ الدـمـ (يـظـهـرـ فيـ فـحـوصـ الدـمـ)
- 斯基ـرـيـ، تـنـاـقـصـ نـسـبـ الـبـوتـاسـيـوـمـ فيـ الدـمـ، سـوـءـ تـغـذـيـةـ، إـرـتـفـاعـ نـسـبـ التـريـجيـلـيسـيرـيدـاتـ فيـ الدـمـ
- الشعور بإرتباك، نوبات من القلق، مزاج إكتئابـيـ، تناقص الرغبة الجنسـيةـ
- صـعـوبـةـ التـبـولـ، دـمـ أوـ بـرـوتـينـ فيـ الـبـولـ
- علامات لإصـابةـ أوـ رـدـ فعلـ فيـ مـكـانـ الـحـقـنـ (نـاتـجـةـ عنـ الأـدوـيـةـ الـتـيـ تـعـطـىـ بـالـحـقـنـ فيـ نـفـسـ الـوقـتـ)

أعراض جانبية نادرة جداً (very rare) أعراض تظهر لدى حتى مستعمل واحد من بين 1000000:

- إنتفاخات معينة في فحص التخطيط الكهربائي للقلب (إطالة مقطع QT).
- أنواع معينة لإضطرابات في نظم القلب (تشمل رجفان بطيني، اضطراب torsade de pointes في القلب)
- كتل من تحت الجلد (أورام في النسيج الشحمي - lipoma)
- تناقص عدد خلايا الدم يشمل الصفيحات الدموية، تبعيـنـ الدـمـ (يـظـهـرـ فيـ فـحـوصـ الدـمـ)
- 斯基ـرـيـ، تـنـاـقـصـ نـسـبـ الـبـوتـاسـيـوـمـ فيـ الدـمـ، سـوـءـ تـغـذـيـةـ، إـرـتـفـاعـ نـسـبـ التـريـجيـلـيسـيرـيدـاتـ فيـ الدـمـ
- الشعور بإرتباك، نوبات من القلق، مزاج إكتئابـيـ، تناقص الرغبة الجنسـيةـ
- صـعـوبـةـ التـبـولـ، دـمـ أوـ بـرـوتـينـ فيـ الـبـولـ
- علامات لإصـابةـ أوـ رـدـ فعلـ فيـ مـكـانـ الـحـقـنـ (نـاتـجـةـ عنـ الأـدوـيـةـ الـتـيـ تـعـطـىـ بـالـحـقـنـ فيـ نـفـسـ الـوقـتـ)

أعراض جانبية نادرة جداً (very rare) أعراض تظهر لدى حتى مستعمل واحد من بين 10000000:

- إنتفاخات معينة في فحص التخطيط الكهربائي للقلب (إطالة مقطع QT).
- أنواع معينة لإضطرابات في نظم القلب (تشمل رجفان بطيني، اضطراب torsade de pointes في القلب)
- كتل من تحت الجلد (أورام في النسيج الشحمي - lipoma)
- تناقص عدد خلايا الدم يشمل الصفيحات الدموية، تبعيـنـ الدـمـ (يـظـهـرـ فيـ فـحـوصـ الدـمـ)
- 斯基ـرـيـ، تـنـاـقـصـ نـسـبـ الـبـوتـاسـيـوـمـ فيـ الدـمـ، سـوـءـ تـغـذـيـةـ، إـرـتـفـاعـ نـسـبـ التـريـجيـلـيسـيرـيدـاتـ فيـ الدـمـ
- الشعور بإرتباك، نوبات من القلق، مزاج إكتئابـيـ، تناقص الرغبة الجنسـيةـ
- صـعـوبـةـ التـبـولـ، دـمـ أوـ بـرـوتـينـ فيـ الـبـولـ
- علامات لإصـابةـ أوـ رـدـ فعلـ فيـ مـكـانـ الـحـقـنـ (نـاتـجـةـ عنـ الأـدوـيـةـ الـتـيـ تـعـطـىـ بـالـحـقـنـ فيـ نـفـسـ الـوقـتـ)

أعراض جانبية نادرة جداً (very rare) أعراض تظهر لدى حتى مستعمل واحد من بين 100000000:

- إنتفاخات معينة في فحص التخطيط الكهربائي للقلب (إطالة مقطع QT).
- أنواع معينة لإضطرابات في نظم القلب (تشمل رجفان بطيني، اضطراب torsade de pointes في القلب)
- كتل من تحت الجلد (أورام في النسيج الشحمي - lipoma)
- تناقص عدد خلايا الدم يشمل الصفيحات الدموية، تبعيـنـ الدـمـ (يـظـهـرـ فيـ فـحـوصـ الدـمـ)
- 斯基ـرـيـ، تـنـاـقـصـ نـسـبـ الـبـوتـاسـيـوـمـ فيـ الدـمـ، سـوـءـ تـغـذـيـةـ، إـرـتـفـاعـ نـسـبـ التـريـجيـلـيسـيرـيدـاتـ فيـ الدـمـ
- الشعور بإرتباك، نوبات من القلق، مزاج إكتئابـيـ، تناقص الرغبة الجنسـيةـ
- صـعـوبـةـ التـبـولـ، دـمـ أوـ بـرـوتـينـ فيـ الـبـولـ
- علامات لإصـابةـ أوـ رـدـ فعلـ فيـ مـكـانـ الـحـقـنـ (نـاتـجـةـ عنـ الأـدوـيـةـ الـتـيـ تـعـطـىـ بـالـحـقـنـ فيـ نـفـسـ الـوقـتـ)

أعراض جانبية نادرة جداً (very rare) أعراض تظهر لدى حتى مستعمل واحد من بين 1000000000:

- إنتفاخات معينة في فحص التخطيط الكهربائي للقلب (إطالة مقطع QT).
- أنواع معينة لإضطرابات في نظم القلب (تشمل رجفان بطيني، اضطراب torsade de pointes في القلب)
- كتل من تحت الجلد (أورام في النسيج الشحمي - lipoma)
- تناقص عدد خلايا الدم يشمل الصفيحات الدموية، تبعيـنـ الدـمـ (يـظـهـرـ فيـ فـحـوصـ الدـمـ)
- 斯基ـرـيـ، تـنـاـقـصـ نـسـبـ الـبـوتـاسـيـوـمـ فيـ الدـمـ، سـوـءـ تـغـذـيـة