

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة

(مستحضرات) - 1986

يسوّق الدواء بموجب وصفة طبيب فقط

هكساكايرون أقراص

التركيب

يحتوي كل قرص على: حمض ترانيكساميك 500 ملغ

(Tranexamic Acid 500 mg)

لمعلومات عن المواد غير الفعالة في المستحضر - أنظر الفقرة 6 - «معلومات إضافية».

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء.

تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.

وُصف هذا الدواء للعلاج من أجلك. لا تعطيه للآخرين. فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن حالتهم الطبية مشابهة لحالتك.

1) لأي غرض مخصص الدواء؟

الدواء مخصص لعلاج الأنزفة.

الفصيلة العلاجية:

يزيد من تخثر الدم - مضاد حال للفيبرين

2) قبل إستعمال الدواء

لا يجوز إستعمال الدواء إذا:

- كنت حساساً (أليرجي) للمادة الفعالة (حمض ترانيكساميك) أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (أنظر الفقرة 6).
- لديك مشاكل خطيرة في الكلى (قصور كلوي).
- لديك مرض إنصمامي - خثاري نشط (فرط تخثر الدم).
- لديك سابقة لختار وريدي أو شرياني.
- لديك سابقة لإختلاجات.
- كنت معرضاً لخطورة حدوث نزف مفرط نتيجة إضطراب في التخثر يسمى consumption coagulopathy.

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء

قبل العلاج بـ هكساكايرون إحك للطبيب إذا:

- لديك دم في البول.
- وجد لديك ذات مرة نزف خارج عن السيطرة.
- لديك تخثر منتشر داخل الأوعية الدموية (DIC)، مرض يبدأ فيه الدم في التخثر في كامل الجسم.
- تناولت يومياً ولفترة زمنية طويلة دواء لعلاج مرض وراثي يسمى وذمة تحسسية وراثية (angioneurotic oedema HANO). إذا كان الأمر كذلك، فمن الجائز أن تحتاج إلى إجراء فحوص عينين وفحوص دم منتظمة للتأكد من الأداء الوظيفي للكبد.
- كنت امرأة ولديك طمث غير منتظم.
- حدث لديك في الماضي حادث إنصمامي خثاري (thromboembolic event).
- عانى أحد أفراد عائلتك من مرض إنصمامي - خثاري (فرط تخثر - thrombophilia).
- لديك مرض كلوي.

التفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تستعمل، أو إذا استعملت مؤخراً، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إحك للطبيب أو الصيدلي عن ذلك. بالأخص إذا كنت تستعمل:

- أدوية حالة للفيبرين (المستعملة للمساعدة على إذابة الخثرات الدموية)، مثل ستريبتوكيناز. لأن حمض ترانيكساميك يمنع عمل هذه الأدوية.
- أقراص منع الحمل. هذه الأقراص قد تزيد من خطورة تشكل خثرات دموية.

الحمل، الإرضاع والخصوبة

إذا كنت في فترة الحمل أو الرضاعة، إذا كنت تعتقدين بأنك حامل أو تخططين للحمل، إستشيري طبيبك أو الصيدلي قبل تناول هذا الدواء.

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء

يحتوي هذا الدواء على أقل من 23 ملغ صوديوم في القرص وبالتالي يعتبر خال من الصوديوم.

3) كيفية إستعمال الدواء؟

يجب دائماً إستعمال المستحضر حسب تعليمات الطبيب.

عليك الإستيضاح من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقاً بخصوص المقدار الدوائي وطريقة العلاج بالمستحضر.

المقدار الدوائي وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط.

لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به.

السحق/الشرط/المضغ

بالإمكان شرط القرص في خط الشرط.

لا تتوفر معلومات بخصوص السحق أو المضغ.

يجب دائماً تناول الدواء مع كأس من الماء.

إذا تناولت بالخطأ مقداراً دوائياً أكبر

إذا تناولت بالخطأ مقداراً دوائياً مفرطاً أو إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء، توجه حالاً إلى الطبيب أو لغرفة الطوارئ في المستشفى، وأحضر علبة الدواء معك.

إن تناول مقداراً دوائياً مفرطاً من حمض ترانيكساميك قد يسبب لك غثيان، تقيؤ، دوار أو دوخة عند النهوض إلى وضعية الوقوف.

إذا نسيت تناول الدواء

إذا نسيت تناول هذا الدواء في الموعد المخصص، فلا يجوز تناول مقداراً دوائياً مضاعفاً للتعويض عن المقدار الدوائي المنسي. تناول المقدار الدوائي التالي كما هو مخطط.

يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب.

لا يجوز تناول أدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال هذا الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.

(4) الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال هكساكابرول قد يسبب أعراضاً جانبية عند بعض المستعملين. لا تندش من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني أياً منها.

إضطرابات في العينين

أعراض جانبية نادرة (أعراض تظهر لدى 10-1 مستعملين من بين 10,000):

- مشاكل في الرؤية، خاصة في رؤية الألوان
- خثرة دموية في العين. قد يسبب هذا الأمر نزف في العين أو فقدان الرؤية

إضطرابات في الجهاز المناعي

أعراض جانبية نادرة جداً (أعراض تظهر لدى أقل من مستعمل 1 من بين 10,000):

- تشمل ردود فعل تحسسية التي تؤدي إلى صعوبة في التنفس أو إلى دوار

إضطرابات في الأوعية الدموية

أعراض جانبية نادرة جداً (أعراض تظهر لدى أقل من مستعمل 1 من بين 10,000):

- خثرة دموية في الأوعية الدموية (تسمى هذه الحالة خثار أو thrombosis)

إضطرابات في الجهاز الهضمي

أعراض جانبية نادرة جداً (أعراض تظهر لدى أقل من مستعمل 1 من بين 10,000):

- غثيان
- تقيؤ
- إسهال

هذه الأعراض الجانبية عادة تكون طفيفة وتزول سريعاً جداً، لكن إذا إستمرت، إحك لطبيبك أو الصيدلي عن ذلك.

إضطرابات في الجلد أو في النسيج تحت الجلد

أعراض جانبية نادرة (أعراض تظهر لدى 10-1 مستعملين من بين 10,000):

- حكة، إحمرار أو إنتفاخ في الجلد

إضطرابات في الجهاز العصبي

أعراض جانبية شيعها غير معروف (أعراض شيعها لم يحدد بعد):

- إختلاجات، خاصة في حالات إساءة الإستعمال

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

التبليغ عن أعراض جانبية

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط «تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي» الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il>

(5) كيفية تخزين الدواء؟

- تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأطفال و/أو الرضع وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

- لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنقضاء تاريخ الصلاحية (Exp. Date) الذي يظهر على ظهر العلبة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

- يجب التخزين في مكان جاف، دون 25 درجة مئوية، في العلبة الأصلية للحماية من الضوء.

- لا يجوز رمي الأدوية إلى المجاري أو للقمامة المنزلية. إسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من أدوية لم تعد قيد الإستعمال. تساعد هذه الوسائل في الحفاظ على البيئة.

(6) معلومات إضافية

يحتوي الدواء بالإضافة للمركب الفعال أيضاً:

microcrystalline cellulose, sodium starch glycolate, magnesium stearate, methylcellulose, talc, colloidal silicon dioxide.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة:

قرص أبيض، مستدير ومسطح، ذو أطراف مائلة، في جانب واحد خط للشطر وفي الجانب الثاني مطبوع "TEVA".

تحتوي كل علبة على 20 أو 30 قرص معبأة ضمن لويحات (بليستر).

من الجائز ألا تسوق كافة أحجام العلب.

إسم المنتج وصاحب الإمتياز وعنوانه

تيفع للأدوية والمستحضرات الطبية م.ض.،

ص.ب. 3190، بيتح تكفا

تم إعداد هذه النشرة في نيسان 2021 بموجب تعليمات وزارة الصحة

رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: 016.35.24864

من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكور. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.