

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו – 1986

התרופה משוקת על פי מרשם רופא בלבד

הקסאקפרון® טבליות

הרכב

כל טבליה מכילה: חומצה טראנקסאמית 500 מ"ג (Tranexamic Acid 500 mg)

למידע על חומרים בלתי פעילים בתכשיר – ראה סעיף 6 – "מידע נוסף".

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

תרופה זו נרשמה לטיפול עבורך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

1. למה מיועדת התרופה?

התרופה מיועדת לטיפול בדימומים.

קבוצה תרופוית

מגביר קרישת דם – אנטיפיברינוליטי

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל (חומצה טראנקסאמית) או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה סעיף 6).
- יש לך בעיות חמורות בכליות (אי ספיקת כליות).
- יש לך מחלה טרומבו-אמבולית פעילה (קרישת יתר של הדם).
- יש לך היסטוריה של פקקת ורידית או עורקית.
- יש לך היסטוריה של פרכוסים.
- אתה נמצא בסיכון לדימום יתר כתוצאה מהפרעת קרישה הנקראת coagulopathy.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה לפני הטיפול בהקסאקפרון ספר לרופא אם:

- יש לך דם בשתן.
- היה לך אי פעם דימום בלתי נשלט.
- יש לך קרישה תוך-כלית מפשטת (DIC), מחלה שבה הדם מתחיל להיקרש בכל הגוף.
- נטלת תרופה לטיפול במחלה תורשתית הנקראת בצקת אלרגית תורשתית (angioneurotic HANO oedema) למשך תקופה ארוכה. אם כך, ייתכן כי תצטרך לבצע בדיקות עיניים ובדיקות דם סדירות על מנת לבדוק את תפקוד הכבד.
- את אישה עם וסת בלתי סדירה.
- היה לך בעבר אירוע טרומבו-אמבולי (thromboembolic event).
- אחד מבני משפחתך סבל ממחלה טרומבו-אמבולית (טרומבופיליה, קרישתיות יתר).
- יש לך מחלת כליה.

תגובות בין-תרופתיות

אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. במיוחד אם אתה לוקח:

- תרופות פיברינוליטיות (המשמשות לסיוע בהמסת קרישי דם), כגון סטרפטוקינאז. הסיבה לכך היא שחומצה טראנקסאמית תמנע את פעולתן של תרופות אלה.
- גלולות למניעת היריון. גלולות אלה עלולות להגדיל את הסיכון להיווצרות קרישי דם.

היריון, הנקה ופוריות

אם את בהיריון או מניקה, אם את חושבת שאת בהיריון או שאת מתכננת היריון, התייעצי עם הרופא שלך או עם הרוקח לפני נטילת תרופה זאת.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה תרופה זו מכילה פחות מ-23 מ"ג תורן בטבליה ולפיכך נחשבת נטולת תורן.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר. המינון ואופן הטיפול יקבעו על-ידי הרופא בלבד.

אין לעבור על המנה המומלצת.

כתיתה/חצייה/לעיסה

ניתן לחצות את הטבליה בקו החצייה.

אין מידע לגבי כתישה או לעיסה.

יש ליטול את התרופה תמיד עם כוס מים.

אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר

אם נטלת בטעות מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים, והבא אריזת התרופה איתך. נטילת מינון יתר של חומצה טראנקסאמית עלולה לגרום לך לבחילה, להקאה, לסחרחורת או לסחרור בעת קימה לעמידה.

אם שכחת ליטול את התרופה

אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן המיועד, אין ליטול מנה כפולה על מנת לפצות על המנה שנשכחה. קח את המנה הבאה כמתוכנן.

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על-ידי הרופא.

אין ליטול תרופות בחושר! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהינך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הינך זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בהקסאקפרון עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

הפרעות בעיניים

תופעות לוואי נדירות (תופעות שמופיעות ב-10-1 משתמשים מתוך 10,000):

- בעיות בראייה, במיוחד בראיית צבעים
- קריש דם בעין. הדבר עלול לגרום לדימום בעין או לאיבוד ראייה

הפרעות במערכת החיסונית

תופעות לוואי נדירות מאוד (תופעות שמופיעות בפחות ממשמש 1 מתוך 10,000):

- כולל תגובות אלרגיות אשר גורמות לקושי בנשימה או לסחרחורת

הפרעות בכלי הדם

תופעות לוואי נדירות מאוד (תופעות שמופיעות בפחות ממשמש 1 מתוך 10,000):

- קריש דם בכלי הדם (מצב הנקרא פקקת או תרומבוזיס)

הפרעות במערכת העיכול

תופעות לוואי נדירות מאוד (תופעות שמופיעות בפחות ממשמש 1 מתוך 10,000):

- בחילה
- הקאה
- שלשול

תופעות לוואי אלה בדרך כלל קלות וחולפות מהר מאוד, אך אם הן ממשיכות, ספר על כך לרופא שלך או לרוקח.

הפרעות בעור או ברקמה תת עורית

תופעות לוואי נדירות (תופעות שמופיעות ב-10-1 משתמשים מתוך 10,000):

- גרד, אודם או נפיחות בעור

הפרעות במערכת העצבים

תופעות לוואי ששכיחות אינה ידועה (תופעות ששכיחותן טרם נקבעה):

- פרכוסים, במיוחד במקרים של שימוש לרעה

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

דיווח על תופעות לוואי

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי" עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או על-ידי כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה?

- **מנע הרעלה!** תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל-ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.

- **אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (Exp. Date).** המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

- **יש לאחסן במקום יבש, מתחת ל-25°C, באריזה המקורית על מנת להגן מאור.**

- **אין להשליך תרופות לביוב או לפסולת ביתית.** שאל את הרוקח כיצד יש להיפטר מתרופות שאינן בשימוש. אמצעים אלו יסייעו להגן על הסביבה.

6. מידע נוסף

נוסף על המרכיב הפעיל התרופה מכילה גם:

microcrystalline cellulose, sodium starch glycolate, magnesium stearate, methylcellulose, talc, colloidal silicon dioxide.

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה

טבליה לבנה, עגולה ושטוחה, עם קצוות משופעים, בצידה האחד קו חצייה ובצידה השני מוטבע "TEVA". כל אריזה מכילה 20 או 30 טבליות ארוזות במגשות (בליסטר).

ייתכן ולא כל גדלי האריזות משווקים.

שם היצרן ובעל הרישום וכתובתו

טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ

ת"ד 3190, פתח-תקווה

עלון זה נערך באפריל 2021 בהתאם להנחיות משרד הבריאות

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 016.35.24864

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

teva