

## אנטקאביר טبع 0.5 מ"ג טבליות מצופות

### אנטקאביר טבע 1 מ"ג טבליות מצופות

הרכב:

כל טבילה מצופה של אנטקאביר טבע 0.5 מ"ג מכילה:

אנטקאביר (סומונוהידראט) 0.5 mg, מ"ג מכילה:

כל טבילה מצופה של אנטקאביר טבע 1 מ"ג מכילה:

אנטקאביר (סומונוהידראט) 1 mg, מ"ג מכילה:

למידע על מרכיבים בלתי פעילים, ראה סעיף 6 - "מידע נסוף".

קרא בעין את הלינן עד סכום תושםת בתרופה. עלון זה מכיל מידע

מנצ'יז על התוֹרָפָה.

רורפה זו רושמה לסייע בהחולון. אל תכבריר אותה לאחרים. היא עלולה להיק

לרם אפלול אם גואה לך כי מחלתם דומה.

התוֹרָפָה מיועדת למוגברים.

#### 1. מה מיועדת התוֹרָפָה?

אנטקאביר טבע הגינה תרופה אנטיו-ויראלית לטיפול כבד דרזיט הנגרמת על-ידי זיהום בגני הפטיטיס B (HBV) במוגברים עם:

• מחלת כבד מפוצה ועדות לשכפול נגיפי פעיל ועליה עקבית בסרום של רמות

אלanine氨基וטרנספרاز (ALT).

• מחלת כבד לא-פוץיה.

זיהום כוון על-ידי גני הפטיטיס B (HBV) עלול לגרום לדלקן בכבד. אנטקאביר

טבע מודריה את רמות הנגיף בגוף ובכך משפרת את מצב הכבב.

קבואה תרופית:

נוֹקוֹלוֹזִידִים וּנוֹקוֹלוֹאַטִּידִים מִקְבָּצָתִים מִעֲכָבִים וּרוֹסֶטֶןְסְּקְרִיפְּטָאָז.

#### 2. לפני השימוש בתוֹרָפָה:

אין להשתמש בתוֹרָפָה אם:

- אתה רגש (אלרגי) לחומר הפעיל (אנטקאביר) או לאחד מרכיבי התוֹרָפָה האחרים (ראה סעיף 6 - "מידע נסוף").

אהירות מיוחדות לשימוש בתוֹרָפָה:

• סטלית אנטקאביר טבע אינה מנוגנת מרകב בקיוקין אנים אחרים בגני הפטיטיס B (HBV) דרך מיין או דרך נdziי (כולל זיהום בدم). מסיבה זו חשוב

לנקוט באכזעיה הרווחת מטיימים לו נתן למונע אחרים להדק בדלקת כבד גנייפית מסוג B (HBV). קיים חיסון כנגד דלקת כבד מסוג B להגנה על אנשים

בסיכון להדבקה בגין הפטיטיס B (HBV).

• אנטקאביר טבע יכול לבקובת תרופה לוגרומים להחמצת לקטית (עדף)

חוונה לא-לקיוטית (DAD) ולגאלגדלה של כבדם. תסמיינים כגון בחולות, האות וocabi

בsein יכולות להצביע על התופחות של חמצת לקטית. תופעת לוֹאי דיריה אוֹר

מומיוזה או ולעומת זאת קסמיות. חמצת לקטית מתרחשת בדלקות

גבולה יוֹתם בעשוי, במיוחד אם הן סובלות מנדען ומשקל דב. הרופא יינור את

מצבר הפואוי באופן קבוע במהלך המהלך האנטקאביר טבע.

לפני השימוש באנטקאביר טבע ספר לרופא אם:

• סבלת בעבר מליקוי בטפקוד הכלילי. הדבר שוכח מכוון שאנטקאביר טבע מפונה מהאגוף דרך הכליליות ויתכן שהוא צריך לשנות את המין או את זמי הגטלה של הרופאה.

• אין להפסיק לטבול את הנטקסטת דלקת כבד שרך דריוקט. כארש הטיטול באנטקאביר טבע מופסק,

הרופא ימשיך לטבור את מצבר וירוך לך דריוקט. אם אל, ברר מה היה השפעת

ברור עם הרופא בו-בזמן, במיוחד אם הן סובלות מנדען ומשקל דב. הרופא יינור את

עלולה להיות מופחתת. אנטקאביר טבע במהלך סיכון של HIV.

• קיבלת בעבר טיפול ננד דלקת כבד ברוגות סוג B.

ילדים ותבגרים:

אנטקאביר טבע אינו מיועד לשימוש ילדים בילדים ובתבגרים מותחת לגיל 18 שנים.

תגובהות בין תרופות:

אם אתה לוקה או אם לך לסתה לאחרונה תרופה אחרת ככל תרופה ללא מרשם

שימוש במרקירים ינתן לטול אנטקאביר טבע עם אוכל או לא אוכל.

ברוב המקרים ינתן לטול אנטקאביר טבע עם אוכל או לא אוכל.

יחד עם זאת, אם קיבלת בעבר טיפול בתוֹרָפָה המכליה את החומר הפעיל למיבודין (lamivudine), של לפחות עשרה שנים:

אם העברת לטול אנטקאביר טבע על אחר שהטיפול למיבודין לא הצליח, יש

לייטול אנטקאביר טבע עם מקדים בו-בזמן ריבירה.

אם מחלת הכבד של ריבירה מתקדמת אז, הרופא גם ינור את לטול אנטקאביר טבע

פעם ביום על קליבר ריבירה. משמעות קיבת ריבירה הינו לפחות שעתיים אחרי אכילת

ולפוחות שעותים לפני אכילת הbabba.

הירון הגקה ופוריות:

• שיידע את הרופא אם אתה בהירון או מתקנת להיכנס להירון. טרם הוכח

שאנטקאביר טבע בטוחה לשימוש בהירון ההירון.

• אין לטול אנטקאביר טבע במהלך המהלך ההירון אלא אם כן הרופא הורה לך באופן

ופושט אחרה.

פוריות:

• חשב כי בשים בגיל הפוריות ישמשו באמצעותם עליים במהלך המהלך הטיטול

באנטקאביר טבע, על מנת להימנע מכnicיה להירון.

הנקה:

• אין להינק בפרקוף התופול באנטקאביר טבע. יש לידע את הרופא אם אתה מתנקה.

לאידוע אנטקאביר, המרכיב הפעיל של אנטקאביר טבע, מופרש לחלב האם.

גהה ושימוש במכניזם:

• אין להינק בפרקוף התופול באנטקאביר טבע. יש לידע את הרופא אם אתה מתנקה.

בחרכפה זו יכולות להחפשין על קלולר להרגוב ברובך או להפעיל מונוטן.

אם יש לך חששות כלשהם לגביי הייעוץ רפואי המטפל.

#### 3. כיצד השתמש בתוֹרָפָה?

יש להשתמש בתוֹרָפָה תמד' בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרופך אם אין בו-בזמן למינון או אופן הטיפול בתוֹרָפָה.

לא כל המטופלים צריכים לטול אותו מינון של אנטקאביר טבע.

המינון ואופן הטיפול יקבע על-ידי הרופא בלבד. בדוק עם הרופא המטפל או הרופך אם אין בו-בזמן.

בדרכ כל המינון המומלץ מבוגרים הוא 0.5 מ"ג או 1 מ"ג פעם ביום, בהתאם

דרר הפה.

המינון שייקבע עבור תמל'י ב:

• אם טיפול בבר בזיהום בגני הפטיטיס B ואילו תרופה קיבלה.

ן ערך לארון לפי תקנות הרוקחים (תקנירם) התשמ"ז - 1986

• אם שרך בעיות בכליות. יתרון שהרופא ירשום לך מינון נמוך יותר מאשר של התוֹרָפָה, או ינחה אוורט ליטול בתדרות נמוכה יותר מאשר מינון.

מן לתהבטייעילות מלאה של התוֹרָפָה ועל מנת להפחית התופחות של עמידות לטיפול. שטול אנטקאביר טבע כל מזן שהרופא אומר לך. הרופא ינחה אותך אם מותת לברוקט את התוֹרָפָה.

יש ליטול את התוֹרָפָה בהתאם למינון זמני והנטילה שנקבעו על-ידי הרופא על מנת לתהבטייעילות מלאה של התוֹרָפָה ועל מנת להפחית התופחות של עמידות לטיפול. שטול אנטקאביר טבע כל מזן שהרופא אומר לך. הרופא ינחה אותך אם מותת לברוקט את התוֹרָפָה.

אין לעזרו על המנה המומלצת.

חקל מומתופילים יחי'ם ל��חת אנטקאביר טבע על קיבת ריקה (ראה פרק 2 תח'ר).

סער ("ישוש" בתוֹרָפָה ווז'ן). אם הרופא ינחה אותך ל��חת את התוֹרָפָה על קיבת ריקה.

ריקה, יש ל��חת את התוֹרָפָה לפחות שעתיים אחרי אכילה או רוחה ולפחות שעתיים לפני הארוחה הבאה.

אנטקאביר טבע 0.5 מ"ג - אין ל��חת את הטבילה ביזעדר קז חיציה.

אנטקאביר טבע 1 מ"ג - מזן על גיבג כתישה/עליסה של הטבילה ביזעדר קז חיציה.

אין מזע על גיבג כתישה/עליסה של הטבילה ביזעדר קז חיציה.

אם נטלת מזע יתור או אם בטעות בעל יל' מן התוֹרָפָה, פנה מיד לרופא או לחדר

מיטון של בית חולים והבא רוחה ואירוע הרוחה.

אין ליטול את המנה שנסחכה אל ליטול את המנה הבאה בזען.

מג'ון כפוף ליטול המזון והבאה קז חיציה.

אם שכח ליטול מזון והבאה קז חיציה.

חישוב לא ליטול מזון והבאה קז מזע.

אם שכח ליטול מזון והבאה קז מזע.