

فونجيفيرا كريم

كلوتريمازول 1% Clotrimazole

المواد غير الفعالة ومولدات الحساسية في المستحضر - أنظر الفقرة 2 "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء" والفقرة 6 في النشرة.

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي. عليك إستعمال المستحضر بموجب التعليمات في فقرة المقدار الدوائي (3) في هذه النشرة. إستشر الصيدلي إذا كنت بحاجة لمعلومات إضافية. عليك مراجعة الطبيب إذا تفاقمت علامات المرض (الأعراض) أو لم تتحسن بعد مرور 4 أسابيع.

1) لأي غرض مخصص الدواء؟

لعلاج التلوثات في الجلد الناتجة عن الفطريات الجلدية أو عن سلالات المبيضات (كانديدا).

فونجيفيرا كريم مخصص لعلاج الفطريات وكشوط الجلد. يعالج المستحضر عدة سلالات من الفطريات، التي قد تظهر في مناطق مختلفة من الجسم: راحتي وأصابع القدمين، الإبطين، منفرج الرجلين، ثنايا الجلد ومناطق أخرى للجلد.

الفصيلة العلاجية: مستحضر مضاد للفطريات من فصيلة الإيميدازولات.

2) قبل إستعمال الدواء

لا يجوز إستعمال الدواء:

- إذا كنت حساساً (أليرجي) للمادة الفعالة كلوتريمازول أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء.
- لعلاج التلوثات في فروة الرأس أو في الأظافر.

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء

مثل الكريما الأخرى، فإن فونجيفيرا كريم قد يقلل من نجاعة وسائل منع الحمل المصنوعة من المطاط، مثل كوندوم أو ديافراغما. لذا، إذا كان فونجيفيرا كريم مخصص للإستعمال في الأعضاء التناسلية، عليك إستعمال وسيلة منع حمل بديلة لمدة خمسة أيام على الأقل بعد إستعمال هذا المستحضر.

لا يجوز إستعمال هذا المستحضر في أوقات متقاربة أو لفترة زمنية مطوّلة بدون إستشارة الطبيب.

يجب تجنب تماس المستحضر مع العينين والفم. في حالة التماس مع العينين أو الفم، يجب الشطف جيداً بالماء ومراجعة الطبيب.

قبل العلاج بـ فونجيفيرا كريم، إحك للطبيب إذا:

- لم تكن واثقاً بأنك (أو طفلك، في حالة طفح الحفاضات) تعاني من تلوث فطري.
- كان المتعالج حساساً لأي طعام أو لأي دواء.

التداخلات/التفاعلات بين الأدوية

إذا كنت أنت أو طفلك تستعملان، أو إذا إستعملتما مؤخراً، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إحك للطبيب أو الصيدلي عن ذلك.

الحمل والإرضاع

إذا كنت في فترة الحمل، أو تحاولين الحمل أو مرضعة، يجب إستشارة الطبيب أو الصيدلي قبل إستعمال المستحضر.

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء

يحتوي فونجيفيرا كريم على سيتوستيريل الكحول (Cetostearyl alcohol) الذي قد يؤدي إلى تهيج موضعي في الجلد (طفح، حكة أو إحمرار) وكحول بنزيلي (Benzyl alcohol) الذي قد يؤدي إلى تهيج موضعي طفيف وردود فعل تحسسية.

3) كيفية إستعمال الدواء؟

عليك الإستيضاح من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن واثقاً بخصوص المقدار الدوائي وطريقة إستخدام المستحضر.

في حال وُصف لك المستحضر من قبل الطبيب فيجب إستعمال المستحضر دائماً حسب تعليمات الطبيب.

إذا إقتنيت المستحضر بدون وصفة طبيب، يجب إستعمال المستحضر بحسب تعليمات هذه الفقرة:

المقدار الدوائي الإعتيادي عادة هو: العلاج مرتين في اليوم (صباحاً ومساءً) في المنطقة المصابة.

كيفية الإستعمال:

إدهن الكريم على جلد نظيف وجاف وأدخل إلى داخل الجلد بالتدليك اللطيف. عادة تكفي كمية قليلة بطول قدره نصف سم من الكريم لتغطية منطقة بحجم راحة اليد. فترة العلاج تتعلق بنوع التلوث. بشكل عام، إن معدل فترة العلاج بتلوثات الجلد الفطرية المختلفة يتراوح ما بين 3-2 أسابيع، لكن من الجائز أن تضطر للإستعمال لفترة ذات 4 أسابيع. لمنع تكرار حدوث التلوثات الفطرية (تحديداً في الرجلين)، يجب مواصلة العلاج لمدة حوالي أسبوعين بعد زوال كافة علامات المرض.

إن أعراض التلوث في الجلد مثل حكة أو ألم من المفترض أن تتحسن خلال عدة أيام من العلاج. مع ذلك، فإن العلامات مثل إحمرار وتقشر الجلد من شأنها أن تزول بعد فترة زمنية أطول. إذا إستمرت الأعراض، إستشر الطبيب.

لا تتجاوز المقدار الدوائي الموصى به.

للإستعمال الخارجي فقط.

لا يجوز إدخال الدواء للفم أو بلعه.

لا يجوز تغطية المنطقة المعالجة بواسطة ضماد و/أو بلاستر، إلا وفق تعليمات صريحة من الطبيب.

إذا بلع شخص بالخطأ من الدواء، توجه حالاً للطبيب أو لغرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر علبة الدواء معك.

إذا نسيت إستعمال المستحضر في الوقت المطلوب، إستعمله بأسرع وقت ممكن وواصل العلاج كالمعتاد.

كيف يمكنك المساهمة في نجاح العلاج؟

● على الرغم من أن المنطقة المصابة تسبب الحكة، تجنب حكها. إن الحك يسبب ضرراً لسطح الجلد مما يؤدي إلى إنتشار التلوث.

● حافظ على بقاء المناطق المصابة نظيفة.

● الرطوبة تحفز نمو الفطريات، لذا يجب الحفاظ على بقاء المكان المصاب جافاً لكن يجب تجنب الفرق المفرط.

● يجب غسل المنطقة المصابة وتجفيفها قبل كل عملية دهن للكريم. بين كل علاج وعلاج - يمكن إستعمال مسحوق التالك أو مسحوق مضاد للفطريات ليبقى المكان جافاً. إستشر الطبيب أو الصيدلي للحصول على توصية حول مستحضر معين.

● يجب غسل اليدين دائماً بعد علاج التلوث من أجل منع إنتشاره.

● لا تشارك الأشخاص الآخرين بالمناشف، سجادات حوض الإستحمام وما شابه، لأن التلوث قد ينتقل إليهم.

● إذا كان العلاج في الرجلين - يجب الحرص على الغسل جيداً والتجفيف خاصة بين الأصابع. من المفضل إستعمال الجوارب القطنية؛ يجب الإمتناع عن لبس الجوارب الصوفية أو المصنوعة من المواد الإصطناعية. يستحسن تبديلها عدة مرات في اليوم (بحسب كمية العرق). إغسل الجوارب بشكل جيد، جوارب النايلون والجوارب السروالية بالماء الساخن لإزالة كافة الجلد المتقشر أو أبواغ الفطريات. قم بتبديل حذائك بشكل يومي إذا أمكن ذلك.

في المواسم الملائمة يوصى بإنتعال الصنادل بدون جوارب.

لا يجوز إستعمال أدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تستعمل فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال هذا الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.

4) الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال فونجيفيرا كريم قد يسبب أعراضاً جانبية عند بعض المستعملين. لا تندش من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني أياً منها. كما بكل الأدوية، هنالك أشخاص قد تكون لديهم حساسية للدواء. إذا كنت أنت أو طفلك لديكما حساسية، فإن رد الفعل سيتطور حالاً بعد بدء الإستعمال. في حال قاسيت أنت أو طفلك من رد فعل تحسسي، يجب التوقف عن الإستعمال والتوجه حالاً لتلقي مساعدة طبية. علامات رد الفعل التحسسي من شأنها أن تشمل: طفح، مشاكل في البلع أو في التنفس، إنتفاخ الشفتين، الوجه، الحنجرة أو اللسان، ضعف، غثيان، دوار أو إغماء.

كذلك، توقف عن العلاج وراجع الطبيب إذا ظهر بعد الإستعمال: تهيج أو فرط حساسية، حكة، حويصلات، حرقة، إنزعاج، إنتفاخ، إحمرار، تقشر الجلد. بالإضافة، قد تظهر أعراض لشعور بسخونة ووخز في المنطقة المعالجة. عادة تزول هذه الأعراض خلال فترة زمنية قصيرة، بعد فترة التعود على المستحضر.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

التبليغ عن أعراض جانبية:

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il>

بالإضافة لذلك، بالإمكان تبليغ شركة بيريجو بواسطة العنوان التالي:

www.perrigo-pharma.co.il.

5) كيفية تخزين الدواء؟

● تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

● لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنقضاء تاريخ الصلاحية (exp.date) الذي يظهر على ظهر العلبة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

● خزن في مكان بارد، دون 25 درجة مئوية.

● بعد الفتح لأول مرة بالإمكان الإستعمال لفترة 6 أشهر.

6) معلومات إضافية

● يحتوي الدواء بالإضافة للمادة الفعالة أيضاً على:

Octyldodecanol, cetostearyl alcohol, cetyl esters wax, sorbitan monostearate, polysorbate 60, benzyl alcohol, aloe vera powder decolorized, purified water.

● كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة: ماسورة من الألومنيوم تحتوي 20 غرام كريم بلون أبيض.

● إسم المنتج وصاحب الإمتياز: بيريجو إسرائيل فارماسبيتيكا م.ض.ص.ب. 16، يروحام.

● يسوق عن طريق: سوپر- فارم (إسرائيل) م.ض.ص.، أريه شنكر 16، هرتسليا 4672516.

● تم إعدادها في كانون الثاني 2021.

● رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: 165-90-36618.

من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكور. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.