

פונגיוורה קרם

קלוטרימאזול 1% Clotrimazole 1%

חומרים בלתי פעילים ואלרגניים בתכשיר - ראה סעיף 2' מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה' וסעיף 6 בעلون.

קרא בעיון את העلون עד סופו בטרם תשמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח. עליך לשימוש בתכשיר על פי ההוראות בסעיף המינון (3) בעalon זה. היועץ ברוקח אם הנrk זוקק למידע נוסף.

עליך לפנות אל הרופא באם סימני המחלת (הסימפטומים) חמניים או אינם משתפרים לאחר 4 שבועות.

1. למה מיעדת התרופה?

לטיפול בזיהומיים בעור הנגרמים על ידי דרמטופיטים או זני קנדידה.

פונגיוורה קרם מיועד לטפל בפטריות ושפיפות העור. התכשיר מטפל במגוון זנים של פטריות, שולולות להופיע באזוריים שונים של הגוף: כפות ואצבעות הרגליים, בתישח, מפשעה, קפלי עור ואזוריים אחרים של העור.

קבוצה טיפולית: תכשיר אנטיפטריאטי מקבוצת האimidואזולים.

2. לפני השימוש בתרופה

אין לשימוש בתרופה:

- אם אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל קלוטרימאזול או לכל אחד מהמרכיבים הננספים אשר מכילה התרופה.
- לטיפול בזיהומיים בקרקפת או בציפוריים.

اذירות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

כמו בקרים אחרים, פונגיוורה קרם עלול להפחית את היילות של אמצעי מניעה העשוים גומי, כגון קונדומים או דייסטרגמה. לכן, אם פונגיוורה קרם מיועד לשימוש באיברי המין, עליך לשימוש באמצעי מניעה חלופי לפחות לפחות חמשה ימים לאחר השימוש בתכשיר זה.

אין לשימוש בתכשיר זה לעיתים קרובות או לתקופה ממושכתсли להיעוץ ברופא.

יש להימנע מגע התכשיר עם העיניים והפה. במקרה של מגע עם העיניים או הפה, יש לשטוף היטב עם מים ולפנות לרופא.

לפני הטיפול בפונגיוורה קרם, ספר לרופא אם:

- אין בטוח שאתה (או תינוק, במקרה של תפרחת חיתולים) סובל מזיהום פטריאתי.
- המתופל רגיש למזון כלשהו או לתרופה כלשהי.

אינטראקטיות/תגובה בין תרופות בין-

אם אתה או ילך לוקחים, או אם לוקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.

הרינו והנקה

אם הנrk בהריון, אם הנrk מנסה להרות או מניקה, יש להיעוץ ברופא או ברוקח לפני השימוש בתכשיר.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

פונגיוורה קרם מכיל צטוסטאריל אלכוהול (Cetostearyl alcohol) העול לגירוי מקומי בעור (Benzyl alcohol, גרד או אודם) ובמניל אלכוהול (Benzyl alcohol) אשר עלול לגרום לגירוי מקומי קל ולתגובה אלרגית.

3. כיצד תשמש בתרופה?

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אין בטוח בנוגע למינון ואופן השימוש בתכשיר.

במידה והתכשיר נרשם לך על ידי רופא יש לשימוש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות רופא, יש לשימוש בתכשיר

במידה ורכשת את התכשיר ללא מרשם רפואי, יש לשימוש בתכשיר בהתאם להוראות בסעיף זה:

המינון המקורי בדרך כלל הוא: טיפול של פעמיים ביום (בוקר וערב) באזורי הנגע.

օפן השימוש:

מרח את הקרם על עור נקי ויבש והחדר אל תוך העור על ידי עיסוי עדין. בדרך כלל תספיק כמות קטנה באורך של $\frac{1}{2}$ ס"מ.

קרם לכיסוי איזור בגודל כף היד. משך הטיפול תלוי בסוג הזיהום. באופן כללי, משך הטיפול הנמוצע בזיהומי העור הפטרייטיים השונים נע בין 2-3 שבועות, אולם ניתן שתיאלץ לשימוש בתכשיר

לתקופה של 4 שבועות. על מנת למנוע הישנות של זיהומיים פטריאティים (בפרט ברגליים), יש להמשיך את הטיפול במשך

כשבועיים לאחר היעלמות כל סימני המחלת.

אין להכניס את התרופה לפה או לבלווע אותה. אין לכוסות את האזור המתופל עם תחבושת/או פלסטר, אלא על פי הוראה מפורשת מרופא. פנה מיד לרופא או לחדר אם בטעות בעל מישחו מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מيون של בית חולים והבא אריזת התרופה אחרת. אם התסמים נמשכים, התיעץ עם הרופא.

אם שכחת לשמש בתכשיר בזמן הדרושים, השמש בו בהקדם האפשרי והמשך בטיפול כרגיל.

כיצד תוכל לסייע להצלחת הטיפול?

- על אף שהאזור הנגע מגרד, יש להימנע מיגרדו. הגירוד יגרום נזק לפני השימוש של העור וכן יגרום להתקפות

הזרם ממספר ימי טיפול. עם זאת, סימנים כגון אדמומיות וקילוף העור עשויים להיעלם לאחר זמן רב יותר. אם התסמים נמשכים, התיעץ עם הרופא.

אין לעבר על המנה המומלצת. לאן להכניס חיצוני בלבד.

אין להכניס את התרופה לפה או לבלווע אותה.

אין לכוסות את האזור המתופל עם תחבושת/או פלסטר, אלא על פי הוראה מפורשת מרופא. פנה מיד לרופא או לחדר

אם בטעות בעל מישחו מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מيون של בית חולים והבא אריזת התרופה אחרת.

אם שכחת לשמש בתכשיר בזמן הדרושים, השמש בו בהקדם האפשרי והמשך בטיפול כרגיל.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעע

שהןrig נוטל תרופה. הרכיב משקפיים אם הנrk זוקק להם.

אם יש לך שאלות נוספות על הזרם או ברוקח, היזכרו בראובן או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בפונגיוורה קרם עלול לגרום לתופעות לוואי. יתכן ולא תסבול מכך אחת מהן.

כמו בכל התרופות, ישנים אנשים שעולים להיות אלרגיים לתרופה. אם אתה או ילך אלרגים, התגובה תתפתח מיד לאחר התחלת השימוש. במקרה ואתה או ילך חווים תגובה אלרגית, יש להפסיק את השימוש של העור ו לקבל טיפול רפואי.

רפואי. הסימנים לתגובה אלרגית עשויים של זיהומיים פטריאティים (בפרט ברגליים), יש להמשיך את הטיפול במשך

שבועיים לאחר היעלמות כל סימני המחלת.

ניתן לדוח על תופעות לוואי לשיטחוניות אמבטייה על הקישור "דוחות על תופעות לוואי עקב טיפול רפואי" (www.health.gov.il) בדף הבית של משרד הבריאות לוואי, או ע"י כניסה

לכתובת לטופס המכוון לדוח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה בכתובת הבאה: <https://sideeffects.health.gov.il>.

בנוסף, ניתן לדוח לחברת פריגו באמצעות הכתובת הבאה: www.perrigo-pharma.co.il.

5. איך לאחסן את התרופה?

- מנع הרעלת! תרופה זו כוללת תרופה אחרת אחורית לשומר במוקם סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים/אוותינוקות ועל ידיך כך תמנע הרעלת. אל תגרום להקה ללא הוראה מפורשת מרופא.

אין לשימוש בתכשיר אחריו עגביה הארץיה. תאריך התגובה מתיחס ליום האחרון של אותו חודש.

אחסן במקום קריר, מתחת ל- 25°C .

לאחר פתיחה ראשונה ניתן לשימוש במשך 6 חודשים.

6. מידע נוספת

- נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם:

Octyldodecanol, cetostearyl alcohol, cetyl esters wax, sorbitan monostearate, polysorbate 60, benzyl alcohol, aloe vera powder decolorized, purified water.

• כדי נראית התרופה ומה תוכן הארץיה: שפורת אלומיניום המכיל 20 גרם קרם בצבע לבן.

• שם היצרן ובעל הרישום: פריגו ישראל פרמצבטיקה בע"מ, ת.ד. 16, ירושם.

• מסוק ע"י: סופר-פארם (ישראל) בע"מ, אריה שנקר 16, הרצליה 4672516.

• נערך בינואר 2021.

• מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 165-90-36618.

לשם הפשתות ולהקלת הקיראה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיעדת לשני המינים.