

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
В СООТВЕТСТВИИ С ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМИ
СТАНДАРТАМИ (ПРЕПАРАТЫ) - 1986**

Препарат отпускается без рецепта врача

ФУНГИВЕРА КРЕМ

Клотримазол (Clotrimazole) 1%

Вспомогательные ингредиенты и аллергены препарата - см. раздел 2 'Важная информация о некоторых ингредиентах препарата' и раздел 6 инструкции.

Внимательно и полностью прочитайте данную инструкцию перед применением препарата. Данная инструкция содержит основные сведения о препарате. Если у Вас имеются дополнительные вопросы, обратитесь к врачу или фармацевту. Применяйте препарат в соответствии с указаниями, содержащимися в разделе дозировки (3) данной инструкции. Посоветуйтесь с фармацевтом, если Вы нуждаетесь в дополнительной информации.

Обратитесь к врачу, если признаки болезни (симптомы) ухудшатся или не улучшатся через 4 недели.

1. ДЛЯ ЧЕГО ПРЕДНАЗНАЧЕН ПРЕПАРАТ?

Для лечения инфекционных поражений кожи, вызванных дерматофитами или штаммами Кандида.

Фунгивера Крем предназначен для лечения грибковых поражений и опрелости кожи. Препарат лечит широкий спектр грибковых штаммов, которые могут поражать различные участки тела: стопы и пальцы ног, подмышечную впадину, паховую область, кожные складки и другие участки кожи.

Фармакологическая группа: Противогрибковое средство из группы имидазолов.

2. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА

Не применяйте препарат:

- Если у Вас есть чувствительность (аллергия) к активному веществу клотримазолу или к любому из дополнительных ингредиентов, содержащихся в препарате.
- Для лечения инфекций кожи головы или ногтей.

Особые предупреждения, относительно применения препарата

Как и другие кремы, Фунгивера Крем может снизить эффективность контрацептивных средств, изготовленных из резины, таких, как презерватив или диафрагма. Поэтому, если Фунгивера Крем предназначается для применения в области гениталий, используйте альтернативные средства контрацепции в течение хотя бы пяти дней после применения данного препарата.

Не применяйте данный препарат часто или продолжительный период времени без консультации врача.

Избегайте контакта препарата с глазами и ртом. В случае контакта с глазами или ртом тщательно промойте их водой и обратитесь к врачу.

Перед началом лечения препаратом Фунгивера Крем сообщите врачу, если:

- Вы не уверены, что Вы (или Ваш младенец, в случае пеленочной сыпи) страдаете грибковой инфекцией.
- У пациента повышенная чувствительность к каким-либо продуктам питания или каким-либо лекарственным препаратам.

Взаимодействия лекарственных препаратов

Если Вы или Ваш ребенок принимаете или недавно принимали другие препараты, включая препараты, отпускаемые без рецепта врача, и пищевые добавки, сообщите об этом врачу или фармацевту.

Беременность и кормление грудью

Если Вы беременны, пытаетесь забеременеть или кормите грудью, проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом перед применением препарата.

Важная информация о некоторых ингредиентах препарата

Фунгивера Крем содержит цетостеариловый спирт (Cetostearyl alcohol), который может вызвать местное раздражение кожи (сыпь, зуд или покраснение) и бензиловый спирт (Benzyl alcohol), который может вызвать легкое местное раздражение кожи и аллергические реакции.

3. КАК СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ ПРЕПАРАТ?

Если Вы не уверены относительно дозировки и схемы лечения препаратом, уточните у врача или фармацевта.

Если препарат был выписан для Вас врачом, всегда применяйте препарат в соответствии с указаниями врача.

Если Вы приобрели препарат без рецепта, применяйте его в соответствии с указаниями данного раздела:

Принятая дозировка обычно: лечение два раза в день (утром и вечером) пораженного участка.

Способ применения:

Нанесите крем на чистую и сухую кожу и вотрите его в кожу легкими массажными движениями. Обычно бывает достаточно небольшого количества крема длиной в 1/2 см для покрытия участка величиной с ладонь. Продолжительность лечения зависит от вида инфекции. Средняя продолжительность лечения различных грибковых инфекций кожи обычно составляет 2-3 недели, но возможно, что для лечения потребуются 4 недели. Во избежание рецидива грибковой инфекции (в частности ног) продолжите лечение еще примерно две недели после исчезновения всех признаков заболевания.

Симптомы кожной инфекции, такие, как зуд или болезненность, должны улучшиться через несколько дней лечения. В то же время, такие признаки, как покраснение и шелушение кожи могут исчезнуть через более продолжительное время. Если симптомы продолжаются, посоветуйтесь с врачом.

Не превышайте рекомендуемую дозу.

Только для наружного применения.

Не кладите препарат в рот и не глотайте его.

Не закрывайте обрабатываемый участок бинтом и/или пластырем, если только нет точного указания врача.

Если по ошибке кто-либо проглотил препарат, немедленно обратитесь к врачу или в приемное отделение больницы и возьмите с собой упаковку препарата.

Если Вы забыли применить препарат в положенное время, примените его как можно скорее и продолжите лечение, как обычно.

Как способствовать успешному лечению?

- Несмотря на зуд в пораженном участке, необходимо избегать расчесывания. Расчесывание повреждает поверхность кожи и ведет к большему распространению инфекции.
- Содержите пораженный участок в чистоте.
- Влажность способствует размножению грибов, поэтому необходимо содержать пораженный участок сухим, но избегайте излишнего натирания.
- Помойте и просушите пораженный участок перед каждым нанесением крема. В промежутках между процедурами можно пользоваться тальковой или противогрибковой пудрой для предотвращения повторного поражения участка. Посоветуйтесь с врачом или фармацевтом для получения рекомендации определенного средства.
- Всегда мойте руки после обработки инфицированного участка, во избежание распространения инфекции.
- Не используйте общие с другими людьми полотенца, коврик в ванной и тому подобное, чтобы не инфицировать их.
- При лечении ног - важно их тщательно мыть и насухо вытирать, в особенности между пальцами. Желательно пользоваться носками из хлопка. Избегайте ношения носков из шерсти или синтетических материалов. Желательно менять носки несколько раз в день (в зависимости от интенсивности потоотделения). Тщательно стирайте носки, нейлоновые носки и колготки в горячей воде, чтобы удалить всю отшелушившуюся кожу или споры грибов. По возможности меняйте Вашу обувь ежедневно. В подходящие сезоны рекомендуется носить сандалии без носков.

Не принимайте препараты в темноте! Проверяйте этикетку и дозу каждый раз перед приемом препарата. При необходимости пользуйтесь очками.

Если у Вас есть дополнительные вопросы относительно применения препарата, посоветуйтесь с врачом или фармацевтом.

4. ПОБОЧНЫЕ ЯВЛЕНИЯ

Как и при лечении любым препаратом, применение препарата Фунгивера Крем может вызывать побочные явления у части пациентов. Не тревожьтесь при чтении списка побочных явлений. Возможно, Вы не будете страдать ни одним из них. Как и любое другое лекарство, препарат может вызывать аллергию у некоторых людей. Если у Вас или у Вашего ребенка есть аллергия, реакция проявится сразу же после начала лечения. Если у Вас или у Вашего ребенка возникнет аллергическая реакция, прекратите применение препарата и немедленно обратитесь за медицинской помощью. Признаки аллергической реакции могут включать: сыпь, проблемы с глотанием или дыханием, опухание губ, лица, горла или языка, слабость, тошноту, головокружение или обморок.

Кроме того, прекратите лечение и обратитесь к врачу, если после применения препарата возникают: раздражение или повышенная чувствительность, зуд, волдыри, жжение, дискомфорт, припухлость, покраснение, шелушение кожи. К тому же, могут возникнуть симптомы ощущения жара и покалывания на обрабатываемом участке. Обычно эти явления проходят в течение короткого времени, после периода адаптации к препарату.

Если возникает побочное явление, если одно из побочных явлений становится более выраженным, или если Вы страдаете от побочного явления, не упомянутого в данной инструкции, проконсультируйтесь с врачом.

Отчет о побочных явлениях:

О побочных явлениях можно сообщить в Министерство Здравоохранения, нажав на ссылку "Отчет о побочных явлениях вследствие медикаментозного лечения", находящуюся на домашней странице сайта Министерства Здравоохранения (www.health.gov.il) и направляющую на онлайн форму, предназначенную для отчета о побочных явлениях, или, зайдя по ссылке: <https://sideeffects.health.gov.il>

Кроме того, Вы можете сообщить в компанию Перриго по следующему адресу: www.perrigo-pharma.co.il

5. КАК СЛЕДУЕТ ХРАНИТЬ ПРЕПАРАТ?

- Избегайте отравления! Этот препарат, как и любой другой, надлежит хранить в закрытом, недоступном для детей и/или младенцев месте, и вне поля их зрения, во избежание отравления. Не вызывайте рвоту без получения точных указаний врача.
- Не применяйте препарат после истечения срока его годности (exp. date), указанного на упаковке. Датой истечения срока годности является последний день указанного месяца.
- Хранить в прохладном месте, при температуре ниже +25°C.
- После первого открывания тюбика препарат можно использовать в течение 6 месяцев.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

• В дополнение к активному веществу препарат также содержит:

Octyldodecanol, cetostearyl alcohol, cetyl esters wax, sorbitan monostearate, polysorbate 60, benzyl alcohol, aloe vera powder decolorized, purified water.

• Как выглядит препарат и какво содержимое упаковки: Алюминиевый тюбик, содержащий 20 граммов крема белого цвета.

• Производитель и владелец лицензии: Перриго Израиль Фармацевтика Лтд., п/я 16, Иерусхам.

• Распространитель: Супер-Фарм (Израиль) Лтд., Арье Шенкар 16, Герцлия 4672516

• Откорректировано в Январе 2021.

• Регистрационный номер препарата в Государственном Реестре лекарственных средств Министерства Здравоохранения: 165-90-36618