

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة
(مستحضرات) - 1986

يسوق الدواء بموجب وصفة طبيب فقط

لاكساعدين

أقراص مطلية

المادة الفعالة وكميتها:

يحتوي كل قرص مطلية على:

بيساكوديل 5 ملغ (Bisacodyl 5 mg)

للمعلومات عن المركبات غير الفعالة ومولدات الحساسية،
أنظر الفقرة 2 «معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء»
والفقرة 6 - «معلومات إضافية».

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء.
تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء، إذا
توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.
وصف هذا الدواء للعلاج من أجلك. لا تعطيه لآخرين.
 فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن حالتهم الطبية
مشابهة لحالتك.

1) لأي غرض مخصص الدواء؟

الدواء مخصص للتخفيف من الإمساك لدى الكبار
والأطفال فوق عمر 6 سنوات، لدى المرضى المتلقين
أو المرضى الملazمين للفراش، وكذلك يعطى في التحضير
قبل فحوص معينة.

الفصيلة العلاجية:

مسهل الذي يحتوي على مادة مثيرة لتهيج الأمعاء الغليظة
(contact laxative).

2) قبل إستعمال الدواء لا يجوز إستعمال الدواء إذا:

- كنت حساساً (أليرجي) لـ بيساكوديل أو لكل واحد من مركبات الدواء الأخرى (أنظر الفقرة 6 - «معلومات إضافية»)
- وجد لديك عدم تحمل (حساسية) لسكريات معينة أو أنك غير قادر على هضم سكريات معينة (لأن القرص يحتوي على كمية قليلة من الكتوز)
- كنت تعاني من تجفاف شديد
- يوجد لديك مشكلة في الأمعاء تسمى علّوص «ileus» (إنسداد الأمعاء)
- يوجد لديك مشكلة شديدة في البطن مثل إلتهاب الزائدة الدودية (appendicitis)
- يوجد لديك ألم شديد في البطن يترافق بغثيان وقيء
- يوجد لديك إنسداد في الأمعاء أو قلة الأداء الوظيفي المزمن للأمعاء
- يوجد لديك إلتهاب في الأمعاء (الأمعاء الدقيقة أو الأمعاء الغليظة)

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء

قد يسبب الإستعمال المتواصل التعلق بالمستحضرات المسهلة (مثل هذا) وإسهالات. لا يجوز إستعمال هذا الدواء في أوقات متقاربة أو لفترة مطولة بدون إستشارة الطبيب.

هذا الدواء مخصص فقط للإمساك الذي يستمر لعدة أيام حيث أن إستعمال طويل الأمد بالدواء قد يسبب تعلق الأمعاء بالمسهلات لإحداث حرقة أمعاء. قلة نشاط الأمعاء ليوم أو يومين لا تبرر إستعمال هذا الدواء.

لا يجوز إستعمال لاكساعدين لأهداف أخرى مثل «تنظيف الجسم» وما شابه.

هل الدواء ناجع في خفض الوزن؟

إن المسهلات (مثل بيساكوديل) ليست ناجعة في خفض الوزن. هي لا تقلل من إمتصاص السعرات الحرارية أو الطعام. يمكنها أن تؤدي إلى براز مائي (إسهال)، آلام في البطن وتتجفاف. قد يظن بالخطأ أن التجفاف يعتبر إنخفاضاً في الوزن.

إن فرط إستعمال المسهلات قد يضر بصحتك بالطرق التالية:

- التسرب بإضطرابات في توازن الشوارد الكهربائية والمعادن. الصوديوم، البوتاسيوم، المغنيزيوم والفوسفور عبارة عن شوارد كهربائية ومعادن التي تلزم بتراكيز دقيقة جداً من أجل أداء وظيفي سليم للأعصاب والعضلات، بما في ذلك عضلات الأمعاء الغليظة والقلب. إن الإخلال بهذا التوازن الدقيق قد يؤدي إلى خلل في الأداء الوظيفي لهذه الأعضاء الحيوية.
- إن التجفاف الشديد قد يؤدي إلى إرتجاف، ضعف، تشوش في الرؤية، إغماء، ضرر كلوبي، وفي حالات قصوى إلى الوفاة. يتطلب التجفاف في أحياناً متقاربة علاجاً طبياً.
- يجب الإمتناع عن الإفراط في إستعمال المسهلات وذلك كي لا يتضرر الأداء الوظيفي المعوي.

قبل العلاج بـ لاكساعدين إحكام للطبيب إذا:

● كنت تعاني أو عانيت في الماضي من نزف في فتحة الشرج.

● كنت تعاني من ألم بطن شديد.

الأطفال والمرأهقون

الدواء غير مخصص للإستعمال لدى الأطفال دون عمر 6 سنوات.

التفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخراً، أدوية أخرى، بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إحكام للطبيب أو الصيدلي عن ذلك. بالأخص إذا كنت تستعمل:

- أدوية مدرة للبول مثل بندروفلوازيد أو فوروسيميد
- أدوية ستيروئيدية مثل بريدينزيلولون
- أدوية مسهلة أخرى

● لا يجوز تناول أدوية لخفض الحموضة في المعدة (من فصيلة مثبطات مضخات البروتونات)، أو مضادات للحموضة في مدى ساعة قبل أو بعد تناول هذا الدواء. يجب الإننتظار فترة زمنية قدرها ساعتين على الأقل بين تناول هذا الدواء وبين تناول أدوية أخرى عن طريق الفم، حيث أن لاكساعدين قد يؤثر على إمتصاص الأدوية.

استعمال الدواء والطعام

لا تستهلك الحليب في مدى ساعة قبل أو بعد تناول أقراص لاكساعدين، لأن هذا الأمر يمنع العمل السليم لأقراص لاكساعدين.

قد يشعر البعض من المتعالجين بدوار أو إغماء خلال تناول هذا الدواء. إذا كنت تشعر بهذه الأعراض فيجب الإننتظار حتى تزول قبل السياقة أو قبل إستعمال الماكولات.

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء

يحتوي لاكساعدين على لكتوز مونوهيدرات. إذا قبل لك من قبل الطبيب بأنه يوجد لديك عدم تحمل (حساسية) لسكريات معينة، استشر الطبيب المعالج قبل تناول الدواء.

يحتوي كل قرص 40 ملغ لاكتوز مونوهيدرات.

3) كيفية إستعمال الدواء؟

يجب إستعمال المستحضر دائمًا حسب تعليمات الطبيب، عليك الإستيقاظ من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن واثقاً

بخصوص المقدار الدوائي وطريقة العلاج بالمستحضر.

المقدار الدوائي وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط.

المقدار الدوائي الإعتيادي عادة هو:

المقدار الدوائي للكبار: 1-3 أقراص في المساء قبل النوم.

إذا كانت هذه أول مرة تتناول فيها الدواء، إبدأ بقرص واحد وارفع المقدار الدوائي بحسب الحاجة.

لا تتناول أكثر من 3 أقراص للديوم.

المقدار الدوائي للأطفال فوق عمر 6 سنوات:

قرص واحد في المساء قبل النوم.

لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به.

يتبع

تنمية مدة العلاج

كما هو الأمر في مستحضرات مسهلة أخرى، لا يجوز تناول لاكسعدين لأكثر من 5 أيام متتالية. إذا كنت بحاجة لتناول مستحضرات مسهلة كل يوم، عليك التوجّه للطبيب لإيجاد سبب الإمساك. فرط الاستعمال قد يسبب الضرر.

طريقة إستعمال الدواء

- يجب بلع القرص بشكله الكامل مع ماء.
- لا يجوز تناول الحليب، مضادات الحموضة، أو أدوية من فصيلة مثبطات مضخات البروتونات (أدوية لخفض الحموضة في المعدة) في مدى ساعة قبل أو بعد تناول أقراص لاكسعدين. هذا لأنها تمنع العمل السليم لأقراص لاكسعدين.
- يجب بلع الدواء في المساء قبل النوم.
- لا يجوز المضغ أو السحق ولا يجوز شطر القرص لكنه لا تضر في فعالية طلاء القرص.
- يجب الحرص على شرب سوائل طيلة اليوم للمساعدة على تليين البراز ومنع حدوث تجفاف. يشير المستحضر نشاط الأمعاء عادةً خلال 6-12 ساعة، لكنه أحياناً يحتاج ذلك لوقت أطول (حتى 24 ساعة).

إذا تناولت بالخطأ مقداراً دوائياً أكبر

إذا تناولت كمية كبيرة أكثر مما ينبغي من أقراص لاكسعدين أو تناولت أقراص لاكسعدين لفترة زمنية مطولة، قد يؤدي ذلك لضرر وقد تظهر الأعراض التالية:

- عدم توازن للسوائل والأملاح في الجسم الذي قد يؤثر على توتر العضلات (مثل عضلات الأمعاء) وعلى الأملاح في الدم.
- إنخفاض نسب البوتاسيوم في الدم (يسمى hypokalemia)، قد يؤدي إلى الشعور بالإرهاق أو الدوار، ضعف في العضلات وعدم إنتظام نبضات القلب.
- تجفاف، قد يتجلّى بالشعور بالعطش، إغماء، صداع وقلة التبول.

إذا تناولت مقداراً دوائياً مفرطاً أو إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء، توجه حالاً إلى الطبيب أو لغرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر معك علبة الدواء.

يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب.

لا يجوز تناول أدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفّرت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال هذا الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.

(4) الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال لاكسعدين قد يسبب أعراض جانبية عند بعض المستعملين.

لا تندesh من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز

التعاني أي منها.

يجب التوقف عن العلاج والتوجّه إلى الطبيب حالاً إذا كنت تقاسي من إحدى الأعراض الجانبية التالية: رد فعل تحسسي شديد ونادر يشمل إنتفاخ الوجه، الحنجرة، وصعوبات في التنفس أو دوار.

أعراض جانبية شائعة (أعراض تظهر لدى أقل من مستعمل واحد من بين 10):

- تشنجات أو ألم بطن
- إسهال
- غثيان

أعراض جانبية ليست شائعة (أعراض تظهر لدى أقل من مستعمل واحد من بين 100):

- دم في البراز
- تقيؤ
- إنزعاج في البطن
- إنزعاج في فتحة الشرج وحولها
- دوار

● قد يسبب هذا الدواء تغيراً في لون البول. لا داعي للقلق من هذا التغيير.

أعراض جانبية نادرة (أعراض تظهر لدى أقل من مستعمل واحد من بين 1,000):

- إلتهاب القولون (التهاب القولون الذي يؤدي لألم في البطن وإسهال)

● تجفاف

● رد فعل تحسسي الذي قد يؤدي لطفح جلدي

● إغماء

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

التبلّغ عن أعراض جانبية

بالإمكان التبلّغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط «تبلّغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي» الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبلّغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفّح الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il>

(5) كيفية تخزين الدواء؟

• تجنب التسّمِّ! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي و المجال روئية الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسّم.

لا تسبّب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

• لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنقضاء تاريخ الصلاحية طابع الدواء والتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفّرت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال هذا الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.

(6) معلومات إضافية

يحتوي الدواء بالإضافة للمركب الفعال أيضاً على: Lactose monohydrate, microcrystalline cellulose, methacrylic acid copolymer dispersion, talc, esma spreng, starch, gelatin, povidone, magnesium stearate, triethyl citrate, polyethylene glycol 4000, simethicone emulsion.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة قرص أبيض، مدور ومطلي، محدب من كلا الجانبين.

تحتوي العلبة على: 10، 20، 30، 50، أو 1,000 قرصاً. من الجائز ألا تسوق كافة أحجام العلب.

اسم المنتج وصاحب الإمتياز وعنوانه تيقّع للأدوية والمستحضرات الطبية م.ض.، ص.ب. 3190.

تم إعداد هذه النشرة في كانون الأول 2020 بموجب تعليمات وزارة الصحة.

رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:

018.16.24419

من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكرة. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.

LAXA CTAB PL SH 190421