



### 3. كيفية إستعمال الدواء؟

عليك الإستياضخ من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن واثقاً بخصوص المقدار الدوائي وطريقة إستعمال المستحضر.

مخصوص للإعطاء عن طريق الفم، يجب الشخص جيداً قبل الإستعمال.

إذا لزم الأمر يمكن تناول الدواء مع الماء أو الحليب.

عليك إستعمال المعلقةقياس أو كأس القياس المخصصة لقياس الكمية الصحيحة للدواء، لا يجوز إستعمال ملعقة بيته بغية قياس كمية الدواء.

الملاعع البينية تختلف باحجامها ومن الجائز أن لا تحصل على الكمية الصحيحة للدواء.

الجرعة الدوائية الإعتيادية هي عادة:

الجرعة الدوائية الإعتيادية للأطفال للkids، المسنين والأطفال بأعمار 12-18 سنة:

5 مل، 4 مرات في اليوم، 20 دقيقة حتى ساعة بعد الوجبات وكذلك قبل النوم أو حسب تعليمات الطبيب.

الجرعة الدوائية الإعتيادية للأطفال بأعمار 6-12 سنة:

5 مل، 3-4 مرات في اليوم، 20 دقيقة حتى ساعة بعد الوجبات وكذلك قبل النوم أو حسب تعليمات الطبيب.

لا تتجاوز الجرعة الدوائية الموصى بها.

يجب مراعحة الطبيب إذا لم تزول الأعراض.

هذا الدواء غير مخصص لأطفال دون عمر 6 سنوات.

لا يجوز تناول الدواء لأكثر من أسبوعين بدون تعليمات طبيب.

الفحوص والمتابعة

إذا توجب عليك إجراء فحوص تشخيصية بمواد مشعة فعليك إبلاغ الطبيب بأنك تتناول هذا الدواء، نظرًا لأن نتائج الشخص قد تتأثر من وجود الألومنيوم.

إذا تناولت بالخطأ جرعة مفرطة أو إذا بلغ طفل بالخطأ من الدواء، توجه حالاً إلى الطبيب أو لغرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر عليه الدواء معلق.

في هذه الحالة أنت قد تعاني من آهال، ألم، طعن، نفخة، تقيؤات، مشاكل هضمية، حرقة، معدة حساسة، إمساك، فقدان الشهية للطعام،

جفاف في الجسم، هذه الأعراض قد تنتهي إنتقاماً أو تفاصم نقص إن الجرارات الدوائية العالية من المستحضر قد تتأثر من وجود الكالسيوم في الفوسفور، مشاكل في العظام، إرتفاع نسب الكالسيوم في البول، الكساح (لين العظام).

لا يجوز تناول أدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تتناول فيها دواء، ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.

### 4. الأعراض الجانبية

كما بكل دواء إن إستعمال مالوكين بلوس قد يسبب أعراضًا جانبية عند بعض المستعملين. لا تنهش من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز أن تعاني أي منها.

توقف عن تناول الدواء وراجع الطبيب حالاً أو غرفة الطوارئ في المستشفى إذا:

أعراض جانبية ذات شیوع غير معروف (لا يمكن تقييمها من المعطيات الموجدة):

كنت تعاني من طفح أحمر ودرني، إنتفاخ في الجفنين، في الوجه، في الشفتين، في الف أو في اللسان، حكة، صعوبات في التنفس أو البلع. يمكن أن تعتبر ذلك رد فعل حساسي.

راجع الطبيب إذا ظهر عرض جانبي، تفاقمت إحدى الأعراض التالية أو إستمررت لأكثر من عدة أيام أو ظهر عرض جانبي لم يذكر في الشاشة:

أعراض جانبية غير شائعة (قد تظهر لدى حتى 1 من بين 100 متعالج):

- إمساك

- اسهال

أعراض جانبية نادرة جداً (قد تظهر لدى حتى 1 من بين 10,000 متعالج):

- فرط المغنيزيوم في الدم (Hypermagnesemja)، بما في ذلك في التشخيص بعد إستعمال المحلول لدى متعالجين لديهم ضرر في الأداء الوظيفي الكلوي