

تجريتول 200 ملخ

أقراص ذات تحرير بطيء

المادة الفعالة:
بارابامازيبين 200 ملخ

Carbamazepine 200 mg

تجريتول 400 CR 400 ملخ

أقراص ذات تحرير بطيء

المادة الفعالة:
بارابامازيبين 400 ملخ

Carbamazepine 400 mg

تجريتول 200 ملخ

أقراص

المادة الفعالة:
بارابامازيبين 200 ملخ

Carbamazepine 200 mg

تجريتول شراب 2%

شراب

المادة الفعالة:
كل 5 مللي تجتلو على: بارابامازيبين 100 ملخ

Carbamazepine 100 mg

المواد غير الفعالة:
أنظف الفقرة 6 "معلومات إضافية".

اقرأ النشرة بمumen حتى نهايتها قبل إستعمال اللدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء، إذا توفرت لديك أسلمة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.

وتفت هذا الدواء من أجل، لا تعطيه الآخرين، فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن حاليهم الطيبة مشابهة لحالتك.

(1) لأي غرض مخصوص الدواء؟
لتجريتول عدة إستعمالات:

• لعلاج الصرع، حالة من النوبات (الاختلاجات) المتكررة، هناك أنواع عديدة ومختلفة من النوبات، من معتمدة وحتى شديدة.

• لعلاج النوبات الفجائية المتركرة من الألم في الوجه المعروف كالم العصب الثنائي التوائم.

• لعلاج السكري التفه، حالة من العطش والتبول المتزايددين.

• لعلاج الهوس، حالة تسمى بحالة فرط نشاط، معنوية عالية، أو عصبية.
فيها فترات الهوس بفترات من الإكتبات.

الفصيلة العلاجية:
مضاد للصرع، بموجه للعصب، مؤثر عقلية.

مما ينتمي تجريتول لفصيلة الأدوية المسماة مضادات للاختلاجات.

تجهيز الطبيب حالاً إذا أصبحت حاماً خالاً فترة العلاج بـ تجريتول.
يستطيع الطبيب أن يتناقش معك حول المخاطر المنوطبة بتناول تجريتول خلال فترة الحمل.
الإعراض
يجب إعلام الطبيب إذا كنت مرضعة أو تخططين للإعراض.
يتنقل تجريتول عبر جليب المَلِك لكن ليس من المرجح أن يؤثر على طفلك. تستطعين الإعراض بشرط أن تنتهي لكل مؤشر لإعراض جانبية أخرى مرغوبة لدى رضيعك، إذا تطور لدى رضيعك طفح في العدل، إذا كان لديه ميل شديد للنوم أو لديه اعراض غير عاديّة أخرى، توقيع عن الإعراض وتوجهه إلى الطبيب.

استعمال تجريتول الطعام
لا يجوز شرب عصير الچريپ فروت أو أكل الچريپ فروت، لأن هذا الأمر قد يزيد من تأثير تجريتول. العصائر الأخرى، مثل عصير البرنفال أو عصير النافاج لا تملك هذا التأثير.

تجنب شرب عصير الچريپ فروت أثناء العلاج بـ تجريتول. قد يتداخل عصير الچريپ فروت مع تجريتول ويؤثر على كيّمية استعمال جسمك لهذا الدواء.

الساقية وإستعمال الماكولات
احذر عند الساقية، عند تغذيل الماكولات أو القيام بأعمال التي تتطلب أن تكون يقظة، إلى أن تعرف كيف يؤثر تجريتول عليك.

يشأن الأطفال، يجب تجندهم من ركوب الدراجات، ومن اللعب على مقربة من الشارع، من تسلق الأشجار وما شابه.

قد يسبب تجريتول دوار، نعاساً، رؤياً مشوّهاً أو مزدوجة أو عدم تناقش في العضلات بالأخرين عند بداية العلاج أو عند القائم برفع المقدار الدوائية.

استعمال تجريتول واستهلاك الكحول
احذر عند تناول الكحول خلال فترة العلاج بـ تجريتول. يمكن دور المدح أن يسبّب لك الشعاع أو دواراً أكثر من المعتاد. قد يقترب طبيبك أن يمتنع عن الكحول خلال فترة علاجك بـ تجريتول.

التعرض للشمس
عندما تكون في الخارج، ارتدي ملابس واقية واستعمل مستحضر محتضن الوقاية من الشمس ذو عامل وقاية من الشمس أعلى من 15. لا تستعمل مصبات شمسية، سرير أو حبيرة تشفع.

يجعل هذا الدواء من الجلد حساساً ضاهوا الشعور، أكثر من المعتاد. قد يؤدي التعرض للشمس للجلد في الجلد، الحكة، لإحمرار أو حرق شمس شديدة. إحكام طبيبك إذا بدا جلدك محرقاً فعلاً.

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء
تجريتو شراب:
يحتوى 1 مل من تجريتول شراب على 175 مل من الـ سوريتول. لا يجوز إستعمال

المستحضر إذا كانت لديك مشاكل وراثية نادرة لعدم تحمل الفركتوز.

يحتوي شراب الـ تجريتول على بارا هيدروكسى بينزوات والذي قد يؤدي إلى ردود فعل تحسسية (التي قد تؤدي لاحقاً).

يستطيع المتعالجون الذين لديهم سكري تناول شراب تجريتول. يحتوي الشراب على محلول سوريتول 875 مل (ـ 5 مل)، والذي يحتوى ببطء جلوكون.

(3) كيفية إستعمال الدواء؟
يجب إستعمال المستحضر حسب تعليمات الطبيب دائمًا، عليك الاستياض من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن واثقاً بخصوص المقدار الدوائي وطريقة العلاج بالمستحضر.

المقادير الدوائية وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط.
يلغك الطبيب بالمقادير الدوائية الذي يجب تناوله كل يوم. يتعالج ذلك بعمري، بحالتك الصحية وبالذروة الأخرى التي قد تكون تناولها.

شكل عام، ببدأ الطبيب بتعالج بمقادير دوائية منخفضة ويرفعه تدريجيًّا للكمية الدنيا المطلوبة السيطرة على الوضع، يحتاج متعالجون معينون لمقادير دوائية أعلى.

لا يجوز تجاوز المقادير الدوائية الموصى بها.

طريقة التناول
يتوفر تجريتول بأقراص، أقراص ذات تحرير بطيء (CR) وشراب. يخص الشراب بشكل عام للأطفال أو للكبار الذين يجدون صعوبة في بلع الأقراص.

أقراص: لا يجوز المضغ، يجب بلع الأقراص مع كأس ماء من الماء.
أقراص ذات تحرير بطيء (CR): لا يجوز سحق أو مضغ الأقراص. من شأن ذلك أن يتلف

عليك إعلام الطبيب إذا كنت في فترة الحمل أو تخطيطن للحمل.

سياشاشك طبيبك عن الخطورة المحتملة المنوطبة بتناول تجريتول خلال فترة الحمل لأن المرأة من شأنه أن يسبّب ضرراً أو عيوباً لرضيعك خلال فترة الحمل أو ما يشار إليه بالـ تقدّم.

يمكن تبؤ خصوبة رود الفعل الجيدية الشديدة بـ تجريتول، كباراً بامازيبين أو المركبات المشابهة كيميائياً لدى المتعالجين من أصل بيبي أو تاياندي، عن طريق حرق عينة دم من هؤلاء المتعالجين. يشير لك الطبيب فيما إذا كان فحص الدم ضروري قبل تناول تجريتول.

الحمل
عليك إعلام الطبيب إذا كنت في فترة الحمل أو تخطيطن للحمل.

سياشاشك طبيبك عن الخطورة المحتملة المنوطبة بتناول تجريتول خلال فترة الحمل لأن مع ذلك، من المهم جداً السيطرة على النوبات لديك خلال فترة الحمل إذا كان لديك صرع.

شراب: يجب خفض القنبلة جيداً قبل كل قياس جرعة، إن خفض القنبلة واستعمال أداة قياس يضمنا تناول الجرعة الصحيحة.

التداللات/التفاعلات بين الأدوية
إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخرًا أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إحكام طبيبك أو الصيدلي عن ذلك بالأشخاص إذا كنت تتناول:
أدوية من فصيلة مثبّطات موئمين أو كسيداز (MAOI): لا يجوز تناول تجريتول خلال فترة الحمل أو ما يزيد عن 14 يوم من استعمال MAOI.
أدوية أخرى لها تأثير على إنتاج الـ إكتاب مثل: فلووكسامين، باروكسين، نيفاذازون، ومضادات الـ إكتاب ثالثة الحلقة.
أدوية أخرى لها تأثير على إنتاج الـ إكتاب ثالثة الحلقة.
أدوية أخرى لها تأثير على إنتاج الـ إكتاب ثالثة الحلقة.

توبيرامات وأوكسازيبين.
أدوية معينة لعلاج الإضطرابات النفسية مثل: كلوزايبين، هالوبيريودول، تيوريدازين، ليثيوم، أوكسازيبين، بوكسيتين، لوكلسيتين، رسيربيودون، وزيراسيون.
أدوية معينة لعلاج مشاكل القلب أو الكوستورن المرتفع.
مسكّات آلام مثل إراكستام، بيوبروفين، ديكستروبروبوكسيفين، ترامادول، وارفارين، لمنع تخرّج الدم.

تيكارباجيلون دواء يستعمل لمنع تخدّس خلايا الدم سوية.
مذادات الـ إكتاب، العصائر الأخرى، مثل عصير البرنفال أو عصير النافاج.
مضادات حموضة ضد الفطريات ضد الفطريات العاملة ثالثة الحلقة مثل: إريثروميسين، سيفيروكسامين، دوكسيكليسين، إيتراكونازول، فويروكونازول، كوتونازول، فلوكوتونازول.

أدوية لعلاج داء السلس مثل: إيزويباريد، ريفامبيسين، ديفابوتين.
كورتيكوبسترويدات مثل: بريديزرولون، ديساميتازون.
مركب في أدوية بنائية.

ستاني أو عانت في الماضي من مرض في الدم مع انخفاض في عدد خلايا الدم الحمراء أو البيضاء أو المضيّفات الدموية.

ووجد لديك أو كان لديك إضطراب نادر في إنتاج الـ بوروفيرين والذي يعتبر صياغة مهم لـ لوطية الكبد والارتفاع في الدم (المعروف كذلك كـ hepatic porphyria).

كنت تتناول أدوية التالية لفصيلة معينة لمضادات الـ إكتاب، المسماة مثبّطات موئمين أو كسيداز (MAOI) أو إذا تناولتها خلال فترة 14 يوم الأخيرة.

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء:

قبل العلاج - تجريتول:

إحكام طبيبك إذا كنت حساساً لـ أوكسازيبين (المركب الفعال في تريبيتين) أو لـ فلنيتيوفين، يستعمل كل الدواليين كذلك لعلاج الصداع، بعض الأشخاص الحساسين لـ أوكسازيبين أو فلنيتيوفين، لديهم أيضاً حساسية لـ تجريتول.

بعض أعراض رد الفعل الحسّي قد تشمل ضيق في التنفس، صفير أو صعوبة في التنفس؛ إنفاس في الوجه، الشفتين، اللسان أو أجزاء أخرى من الجسم؛ طفح، حكة، أو شرى على الجلد.

بلغ طبيبك بشكّل فوري إذا تطورت لديك رد فعل جلدي شديد والمصحوبة بسعوفة.

ردود الفعل هذه شائعة أكثر في دول آسيوية أخرى مثل تايوان، ماليزيا، والفلبين).

إن تناول تجريتول مع أدوية من فصيلة مثبّطات موئمين أو كسيداز (MAOI) أو خلال ملاطفة؛ على أحد، نقطنة الشفرين، العينين أو الفم بمحضلاً؛ قشرة الجلد.

ردد طبيبك في حال لديك رد فعل شديد مع إرتفاع مفاجئ في حرارة الجسم، ضغط مد منخفض جداً وإختلالات شديدة. (انظر الفقرة "التحذيرات" في "تحذيرات الدواء إذا").

لا يجوز تناول تجريتول في حال لديك أو كان لديك في ذاتي حمامية جهازية.

لا يجوز تناول تجريتول في حال لديك أو كان لديك في الماضي مرض شديد في القلب أو الكبد.

إسأل طبيبك في حال لم تكن واثقاً فيما إذا كانت إحدى هذه الحالات تتطابق عليك.

إذا لم تكن واثقاً إن تستطيع تناول تجريتول، توجه للطبيب أو الصيدلي.

إحكام طبيبك إذا كنت حساساً لـ الـ إكتاب، الطعام، الأصبار، أو المواد الحافظة أيام.

سيرغّب طبيبك بمعرفة فيما إذا كان لديك ميل تطور حساسية.

إحكام طبيبك في حال لديك أو كان لديك حالات طيبة أيام بيبي أو حاليها.

مشكلات في القلب، الكبد أو الكلى.

ضغط متزايد داخل العين (جلوكوما).

مشكلات في غدة البروستات أو إذا لم تكن قادرًا على حصر بولك

إضطراب نفسي مثل إكتاب أو إنفاس في الشخصية

من الجائز أن يغير طبيبك بإجراء عدة فحوصات قبل الـ إكتاب بالعلاج بـ تجريتول ومن حين

آخر، أيضًا خلال العلاج على منع الأعراض الجانبية الغير مرغوبة.

عليك مواطنة على الحضور للزيارات التي يجريها طبيبك في أي مكان مأهولة.

يمكن تبؤ خصوبة رود الفعل الجيدية الشديدة بـ تجريتول، كباراً بامازيبين أو المركبات المشابهة كيميائياً لدى المتعالجين من أصل بيبي أو تاياندي، عن طريق حرق عينة دم من هؤلاء المتعالجين.

يشير لك الطبيب فيما إذا كان فحص الدم ضروري قبل تناول تجريتول.

الخصوص والمتبايعة

لـ تجريتول عدة إستعمالات:

• لعلاج الصرع، حالة من النوبات (الاختلاجات) المتكررة.

• لـ تجريتول ملل تجتلو على: كل 5 مللي تجتلو على: بارابامازيبين 100 ملخ

Carbamazepine 100 mg

مني يتوجب عليك تناول تجريرول

يجب تناول الدواء أثناءوجبة الطعام أو بعد الوجبة. هذا يساعد على منع الإزعاج في البطن.

يشكل عام، يجب تناول تجريرول - بـ 2 أو 3 جرعات خلال اليوم لكن الطبيب يبلغك إما

بتناول أقل أو أكثر، وفقاً لحالتك.

إذا كنت تناول تجريرول

إذ كان الوقت لتناول مقدار الدوائي القادم هو أكثر من ساعتين أو ثالث، تناول المقدار الدوائي المنسي حال تذكر، تناول الوجبة القادمة في وقتها الإعتيادي وأكمل بحسب جدول الأدواء.

إذا كان الوقت لتناول مقدار الدوائي القادم هو أقل من ساعتين أو ثالث، قم بتنويم المقدار الدوائي المنسي، تناول المقدار الدوائي القادم في الوقت الإعتيادي وأكمل بحسب جدول الأدواء.

لا يجوز تناول مقداراً دوائياً مضافاً للتعويض عن المقدار الدوائي المنسي. من شأن ذلك أن يزيد من إتّهاب جدّد عرض جانبّي غير مرغوب به.

إذا كنت تجد صعوبة في تذكر موعد تناول الدواء، توجه إلى الصيدلي لتلقي مساعدة.

لأي فترة من الزمن يجب تناول تجريرول

يجب المواظة على العلاج وفقاً لوصية الطبيب.

يساعد تجريرول على السيطرة على حالتك لكنه لا يعالجك. عليك تناول تجريرول كل يوم حتى وإن شعرت بتحسن.

الوقف على العلاج

لا يوجد التوقف عن العلاج بـ تجريرول ولا يوجد تقليل المقدار الدوائي بدون إشتارة الطبيب. عليك التأكد من إن البداية أنه يوجد بمحوزتك كمية كافية حتى لا تبقى بدون دواء خلال عطل نهاية الأسبوع أو في الأعياد.

إن التوقف المفاجئ عن العلاج أو تقليل المقدار الدوائي قد يسبب أعراضًا جانبية غير مرغوبة أو تفاقم حالتك.

إذا كنت تتناول هذا الدواء لعلاج الصرع، قد تتطور لديك إختلالات (نوبات).

عادة، يقلل الطبيب من المقدار الدوائي بشكل بطيء إلى أن تتمكن من التوقف عن تناول العلاج بشكل تدريجي.

إذا تناولت تجريرول أكثر من المطلوب (مقداراً دوائياً مفرطاً)

إذا تناولت مقداراً دوائياً مفرطاً أو إذا بليطفل بالخطأ من الدواء، توجه حالاً إلى الطبيب أو لغرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر معك علبة الدواء. قد بذلك حتى إذا لم تظهر علامات سوء.

إذا تناولت تجريرول شفافه دموية مثل صداع حاد مفاجئ، فقدان فجائي لانتباق أو للرؤيا، الم في الور، تشنجات عضلية وحساسية متطرفة للضوء الفاتح

صداع شديد مصحوب برقعة متصلية، تشنجات عضلية وحساسية متطرفة للضوء الفاتح

إسهال، أيام بطن وسعوفة، عمليات اضطراب محتمل في المعي الغليظي (

طفح بيقع حمراء بالخاص في الوجه والذئب قد يكون مصحوب براهيف، سخونة، غثيان، فقدان الشهية للطعام

ضغط أو الم في العين ضفتونية لدواء، نفاس، انخفاض ضغط الدم أو إرثاك

إذا كنت تلاحظ أيًّا من الأعراض الجانبية الآتية وكانت تزداد، إحكِ طبيبك:

أعراض جانبية شائعة جداً (very common) – أعراض ظهرت لدى أكثر من مستعمل واحد من شرة

احِ طبيبك إذا لم تتناول الدواء طبقاً للوصفة الطبية لأي سبب كان، وإنما فإن الطبيب قد يعتقد بأن الدواء غير ناجع ويقوم بتغيير العلاج دون الحاجة لذلك.

دوار، كل عملية حرارية أو علاج طوارئ، بلغ الطبيب المعالج أو طبيب الأسنان إنك تتناول تجريرول، من شأن هذا الدواء أن يتضاعف مع عدد الأدوية المستعملة في العملية العصرافية.

إذا كنت تتناول الأدواء على العلاج دواء جديد، ذكرِ طبيبك والصيادي خاصتك إنك تعالج به تجريرول.

احِ كل طبيب، طبيب أسنان، أو صيدلي والذين يعالجونك بأنه تعالج بـ تجريرول.

لا يجوز تناول الأدوية في العتمة؛ يجب تشخص طابع الدواء والنأك من المقدار الدوائي في كل مرة تتناول فيها دواء، ضع النظارات الطبية إذا لم الأمر ذلك.

إذا توفر لديك أسلطة إضافية حول إسخدام الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

(4) الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال تجريرول قد يسبب أعراضًا جانبية عند بعض المستعملين.

إذا لم يكن شعورك جيداً خلال فترة العلاج بـ تجريرول، إحكِ طبيبك أو الصيدلي خاصتك بأقرب وقت ممكن.

يمكن أن تكون هناك أعراض جانبية لكل الأدوية، في بعض الأحيان تكون خطيرة، لكن في معظم الأحيان هي ليست كذلك. من المهم أن تتحاج لعلاج طبي بغض النظر الأعراض الجانبية، إن خطورة حدوث أعراض جانبية أكبر إذا كنت فوق عمر 65 سنة.

لا تذهب من قائم الأعراض الجانبية، إنما الجائز لا تتعانى أي منها.

معظم الأعراض الجانبية خفيفة حتى متواضعة وعادة تختفي بعد عدة أيام من العلاج.

إذا كنت تلاحظ أيًّا من الأعراض الآتية، إحكِ طبيبك بشكل فوري أو توجه لغرفة الطوارئ الأقرب:

• علامات لحسانية مثل انتفاخ في الوجه، الشفتيين، اللسان أو أجزاء أخرى من الجسم؛ صفير أو صعوبات في التنفس؛ طفح في الجلد، حكة، شرى، فقدان الوعي

• حيوانات أو جلد متقرضاً

• إرتفاع مفاجئ في حرارة الجسم المصحوب بتعرق، نظم قلب سريع، وهي متغير، إفراز لعاب متزايد وتصلب عضلات.

• أعراض "شبيهة بالإفلوانزا" بشكل ثابت (شعريرة، سخونة، ألم، حبرجة، غدد متتفحة، مفاصل مولدة، عدم حبوبية، ثلوات متكررة)، تزف أو تكتُم سهولة أكثر من العادة، رعاف

• ضيق في التنفس دوار خلال القيام بفعالية جسمانية

• غثيان أو تقيؤات متواصلة، فقدان الشهية للطعام وبشكل عام شعور غير جيد الذي يحتمل أن يصاحبه ألم بطن، سخونة، حكة، جلد أو عينان بلون أصفر، يوم داكن أو براز فاتح اللون

• ألم شديد في البطن العلوي، في أوقات متقاربة مع غثيان، تقيؤات، فقدان شهية للطعام

• إختلالات (نوبات) متكررة أكثر أو شديدة أكثر

• بداية مفاجئة لتشنج عضلات دون سبطة والتي تؤثر على العينين، الرأس، الرقبة والجسم

• إكتئان، سلوك دعوني، تكرار لمرض نفسى سابق، هلوبة (رُؤبة) أو سماع أمرور غير موجود (دورة)

• إنفصال راحتى القدمين والرجلين أو زيادة في الوزن بسبب إحتباس السوائل

• تغير في بضم القلب (سرع بطيء، غير منتظم)، أحياناً مع ألم في الصدر

• تبول أقل من العادة والذي يمكن أن يتصاحب بعدم حبوبية، تقيؤات، صداع، تشنج عضلات وإرثاك

• دم في الور،

• أعراض سفعنة (حرق الشمس) مثل إحمرار، حكة، إنتفاخ أو التغطية بحبوصلات الذي يحدث أسرع من المعتاد

• إنفصال شفات دموية مثل صداع حاد مفاجئ، فقدان فجائي لانتباق أو للرؤيا،

• في الأنسان التشنج عن أغراض جانبية عقب لعاج دوائي الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة

• بضهون (تمثلك) تناول في المفهومات التي يجريها الطبيب من حين لآخر لفحص العين

• إذا طرح عرض جانبى، إذا تلقافت أحدى الأعراض الجانبية، أو عندما تعانى من عرض جانبى لم يذكر في هذه النشرة، يليه استشارة الطبيب.

بالإمكان التخلص عن أغراض جانبية عقب لعاج دوائي بواسطة الضغط على الرابط "تبلغي عن

أعراض جانبية عقب لعاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة عن طريق تصفح الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il>

(5) كيفية تخزين الدواء؟

تحفظ النسخة! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن تناول أيدي الأطفال وأداة زراعة، وذلك لتفادي إصابتهم بالدوسن. لا تسبب التقطيع بدون تعليمات صريحية من الطبيب.

لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنقضاء تاريخ الصلاحية (Exp. Date) الذي يظهر على ظهر العلبة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

لا يجوز الاستعمال إذا كانت العلبة ممزقة أو أن عليها آثار لعطب. في هذه الحالة، أعدها للبدليل.

تجريرو CR 200 ملغ أقراص: 041 24 25416

تجريرو CR 400 ملغ أقراص: 041 23 25417

تجريرو شراب 2%: 015 41 24602

تجريرو شراب 2%: 022 90 24971

من أجل سهولة وتوهين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر، على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.

(6) معلومات إضافية

يحتوى الدواء بالإضافة لل المادة الفعالة أيضاً على:

تجريرو 200 ملغ، تجريرول 400 ملغ:

القرص:

Cellulose, microcrystalline; croscarmellose sodium; polyacrylate dispersion 30%; ethylcellulose aqueous dispersion; talc; silica, colloidal anhydrous; magnesium stearate.

طلاء القرص:

Hypromellose; talc; titanium dioxide; castor oil – polyoxyl hydrogenated; iron oxide yellow; iron oxide red.

تجريرو 200 ملغ: كل قرص يحتوى على حوالي 2.3 ملخ صوديوم.

تجريرو 400 ملغ: كل قرص يحتوى على حوالي 4.6 ملخ صوديوم.

تجريرو 200 ملغ:

كل قرص يحتوى على حوالي 0.46 ملخ صوديوم.

تجريرو شراب 2%:

مليو سكرين الصوديوم، 875 ملخ سوريول سائل، حوالي 0.6ملخ.

Sorbitol liquid (sorbitol 70% non crystallising), propylene glycol, dispersible cellulose (microcrystalline cellulose and sodium carboxymethylcellulose) (Avicel RC 581), hydroxyethylcellulose 300mPa's (HEC250), methyl hydroxybenzoate, polyethylene glycol 400 stearate (macrogol stearate), sorbic acid, saccharin sodium, propylhydroxybenzoate, caramel, purified water.

5 ملخ شراب يحتوى على: 2 ملخ سكرين الصوديوم، 6ملخ بروبيل بارابين 1.5 ملخ، حمض سوربيك 5 ملخ.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة

تجريرو CR 200 ملغ:

قرص لونه برتقالي -بني، بيضوي، مدبب قليلاً من الجانبين. مطبوع عليه C/H من جانب واحد، CG/C/G من الجانب الثاني، خط للنطر من الجانبين.

مسوق بعلبة ذات 50 قرصاً.

تجريرو CR 400 ملغ:

قرص أبيض، مستدير، مسطوح، ذو أطراف مائلة. مطبوع عليه CG من جانب واحد، K/G من جانب واحد.

مسوق بعلبة ذات 50 قرصاً.

تجريرو شراب 2%:

معلى لزج، أبيض.

مسوق بعلبة ذات 250 مللا.

صاحب الإنتشار والمستورد وعنوانه: نوفارتس إسرائيل-م.ض، ص.ب 7126، تل أبيب.

تم إعدادها في أيار 2021 بموجب تعليمات وزارة الصحة.

رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة

تجريرو CR 200 ملغ أقراص: 041 24 25416

تجريرو CR 400 ملغ أقراص: 041 23 25417

تجريرو شراب 2%: 015 41 24602

تجريرو شراب 2%: 022 90 24971

يحتوى الدواء بالإضافة لل المادة الفعالة أيضاً على:

تجريرو 200 ملغ، تجريرول 400 ملغ:

القرص:

Cellulose, microcrystalline; croscarmellose sodium; polyacrylate dispersion 30%; ethylcellulose aqueous dispersion; talc; silica, colloidal anhydrous; magnesium stearate.

يجب تناول الدواء أثناءوجبة الطعام أو بعد الوجبة. هذا يساعد على منع الإزعاج في البطن.

يشكل عام، يجب تناول تجريرول - بـ 2 أو 3 جرعات خلال اليوم لكن الطبيب يبلغك إما

بتناول أقل أو أكثر، وفقاً لحالتك.

إذا كنت تناول تجريرول

إذا كان الوقت لتناول مقدار الدوائي القادم هو أكثر من ساعتين أو ثالث، تناول المقدار الدوائي المنسي حال تذكر، تناول الوجبة القادمة في وقتها الإعتيادي وأكمل بحسب جدول الأدواء.

إذا كان الوقت لتناول مقدار الدوائي القادم هو أقل من ساعتين أو ثالث، قم بتنويم المقدار الدوائي المنسي، تناول المقدار الدوائي القادم في الوقت الإعتيادي وأكمل بحسب جدول الأدواء.

لا يجوز تناول مقداراً دوائياً مضافاً للتعويض عن المقدار الدوائي المنسي. من شأن ذلك أن يزيد من إتّهاب جدّد عرض جانبّي غير مرغوب به.

إذا كنت تجد صعوبة في تذكر موعد تناول الدواء، توجه إلى الصيدلي لتلقي مساعدة.

لأي فترة من الزمن يجب تناول تجريرول

يجب المواظة على العلاج وفقاً لوصية الطبيب.

يساعد تجريرول على السيطرة على حالتك لكنه لا يعالجك. عليك تناول تجريرول كل يوم حتى وإن شعرت بتحسن.

الوقف على العلاج

لا يوجد التوقف عن العلاج بـ تجريرول ولا يوجد تقليل المقدار الدوائي بدون إشتارة الطبيب.

خلال عطل نهاية الأسبوع أو في الأعياد.

إن التوقف المفاجئ عن العلاج أو تقليل المقدار الدوائي قد يسبب أعراضًا جانبية غير مرغوبة أو تفاقم حالتك.

إذا كنت تتناول هذا الدواء لعلاج الصرع، قد تتطور لديك إختلالات (نوبات).

عادة، يقلل الطبيب من المقدار الدوائي بشكل بطيء إلى أن تتمكن من التوقف عن تناول العلاج بشكل تدريجي.

إذا تناولت تجريرول أكثر من المطلوب (مقداراً دوائياً مفرطاً)

إذا تناولت مقداراً دوائياً مفرطاً أو إذا بليطفل بالخطأ من الدواء، توجه حالاً إلى الطبيب أو لغرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر معك علبة الدواء.

عادلة، يقلل الطبيب من المقدار الدوائي بشكل بطيء إلى أن تتمكن من التوقف عن تناول العلاج بشكل تدريجي.

إذا تناولت تجريرول شفافه دموية مثل صداع حاد مفاجئ، فقدان فجائي لانتباق أو للرؤيا، الم في الور، تشنجات عضلية وحساسية متطرفة للضوء الفاتح

صداع شديد مصحوب برقعة متصلية، تشنجات عضلية وحساسية متطرفة للضوء الفاتح

إسهال، أيام بطن وسعوفة، عمليات اضطراب محتمل في المعي الغليظي (

طفح بيقع حمراء بالخاص في الوجه والذئب قد يكون مصحوب براهيف، سخونة، غثيان، فقدان الشهية للطعام

ضغط أو الم في العين ضفتونية لدواء، نفاس، انخفاض ضغط الدم أو إرثاك

إذا كنت تلاحظ أيًّا من الأعراض الجانبية الآتية وكانت تزداد، إحكِ طبيبك:

أعراض جانبية شائعة جداً (very common) – أعراض ظهرت لدى أكثر من مستعمل واحد من شرة

احِ طبيبك إذا لم تتناول الدواء طبقاً للوصفة الطبية لأي سبب كان، وإنما فإن الطبيب قد

يعدك بأن شعورك جيداً خلال فترة العلاج بـ تجريرول، إحكِ طبيبك أو الصيدلي خاصتك

دور، إرهاق، أو نعاس

غثيان أو تقيؤات

أعراض جانبية شائعة (common) – أعراض ظهرت لدى 1-10 مستعملين من بين 100

صداع

رؤية مشوّشة أو مزدوجة، صعوبة في الرؤية

جفاف في الفم

زيادة في الوزن

أعراض جانبية غير شائعة (uncommon) – أعراض ظهرت لدى 1-10 مستعملين من بين 1,000

إسهال

إمساك

أعراض جانبية نادرة (rare) – أعراض ظهرت لدى 1-10 مستعملين من بين 10,000

صعوبة في الكلام أو كلام غير واضح

فقدان الشهوة أو شعور بوخز في اليدين أو في راحتي القدمين

ألم أو إرهاق في البطن

ضعف عام