

## **نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة (مستحضرات) - 1986**

يسوق الدواء بموجب وصفة طبيب فقط.

# **أزييلكت أقراص**

التركيب يحتوي كل قرص على:

Rasagiline (as mesilate) 1 mg راساجيلين (على شكل ميسيلات) 1 ملغم لقائمة المواد غير الفعالة في المستحضر أنظر الفقرة 6 - «معلومات إضافية».

إقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي. وُصف هذا الدواء لعلاج مرضك. لا تعطيه للأخرين. فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن حالتهم الطبية مشابهة لحالتك.

### **1) لأي غرض مخصص الدواء؟**

أزييلكت مخصص لعلاج الباركينسون لدى الكبار وبإمكان إستعماله مع أو بدون تناول ليقوودوبا.

#### **الفصيلة العلاجية:**

مثبطات الإنزيم مونوأمين أوكسيداز الإنتقائي من نوع MAO B. بمرض الباركينسون، يحدث فقدان للخلايا التي تنتج الدوبامين في الدماغ. الدوبامين عبارة عن مادة كيميائية في الدماغ التي تساهم في السيطرة على الحركة. يساعد أزييلكت في زيادة والحفظ على نسب الدوبامين في الدماغ.

### **2) قبل إستعمال الدواء**

لا يجوز إستعمال المستحضر إذا:

- كنت حساساً (الergic) للمادة الفعالة (راساجيلين) أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (أنظر الفقرة 6 «معلومات إضافية»).
- كنت تعاني من قصور كبيدي شديد.

لا يجوز إستعمال أزييلكت بالتزامن مع الأدوية التالية:

- بيتيدين (مسكن قوي للآلام).

• مثبطات مونوأمين أوكسيداز (سواء كانت تعطى كأدوية مضادة للإكتئاب، لمرض الباركينسون أو لأي إستطباب آخر، بما في ذلك مستحضرات طبيعية أو مستحضرات طبية التي تعطي بدون وصفة طبيب مثل نبتة St. John's Wort للإكتئاب).

من الواجب الإنتظار 14 يوماً على الأقل بين التوقف عن تناول أزييلكت وبعد العلاج بمثبطات مونوأمين أوكسيداز أو بـ بيتيدين.

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء

قبل بدء العلاج بـ أزييلكت، إحك للطبيب إذا:

- كنت تعاني من مشكلة في الكبد.

لاحظت تغيرات جلدية مثيرة للشك. إن العلاج بـ أزييلكت قد يزيد من الخطورة لحدوث سرطان الجلد.

يجب إبلاغ الطبيب إذا لاحظت عائلتك / المعالج بأنك تطور سلوكيات شاذة لا تقاوم فيها الدوافع، الإثارة أو الرغبة لتنفيذ أنشطة ضارة أو مدمرة لنفسك أو الآخرين. تعرف هذه الحالة على أنها إضطرابات في السيطرة على الرغبات. لقد لوحظت لدى المتعالجين الذين يتناولون أزييلكت سوية مع أدوية أخرى لعلاج داء پاركينسون، إضطرابات في السلوك مثل سلوك قسري، أفكار وسواسية، الإدمان على القمار، إنفاق مبالغ فيه، دافع لتصرف شاذ، رغبة جنسية شديدة أو أفكار / أحاسيس جنسية زائدة. يدرس طبيبك ملائمة المقدار الدوائي أو إيقاف الدواء (أنظر الفقرة 4 - «الأعراض الجانبية»).

قد يسبب أزييلكت النعاس وقد يسبب لك النوم بشكل مفاجئ خلال النشاطات اليومية، خاصة إذا كنت تتناول أدوية أخرى دوپامينية الفعل (التي تستعمل لعلاج مرض الباركينسون). لمعلومات إضافية إقرأ بتمعن فقرة «السيادةة وإستعمال الماكنات».

#### **الإستعمال لدى الأطفال والمرأهقين**

لم تفحص نجاعة وسلامة أزييلكت لدى فئة الأطفال والمرأهقين، لا يستعمل الدواء لعلاج مرض الباركينسون لدى الأطفال والمرأهقين. لهذا، فإن أزييلكت غير مخصص للإستعمال لمن هو دون عمر 18 سنة.

#### **التدخين**

يجب إبلاغ الطبيب أو الصيدلي إذا كنت مدخناً أو تخطط للإقلاع عن التدخين. يمكن للتدخين أن يخفض نسب الـ أزييلكت في الدم.

#### **التدخلات بين الأدوية**

إذا كنت تتناول، إذا تناولت مؤخراً أو تنوی تناول أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إحك للطبيب أو الصيدلي عن ذلك.

يجب إبلاغ الطبيب بالأخص إذا كنت تتناول الأدوية التالية:

- أدوية مضادة للإكتئاب (مثل ثلاثة الحلقة، رباعية الحلقة، مثبطات إنتقائية لإعادة إمتصاص السيروتونين [SSRIs]، مثبطات إعادة إمتصاص السيروتونين - نورإبينيفرين [SNRIs] ، مثبطات مونوأمين أوكسيداز).

سيپروفلوكساسين (مضاد حيوي ضد التلوث).

ديكسستروميترافان (مثبط للسعال).

الأدوية المقلدة للجملة الودية مثل تلك الموجودة في قطرات العينين، مضادات الإحتقان المعطاة عن طريق الفم وعن طريق الأنف أو أدوية مضادة للزكام التي تحوي إيفيدرين أو پسوجوإيفيدرين.

• بيتيدين - أنظر الفقرة 2 - «لا يجوز إستعمال المستحضر».

يجب الإمتناع عن إستعمال هذا الدواء بنفس الوقت مع

أدوية مضادة للإكتئاب الحاوية على فلوأوكسيتين أو فلوـوكسامين. يجب الإنتظار فترة قدرها 5 أسابيع على الأقل بعد التوقف عن العلاج بـ فلوـوكسيتين وحتى بدء العلاج بـ أزييلكت. من ناحية أخرى، إذا

بدأت العلاج بـ فلوـوكسيتين أو فلوـوكسامين فيجب فعل ذلك بعد 14 يوماً على الأقل منذ التوقف عن العلاج بـ أزييلكت.

#### **الحمل والإعراض**

إذا كنت في فترة الحمل أو الرضاعة، تشكيك بأنك حامل أو تفكرين في الحمل فيجب إستشارة الطبيب أو الصيدلي قبل إستعمال الدواء. يتوجب عليك الإمتناع عن تناول أزييلكت إذا كنت في فترة الحمل، لأن تأثيرات أزييلكت على الحمل وعلى الجنين غير معروفة.

#### **السيادةة وإستعمال الماكنات**

يجب إستشارة الطبيب قبل السيادةة وتشغيل الماكنات، لأن مرض الباركينسون ذاته، وكذلك العلاج بـ أزييلكت، قد يؤثران على قدرتك على القيام بذلك.

يمكن أن يسبب أزييلكت الدوار أو النعاس وكذلك يمكن أن يؤدي أيضاً إلى حدوث مفاجئ.

يمكن أن يزداد التأثير إذا كنت تتناول أدوية أخرى لعلاج أعراض مرض الباركينسون لديك، أو إذا كنت تتناول أدوية التي قد تسبب لك النعاس، أو إذا كنت تشرب الكحول خلال فترة تناول أزييلكت.

لا يجوز السيادةة أو تشغيل الماكنات إذا قاسيت في الماضي، أو خلال فترة تناول أزييلكت، من الشعور بنعاس و/أو حداث لنعم مفاجئ.

### **3) كيفية إستعمال الدواء؟**

يجب دائماً إستعمال الدواء حسب تعليمات الطبيب.

عليك الإستيقاظ من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن واثقاً بخصوص الجرعة الدوائية وطريقة العلاج بالمستحضر.

الجرعة الدوائية وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط. الجرعة الدوائية الإعتيادية هي عادة:

قرص واحد من عيار 1 ملغم مرة في اليوم، مع أو بدون طعام.

يجب إستعمال هذا الدواء في أوقات محددة حسب ما حدد من قبل الطبيب المعالج.

لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به لا يجوز السحق / الشطر / المضغ! يجب بلع القرص كاملاً مع الماء.

إذا تناولت بالخطأ جرعة دوائية أكبر

إذا تناولت جرعة دوائية مفرطة أو إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء، توجه حالاً إلى الطبيب أو لغرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر معك علبة الدواء.

يمكن أن يتجلّى فرط الجرعة الدوائية من أزييلكت بالأعراض التالية: معنويات عالية قليلاً (شكل بسيط من الهوس)، ضغط دم مرتفع جداً ومتلزمة السيروتونين (أنظر الفقرة 4 - «الأعراض الجانبية»).

إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المحدد، فلا يجوز تناول جرعتين دوائين سوية للتعويض عن الجرعة الدوائية المنسيّة. تناول الجرعة الدوائية التالية في الوقت الإعتيادي.

يجب المواجهة على العلاج حسب توصية الطبيب. لا يجوز التوقف عن العلاج بـ أزييلكت بدون إستشارة الطبيب حتى ولو طرأ تحسن على حالتك الصحية.

يتبع

تمت

لا يجوز تناول أدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال هذا الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.

#### 4) الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال هذا الدواء قد يسبب أعراضًا جانبية عند بعض المستعملين. لا تندهن من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني أي منها.

**يجب التوجه حالاً للطبيب إذا:**

• تطورت لديك سلوكيات شاذة مثل سلوك قسري، أفكار وسواسية، الإدمان على القمار، الإنفاق أو الشراء بشكل مبالغ فيه، سلوك ناجم عن دافع (إندفاعي) ورغبة جنسية زائدة عن المعتاد أو أفكار جنسية متزايدة (إضطرابات التحكم في الدافع) (أنظر الفقرة 2 - «قبل إستعمال الدواء»).

• كنت ترى أو تسمع أشياء غير موجودة (هذيان).  
• وجد لديك أي مزيج من هذيان، سخونة، عدم راحة، إرتجاف أو تعرق (متلازمة السيروتونين).  
**يجب التوجه للطبيب إذا لاحظت تغيرات جلدية مثيرة للشك لأنه قد تكون هنالك خطورة زائدة لحدوث سرطان الجلد (ميلانوما) عند إستعمال هذا الدواء (أنظر الفقرة 2 - "قبل إستعمال الدواء").**

#### أعراض جانبية إضافية

أعراض جانبية شائعة جداً - أعراض تظهر لدى أكثر من مستعمل واحد من بين عشرة:

• حرکات لا إرادية (dyskinesia)

• صداع

أعراض جانبية شائعة - أعراض تظهر لدى 10-1 مستعملين من بين 100:

• آلام في البطن

• سقوط

• ردود فعل تحسسية

• سخونة

• إنفلونزا

• شعور عام بوعكة

• آلام في الرقبة

• ألم في الصدر (ذبحة قلبية)

• إنخفاض ضغط الدم عند الانتقال من وضعية الجلوس إلى الوقوف مع أعراض مثل الدوار (anorexia

• إمساك

• جفاف الفم

• غثيان وتقيؤ

• غازات في الجهاز الهضمي

• عدم سلامة نتائج فحوص الدم (leucopenia -

قلة خلايا الدم البيضاء)

• آلام مفصلية

• آلام عضلية

• إلتهاب المفاصل (arthritis)

• خدر وضعف في عضلات راحة اليد (Carpal Tunnel Syndrome)

• تناقص الوزن

• أحلام شاذة

• صعوبة في تناسق العضلات (إضطراب في التوازن)

• إكتئاب

• دوار (فيرتيغو)

• تقلص متواصل للعضلات (dystonia)

• رشح (إلتهاب الأنف)

• تهيج الجلد (إلتهاب الجلد - dermatitis)

• طفح

• إحمرار وإنفاس العينين (إلتهاب الملتحمة)

• الإلحاح على التبول

أعراض جانبية غير شائعة - أعراض تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 1,000:

• سكتة دماغية

• نوبة قلبية (إحتشاء عضلة القلب)

• طفح الذي يظهر على شكل حويصلات

أعراض جانبية شيوعها غير معروفة (لا يمكن معرفة الشيوع من المعلومات المتوفرة)

• إرتفاع ضغط الدم

• نعاس مفطر

• النوم المفاجئ

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط «تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي» الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبلغ عن أعراض جانبية أو عن طريق تصفح الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il>

#### 5) كيفية تخزين الدواء؟

• تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي و المجال رؤية الأطفال و/أو الرضع وذلك لتفادي إصابتهم بالتسوس. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

• لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنتهاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على العلبة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

• يجب التخزين في مكان بارد دون 25 درجة مئوية، يحفظ الدواء في العلبة الأصلية.

• لا يجوز رمي الأدوية في المجاري أو في القمامات. إسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من أدوية لم تعد قيد الإستعمال. هذه الوسائل تساعده في الحفاظ على البيئة.

#### 6) معلومات إضافية

يحتوي الدواء بالإضافة للمادة الفعالة أيضاً: Mannitol, starch, pregelatinized starch, stearic acid, talc, colloidal silicon dioxide.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة قرص مستدير لونه أبيض أو أبيض عكر مع الطباعة «GIL» في جانب واحد من القرص وتحته «1» وبدون طباعة في الجانب الثاني من القرص.

تحتوي العلبة على 10 أو 30 قرصاً.

من الجائز ألا تسوق كافة أحجام العلب.

إسم المنتج وصاحب الإمتياز وعنوانه

تيفع للأدوية والمستحضرات الطبية م.ض.

ص.ب. 3190، بيتح - تكفا.

تم إعداد النشرة في تشرين الثاني 2020 بموجب تعليمات وزارة الصحة

رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:

132.17.31000

من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر. على الرغم من ذلك، فإن

الدواء مخصص لكلا الجنسين.