

## فوزيد أفراد

أفراد

التربك

يحتوي كل قرص على:  
Furosemide 40 mg  
فوروسيميد 40 ملг

- ديجوكسين (القلب)  
• موكسيسالات علاج متلازمة رينو (Raynaud's syndrome)
- بيتاراتات (علاج الذبحة الصدرية)  
• ليثيوم (العلاج الاكتئاب أو الهوس)
- سوك الفات لعلاج فرخ العدة
- كولستاترين أو كوليستينيل لعلاج الكوليسترول المرتفع
- أدوية مضادات التهاب غير مترنوجيبية (NSAIDs) مثل ايبوبروفين أو ناپروکسین
- أسيبرين (الالم)
- مضادات حيوية لعلاج العدوى التي تؤثر في الكلى أو الأذنين (مثل سيفاكلور، كوليستين، فنكلوبينين، فنكلوبينيزين)
- أمفيتامين (علاج العدوى الفطرية)
- هيرات الكوالول (علاج الأرق)
- مضادات الاكتئاب (مثل: مثبطات أكسيداز أحادي الأمين - MAOIs)
- أدوية السكري مثل إنسولين أو إفراد
- مضادات الاختلالات مثل فينيترين أو كاربامازين
- كورتيكوستيرويدات أو مضادات الهيستامين (العلاج ردود الفعل التحسسية)
- أدوية لعلاج اضطرابات الاصغاء والتركيز (ADHD)
- أدوية لعلاج السرطان مثل الديسيلوين
- ليغوروبا (العلاج من مرض باركنسون)
- أفراد منع الحمل
- البوتاسيوم لعلاج العجز الجنسي
- بعض الأدوية لعلاج البرو مثل ثيونيفلين أو ساليوتامول
- بروبيتنيد لمنع القرص (Gout)
- أدوية مسلحة تؤخذ طوال فترة طولية
- أدوية منتجات اطعمية تتضمن عرق السوس
- إذا كنت تتعاطى منع الحمل
- روکورونيوم أو مواد تخدیر. عليك إبلاغ طبيب التخدير، طبيب الأسنان أو الطبيب.

### استعمال الدواء والغذاء

- يمكن تناول الدواء مع الطعام.

### استعمال الدواء واستهلاك الكحول

- عليك تجنب استهلاك الكحول عندما تتناول فوزيد أفراد لأن هذه الخطوة قد تسبب انخفاض إضافي في ضغط دمك.

### الحمل والإرضاع

- يجب استشارة الطبيب قبل البدء بتناول فوزيد أفراد إذا كنت حاملاً، تخطيـن للحمل، أو إذا كنت مرضعة.

### السياسة واستعمال الماكينات

- لا تقيـدة أو شـغل مـاكـينـات إذا شـعرت بـتنـصـقـيـة بعد تـناـول فـوزـيدـ أـفرـادـ.

### معلومات مهمة عن قسم من مركيـات الدـاوـاء

- يجـتوـيـ فـوزـيدـ أـفرـادـ عـلـىـ الـلـكـتـوزـ (ـسـكـرـ الـحـلـيـ). إذا أـخـرـكـ طـبـيـكـ بـأـنـكـ تعـانـيـ منـ عـدـمـ الـقـدـرةـ علىـ تـحـقـيقـ سـكـرـاتـ معـيـنةـ، عـلـىـ الـاتـصـالـ بـالـطـبـيـبـ الـعـالـاجـ قـبـلـ تـناـولـ هـذـاـ الدـاوـاءـ. اـنـظـرـ أـيـضاـ

### الـلـيدـ 6 - "معلومات إضافية".

### 3. كيف تستعمل الدواء؟

- يـجبـ استـعمـالـ مـضـافـاتـ خـاصـةـ حتـىـ تـعـلـيمـاتـ الطـبـيـبـ.
- عليـكـ الفـصـصـ معـ الطـبـيـبـ أوـ الصـيـادـيـ إـذـاـ لـمـ تـكـنـ مـتـكـذاـ فـيـماـ يـتـعـلـقـ بـالـجـرـعـةـ وـبـطـرـيـقـ الـعـالـاجـ.

### الجرعة الدوائية

- الجرعة وطريقة العلاج يحددهما الطبيب فقط.
- بـالـنـمـيـنـ الـطـبـيـبـ الـجـرـعـةـ لـكـ مـرـيـضـ وـقـقـ حـالـةـ الـمـتـعـالـجـ وـرـدـ فـعـلـهـ.

### يـمـنـعـ تـجـاـوـيـ الـجـرـعـةـ المـوـصـىـ بـهـ.

- يـمـنـعـ تـجـاـوـيـ الـجـرـعـةـ المـوـصـىـ بـهـ.

### طـرـيـقـ الـاسـتـعـالـ

- ليـسـتـ هـذـاـ مـلـعـومـاتـ جـوـلـ مـحـقـقـ القرـصـ.
- يـمـنـعـ تـجـاـوـيـ الـجـرـعـةـ المـوـصـىـ بـهـ.

- يـمـنـعـ تـجـاـوـيـ الـجـرـعـةـ المـوـصـىـ بـهـ.
- إـذـاـ تـنـتـلـوـتـ جـرـعـةـ أـعـلـىـ إـذـاـ قـامـ بـإـتـالـعـ كـيـةـ مـنـ الدـاوـاءـ عـنـ طـرـيـقـ الـخـطـاءـ، تـوـجـهـ حـالـةـ إـلـىـ الـطـبـيـبـ أـوـ إـلـىـ عـرـقـةـ الـطـارـيـ الـتـابـعـةـ لـلـمـسـتـشـفـيـ مـصـطـبـةـ عـيـدةـ الدـاوـاءـ مـعـكـ. شـتـمـلـ عـلـامـاتـ

### إـذـاـ تـنـتـلـوـتـ عـنـ طـرـيـقـ الـخـطاـ، جـرـعـةـ أـعـلـىـ

- إـذـاـ تـنـتـلـوـتـ جـرـعـةـ أـعـلـىـ إـذـاـ قـامـ بـإـتـالـعـ كـيـةـ مـنـ الدـاوـاءـ، تـنـاـولـ الـجـرـعـةـ التـالـيـةـ فـيـ الـوقـتـ الـإـيـعادـيـ. لاـ يـجـوزـ تـنـاـولـ جـرـعـةـ مـضـافـاتـ تـعـوـضاـ عـنـ الـجـرـعـةـ الـمـنـسـيـةـ.

- يـجـبـ الدـاـواـمـةـ عـلـىـ الـعـلـاجـ تـيـعـاـنـيـاتـ الطـبـيـبـ.
- يـجـبـ إـذـاـ تـرـاحـسـ عـلـىـ حـالـتـ الصـحـيـةـ، لـاـ يـجـوزـ لـكـ التـرـقـفـ عـنـ الـعـلـاجـ بـالـدـاوـاءـ مـنـ دونـ اـسـتـشـارـةـ الطـبـيـبـ.

- يـمـنـعـ تـنـاـولـ الـأـدـوـيـةـ فـيـ الـظـلـامـ! تـحـقـقـ مـنـ الـمـلـصـقـ عـلـىـ عـوـةـ الدـاوـاءـ وـمـنـ الـجـرـعـةـ الـمـوـانـيـةـ فـيـ

- كـلـ مـرـةـ تـنـتـلـوـتـ فـيـهـاـ دـاوـاءـ. ضـعـ النـظـارـاتـ الطـبـيـةـ إـذـاـ كـنـتـ بـحـاجـةـ إـلـيـهاـ.

- إـذـاـ كـانـتـ لـدـيـكـ أـسـنـةـ إـضـافـيـةـ بـالـنـسـبـةـ إـلـىـ اـسـتـعـالـ الدـاوـاءـ فـاسـتـشـرـ الطـبـيـبـ أـوـ الصـيـادـيـ.

نـكـلـمـةـ

## ٤. الأعراض الجانبية

- جميع الأدوية، قد يسبب اسخدام فوزيء أعراض جانبية لدى بعض المستخدمين. لا تفزع عن قراءة قائمة الاعراض الجانبية. فمن المحتمل الا عاتني من أي منها.
- يجب التوجيه إلى الطبيب أو إلى المستشفى فوراً إذا عاتني من أحد الأعراض التالية:
- رد فعل تحسسي خطير قد يشتمل على مفعح جلدي، حكة، التهاب الجلد، تشقق الجلد، حساسية تجاه ضوء الشمس أو مصايب التصفق أو حمى، تورم الوجه، الشقق، اللسان أو الحنجرة أو صعوبة في التنفس أو الارتفاع.
  - قد تتشكل بترات أو قد يتشكل الجلد حول التشققين، العينين، الفم، الأنف والأعضاء التناسلية، أعراض شبيهة بالطلقانز وأوسع مما شأنها أن تتشكل حالة تدعى متلازمة متخفف جونسون.
  - التهاب الأوعية الدموية (vasculitis) ، الذي قد يغير عدد المرات التي تتوال فيها إلى انتفاخ المفاصل أو الربو. قد عاتني من حمى، شعور بالتعب، تورم أو حساسية في الساقين.
  - حلقة دموية (ذري) إلى الماء، تورم أو حساسية في الكاحل.

### أعراض جانبية إضافية

عليك بإبلاغ الطبيب أو المصيلعي إذا اخترت أحد الأعراض الجانبية التالية:

- أعراض جانبية شائعة جداً (تحث لدى أكثر من مستعمل واحد من بين 10 مستعملين):
- خفاف، تغبير توازن السائل والمواد في الجسم (مثل الصوديوم، الكالسيوم، الكالسيوم والماغنيسيوم)، الذي يؤدي إلى خفاف الفم، ضعف، تعب أو تعب، عدم الهدوء، احتلالات، ألم في المضلات، ستفق أو تشنجات، سخط مد منخفض الذي يؤدي إلى انتفاخ الترفيز وردود فعل طبية، صعوبة في التنفس، تغير نظم قلب سريعة أو غير منتظم، غثيان وتقيؤات

### أعراض جانبية شائعة (تحث لدى حتى مستعمل واحد من بين 10 مستعملين):

- فقد حجم الدم (hypovolaemia)
  - ارتفاع مستوى الكرياتينين والبوريما في الدم (urea) (يظهر في فحوصات الدم)
- أعراض جانبية ليست شائعة (تحث لدى حتى مستعمل واحد من بين 100 مستعمل):
- فقد الماء الذي يؤدي إلى تعب، ضيق في التنفس، تزيف شد أو كمات
  - تغيرات في الجسم التي تظهر في فحوصات الكولسترول، جلوكوز، حمض البوريك (Gout)
  - تغيرات في الرؤية تشمل على تشوش الرؤية أو رؤية ضفاء

- دوخة، شعور بضياع في الرأس، صداع، تعب، ضعف، تغيرات في الرؤية، خفاف في القول، دوار عند الوقوف

### وبتيرة نظم قلب غير منتظم

### تشنج المضلات أو ضعف

### تغيرات في كمية البول أو في الحاجة إلى التبول

### تبغ

- خفاف في الفم، عطش، غثيان أو تقيؤات، تغيرات في حرارات الأمعاء تشمل على إسهال وإنفاس)

### (غير معتمج أحياناً)

### أعراض جانبية نادرة (تحث لدى حتى مستعمل واحد من بين 1,000 مستعمل):

- تغيرات في خلايا الدم، مثل: كمية خلايا الدم البيضاء، انتفاخ عدد الصفائح الدموية الذي يؤدي إلى طفح، حمى، عرق، تعب، انتفاخ الوزن. يجري الطبيب فحوصات دم روتينية للتأكد من أنه لم تطرأ تغيرات
- اضطرابات نفسية لا يمكن صنفتها بشكل آخر، يؤدي إلى أوهام، هلوسة، كلام غير منتظم
- شعور بالخذر والوخز أو شعور باللسلع
- زرنيق، ايداع، تعب، شعور بالدمع غير جيد، حمى
- طفلين في الآذنين، انتفاخ السمع الذي يمكن مترجمها غالباً
- اعراض دسمة مثل تغيرات في وترة نظم القلب، ضيق في التنفس، جلد رطب وبارد
- التهاب البنكرياس الذي يؤدي إلى آلام في البطن أو الظهر وغثيان
- تغيرات في الكبد تؤدي إلى اصفرار الجلد أو بياض العينين

### طفح جلدي

أعراض جانبية نادرة جداً (تحث لدى حتى مستعمل واحد من بين 10,000 مستعمل):

- حركات عضلية لا إرادية
- التهاب أو فشل الكلوي اللاذن قد يؤديان إلى الماء في الظهر أو إلى تغييرات في كمية البول الحاجة إلى التبول
- أعراض جانبية غير معروفة (أعراض لم تحدث وتنشرها بعد):
  - تدهور الحالة بعد التوصل إلى توازن المسوائل أو توازن مواد في الجسم صدفية بثرية متعممة واحدة (AGEP) (طفح سيسيء دواء، يكون خطيراً ومصحوباً بحمى دوخة، إعفاء وفقدان الوعي ( يحدث بسبب انخفاض ضغط الدم الذي الأعراض)
  - انخفاض مستويات البوتاسيوم في الجسم
- أعراض جانبية للأدوية المورقة (ductus arteriosus) أو إن إغلاقه
- ارتفاع ضغط حوت دم إغلاق القناة الشريانية (ductus arteriosus) أو يكون بطيناً لدى الذئب
- صحي في الكلى لدى الأطفال

إذا ظهر أعراض جانبية، إذا تفاقم أي من الأعراض الجانبية، أو إذا عاتني من عارض جانبية لم تذكر في النشرة، عليك استشارة الطبيب.

يمكن إبلاغ وزارة الصحة بالآعراض الجانبية عبر الضغط على رابط "الإبلاغ عن الأعراض الجانبية" بسبب العلاج (الداوني)، الموجود في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة الإلكترونية أو عبر الدخول إلى الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il>

### ٥. كيف يخزن الدواء؟

- تحجب النساء يجب حفظ هذا الدواء، وكل دواء آخر، في مكان مغلق، بعيداً عن متناول أيدي ومجار رؤبة الأولاد وأو الأطفال، وهذا تجحب النساء. لا تسبب التقى دون تعليمات صريحة من الطبيب.
- يمنع استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) (الظاهر على العبوة). تاريخنتهاء الصلاحية يعطى إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- يجب الانتظام بالدواء في مكان بارد وجاف، بدرجة حرارة أقل من 25°C.
- يمنعقاء الأدوية في مياه الصرف الصحي أو حاوية القمامه. أسلال المصيلعي كف علىك التخلص من الأدوية غير المستعملة. تساعد هذه التدابير في حماية البيئة.

### ٦. معلومات إضافية

إضافة إلى المادة الفعالة، يحتوي الدواء أيضاً على:  
Lactose, microcrystalline cellulose, starch, crospovidone, povidone, colloidal silicon dioxide, magnesium stearate, propylparaben, butylparaben.

يحتوي كل قرص على 36 ملغم لاكتوز.

### كيف يبدو الدواء وماذا تحتوي المجموعة:

قرص أبيض، مستدير ومسطح وعليه الطباعة "TEVA" في جانب واحد، وخط للشطر في الجانب الآخر من القرص.

أحجام العبوة: 25 قرصاً، 30 قرصاً، 50 قرصاً، و 1000 قرص

قد لا تتحقق كافية أحجام العبوات.

اسم صاحب التسجيل والمنتج و عنوانه:

يُطبع لصناعة الأدوية والمستحضرات الدوائية مصر.

ص.ب. 3190، 49131-جناح-تكتا

تم تحرير النشرة في كانون الأول 2020 وفق تطليمات وزارة الصحة

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة: 2020.20472

لتبسيط قراءة هذه النشرة وتسهيلها ورد النص بصيغة المتذكر. على الرغم من ذلك، الدواء معد لأبناء كلا الجنسين.