

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו - 1986
התרופה משוקקת ללא מרשם רופא

סוויס רליף ספריי ג'ל 4% תמיסה

חומר פעיל: 1 גרם מכיל:
Diclofenac Sodium 40 mg (4%)
(דיקלופנאק סודיום).
חומרים בלתי פעילים ואלרגנים בתכשיר:
ראה סעיף 6 "מידע נוסף".

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח. עליו להשתמש בתרופה זו פי הוראות בסעיף 3 בעלון זה. היוועץ ברופא אם הינך זקוק למידע נוסף. עליו לפנות אל הרופא במידה שתסמיני המחלה (סימפטומים) מממרים או אינם משתפרים לאחר 3 ימים.

1. למה מיועדת התרופה?

להקלה מקומית בכאב ודלקת, קלים עד בינוניים, בעקבות פגיעה במפרקים קטנים עד בינוניים וסביבתם.
קבוצה תרופוטי: נוגדי דלקת לא סטרואידים (NSAIDs).

2. לפני השימוש בתרופה

- אין להשתמש בתרופה:**
- אם אתה גרש (אלרגי) לחומר הפעיל דיקלופנאק סודיום, לטוסינה או לאחד המרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה שימשה בסעיף 6).
 - אם היתה לך תגובת רגישות לאספירין (חומצה אצטילסליצילית - acetylsalicylic acid) או לכל תרופה אחרת השייכת למשפחת נוגדי הדלקת הלא סטרואידים (NSAIDs) כגון איבופרופן, שבאה לידי ביטוי בקשי"ש, גיחה וזלת.
 - אם הינך בשלושת החודשים האחרונים של הריון - נא עיניי בסעיף המתייחס להיריון ולהנקה (ראי סעיף "הריון, הנקה ופוריות").
 - בפעמים פתוחים, דלקות או זיהומי עור וכן באקזמה או רק קמנות ריזיות.
 - תרופה זו אינה מיועדת לילדים ומתבגרים מתחת לגיל 15. מתחת לגיל זה יש לפנות לרופא.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה לפני הטיפול בסוויס רליף ספריי ג'ל, ספר לרופא אם:

- אתה סובל או סבלת בעבר מכיבים בקביה, במעיית כבד או בכליות, ממטי"ח לדמם או ממחלת מעי דלקתית.
- סבלת בעבר מאסתמה או אלרגיות.

אזהרות נוספות

- אל תרסס על העיניים, האף או הפה, על פעמים פתוחים או באזורים מודלקים בעור.
- אם החדת טבעות לתוך העיניים, שטוף אותן היטב במים קרים ודחוף על זה לרופא שלך.
- לעולם אל תבלע את התרופה.
- אל תישף לשמש או תשתמש בממרות שיוזר במהלך השימוש בתרופה הזאת.
- הפסק להשתמש בתרופה אם מתפתחת פריחה ללשה בעורך.
- אל תכסה את האזור המטופל בתחבושת או בפלסטר אטומים (עמידים למים או שאינם מאווררים).
- אל ניתן לשלול תופעות לוואי מערכתיות אם משתמשים בתרופה על שטחי עור גדולים ובמשך זמן ממושך.
- ניתן לצמצם את תופעות הלוואי על ידי שימוש במנה האפקטיבית הקטנה ביותר ולמשיך זמן הקצר ביותר האפשרי.

אינטראקציות ותגובות בין תרופות

- אם אתה נוטל או אם נטלת לאחרונה תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.** במיוחד אם אתה נוטל:
 - טבליות, כמוסות או פתילות נגד כאבים, כולל כאלה שמכילות דיקלופנאק סודיום (diclofenac sodium), וחומצה אצטילסליצילית (אספירין) או כל מרכיב נוגד דלקת אחר, כגון איבופרופן.
 - השימוש בתרופות נוגדות דלקת שאינן סטרואידים (NSAIDs) אחרות (כולל חומצה אצטילסליצילית או איבופרופן) בעל-זמנית עם סוויס רליף ספריי ג'ל עלול להגביר את הסיכון לתופעות תופעות לוואי.

הריון, הנקה ופוריות

הייעוץ עם הרופא או הרוקח שלך לפני שאת נוטלת תרופה כלשהי.
אם את בהריון או מיניקה, ושחבת שאת עשויה להיות בהריון או מתכננת הריון, הייעוץ עם הרופא ספר על כך לפני שאת משתמשת בסוויס רליף ספריי ג'ל.
אין להשתמש בסוויס רליף ספריי ג'ל במהלך שלושת החודשים האחרונים של ההיריון. כי זה עלול לגרום נזק לעובר או בעיות בלידה. לתכשיר זה קיימת תופעת לוואי אפשרית של פגיעה כלילית בעובר ומיומט מי שפיר, החל משבוע 20 להריון. מומלץ להימנע משימוש בתכשירים ממשפחת ה-NSAIDs החל משבוע 32 להריון ולהיוועץ באיש צוות רפואי במידת הצורך.
השימוש בסוויס רליף ספריי ג'ל בששת

החודשים הראשונים של ההיריון חייב להיעשות תחת פיקוח רפואי ויש להקטין את המינון ולקצר את משך הטיפול ככל האפשר. השימוש בסוויס רליף ספריי ג'ל במהלך ההיכה היא להיעשות תחת פיקוח רפואי בלבד, מאחר שכמויות קטנות של דיקלופנאק סודיום (diclofenac sodium) חודרות לחלב האם. כמו כן, אין למרוח סוויס רליף ספריי ג'ל על השדיים של נשים מיניקות ולא על שטחי עור גדולים או למשך זמן ארוך.

הערה לשימוש במכונות

מריחת העור בסוויס רליף ספריי ג'ל אינה משפיעה על היכולת לנהוג או להשתמש במכונית.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

התרופה מכילה:
פרופילן גליקול (propylene glycol), שעלול לגרום לגירוי מקומי קל בעור לאנשים מסוימים. ישנן מנטה (peppermint oil), שעלול לגרום לתגובות אלרגיות.
סויה, אם אתה אלרגי לבוטנים או לסויה אל תשתמש בתרופה זו.
33 מ"ג אתנול ב-1 גרם, שעלול לגרום לתחושת צריבה על עור פגוע.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

השתמש תמיד כפי שהרופא או הרוקח הורו לך, עליו לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח.
סוויס רליף ספריי ג'ל הינו תרסיס המכיל תמיסה. בעת התזה על העור, התמיסה הופכת לג'ל.
תרופה זו אינה מיועדת לתינוקות וילדים מתחת לגיל 15. מתחת לגיל זה יש לפנות לרופא.

אופן השימוש

- הסר את מכסה המגן.
- החזק את הבקבוק במצב זקוף והשתמש ע"פ ההוראות על האזור הכואב או הנפוח. הרז על 15 המנות המומלצת.
- המינון המומלץ בדרך כלל הוא:
 - מבוגרים וילדים מגיל 15: 4-5 התזות 3 פעמים ביום. מספר ההתזות תלוי בגודל האזור הפגוע. מספר ההתזות המרבי הוא 15 פעמים ביום. המנות המרבית לכל מנה בודדת לא תעלה על 5 התזות.

אין לעבור על המנה המומלצת

יש לטעות את הגל בעדינות לא תוך העור. לאחר מכן שטוף את ידך, אלא אם הטיפול מיועד לילדים.

המנות עד שהגל יתייבש לפני שתכסה את העור בבגדים או בתחבושת. היזהר, כי התרסיס יכול להכניס את בגדיך כאשר הוא רטוב.

הפסק את הטיפול כאשר התסמינים שלך (כאב ונפיחות) משתפרים.
אל תשתמש במשך יותר משבועה ימים מבלי להתייעץ עם הרופא שלך.

אם אין שיפור בתסמינים שלך לאחר שלושה ימים, או אם התסמינים שלך מחמירים, פנה לרופא.
יש להימנע ממגע עם העיניים או עם קמנות ריזיות.

אין לבלוע את התרופה! התרופה מיועדת לשימוש חיצוני בלבד.

אם נטלת טבעות מינון גבוה יותר

אם השתמשת בכמות גדולה יותר של התרופה שלך מכפי שאתה צריך, נגב את העורף של סוויס רליף ספריי ג'ל בתרסיס באמצעות ממתחה.

אם שכחת ליטול את התרופה בזמן הדרוש, השתמש בתרסיס ברגע שזכרת, אבל אל תמרח בבת-אחת יותר מן המנה המומלצת. לאחר מכן השתמש בקודם. אל תשתמש במנה כפולה כדי לפצות על המנה שנשכחה.

אם בלעת או טבעות בלע משהו מן התרופה, פנה מיד לחדר מיון של בית חולים והבא את אריזת התרופה והעלון הזה איתך.

אין ליטול תרופות בחושרן בודק התווית והמנה בכל פעם שחשיר לוקח תרופה. הרכב משפיים אם הינך זקוק להם.
אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברופא.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בסוויס רליף ספריי ג'ל עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל לרופא רשימת תופעות הלוואי. יתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

יש להפסיק את השימוש:

- אם מתפתחת פריחה ללשה בעורך. תגובות באזור המריחה בעקבות השימוש בתרופות לשימוש מקומי (למריחה על העור) המכילים דיקלופנאק (diclofenac) דוחו בואון שיכח (10-14 מתוך 100 אנשים). התגובות האלה כוללות פריחות, גירוד, אדמומיות, תחושת צריבה או קשקשת על העור.

יש להפסיק את השימוש ולפנות מיד לרופא אם אתה מבחין ב:
סימן כלשהו של אלרגיה מבין אלה המפורטים להלן:

פריחת עור עם שלפוחיות (נדיר) - יכול להופיע אצל אחד עד עשרה מכל 10,000

אנשים) ורגישות יתר (כול ספרדת) מאוד - יכול להופיע אצל פחות מאחד מכל 10,000 אנשים).
• צפופים, קוצר נשימה או תחושת לחץ בחזה (אסתמה) (נדיר מאוד) - יכול להופיע אצל פחות מאחד מכל 10,000 אנשים).
• התנפחות של הפנים, השפתיים, הלשון או הגרון (נדיר מאוד - יכול להופיע אצל פחות מאחד מכל 10,000 אנשים).

תופעות לוואי נוספות:

תופעות לוואי שכיחות (common) - תופעות שמופיעות ב-10 עד 100 משתמשים מתוך 100 פריחת עור, אקזמה, אדמומיות, דלקת בעור (כולל דלקת עור מגמע). גרד*.

תופעות לוואי נדירות מאוד (very rare) - תופעות שמופיעות בפחות משתמש אחד מתוך 10,000 אנשים.

העור יכול להיות רגיש יותר לשמש. סימנים אפשריים הם כווית שמש עם גירוד, נפיחות שלפוחיות.
• פריחה עם מוגלה.

תופעות לוואי ששכיחות אינה ידועה (תופעות ששכיחותן טרם נקבעה)

• תגובות באזור ההתזה, עור יבש, תחושת צריבה.

*גרד דווח בשכיחות של 0.9% במחקר קליני, 236 מטופלים עם עיקום הקרסול טופלו ב-4.5 ריסוסים של סוויס רליף ספריי ג'ל 3 פעמים ביום (120 מטופלים) או בפלסבו (116 מטופלים) במשך 14 יום.

אם משתמשים בתרופה ללא מרשך זמן ארוך ו/או משתמשים בה על שטחי עור גדולים, עלולות להופיע תופעות לוואי מערכתיות כגון: כאבי בטן והפרעות במערכת העיכול, צרבת, או בעיות כבד או כליות ותגובות רגישות יתר.

אם הפגיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה, או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא הזכרנה בעלון, עליו להתייעץ עם הרופא.

דיחון על תופעות לוואי:

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לוחית על הקישור "דיחון על תופעות לוואי" עקב טיפול רופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המוקן לדיחון על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור: <http://sideeffects.health.gov.il>

בנוסף, ניתן לדווח לחברת פריגו באמצעות הכתובת הבאה:
www.perrigo-pharma.co.il

5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אין לגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי הבקבוק והאריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של החודש.
- אחסן באריזה המקורית מתחת ל-25°C.
- לאחר הפתיחה הראשונה ניתן להשתמש במשך 6 חודשים, אך לא יאוחר מתאריך התפוגה.
- אין להשליך את התרופה לשפכים או לפסולת הביתית. התייעץ עם הרוקח כיצד יש להיפטר מהתרופה. זה יסייע לשמירה על הסביבה.

6. מידע נוסף

נוסף על החומר הפעיל, התרופה מכילה גם:
Purified water, Propylene glycol, Isopropyl alcohol, Soy bean lecithin 76%, Ethanol anhydrous, Disodium phosphate dodecahydrate, Peppermint oil, Sodium dihydrogen phosphate dihydrate, Disodium edetate, Ascorbyl palmitate, Hydrochloric acid, Sodium hydroxide

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:
בקבוק זכוכית בצבע חום כהה בעל פיית התזה. מכיל תמיסה בצבע צהוב-זהוב שקוף, שהמקם שלה לאחר ההתזה הוא דמוי ג'ל.

קיים בגדלי אריזה של 12.5 גרם, 25 גרם. ייתכן שלא כל סוגי האריזות שיווקו.

בעל הרישום: פריגו ישראל סוכנויות בע"מ, רח' רקפת 1, שוהם.
יצרן: מיקה פארמה, ספייר, גרמניה.

נערך במאי 2021 בהתאם להחלטות משרד הבריאות.

מס' רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 13839.31668
לשם הפטנט והלקלת הקריאה עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לשני המינים.