

3. كيف تستعمل الدواء؟

يجب استعمال المستحضر دواماً وفق تعليمات الطبيب، عليك استشارة الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكداً من الجرعة الدوائية ومن كيفية العلاج بالمستحضر.

الجرعة الدوائية وكيفية العلاج سيحدّدهما الطبيب فقط. الجرعة الدوائية المتبعة عادة هي:

للبالغين والأولاد فوق سن الـ 12: 2 أقراص، 3 مرات في اليوم.
الأولاد من سن الثالثة: أقصى 3 مرات في اليوم.

يُمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.

يجب ابتعاد الدواء مع القليل من الماء.

لا يجوز المصنة. يمكن سحق الفروض إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
إذا تناولت خطأ جرعة دوائية أكبر من اللازم فهناك احتمال لنشوء التأثيرات التالية: صداع، دوران، غثيان، حفاف الفم أو صعوبات في البلع، تشوش الرؤية وجلد جاف وساخن.

إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا قام ولد ببلع الدواء خطأ، فتوجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر معك عبوة الدواء.

إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المحدد، فتناول الجرعة فور تذكرك. لكن، إذا كان موعد الجرعة القادمة قريباً، فتحطِّ الجرعة التي نسيتها.

يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب.

حتى لو طرأ تحسن على حالتك الصحية، فلا يجوز التوقف عن العلاج بالدواء دون استشارة الطبيب. إذا توقفت، فقد تعود التقليبات والآلام.

لا يجوز تناول الأدوية في العتمة! راجع الملصق وتتأكد من الجرعة في كل مرة تتناول فيها دواع. ضع النظارات البصريّة إذا كنت بحاجة إليها.

إذا توفرت لديك أسللة إضافية حول استعمال الدواء، فاستشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية:

مثل أي دواء، قد يؤدي استعمال نوتنتسيل إلى نشوء أعراض جانبية عند بعض المستعملين. لا تتفق عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية. قد لا تتعارى من أي واحد منها.

يجب التوقف عن استعمال الدواء والتوجه فوراً إلى الطبيب أو المستشفى إذا ظهر:

• رد فعل تحسسي. قد تشمل العلامات: طفحاً جلدياً، صعوبة في البلع أو في التنفس، انتفاخ الشفتين، الوجه، الحنجرة أو اللسان.

أعراض جانبية أخرى:

• حفاف في الفم، عصش

• دوران

• تعب، نعاس

• تشوش الرؤية

• طفح جلدي

1. لأي غرض مخصص هذا الدواء؟

الدواء مخصص للمساعدة في علاج متلازمة الأمعاء الهبيجة (القولون العصبي).

الفصيلة العلاجية: المادة الفعالة تتسمى لفصيلة مضادات الكولين.

2. قبل استعمال الدواء:

☒ لا يجوز استعمال الدواء إذا:

- كانت لديك مساسية (ارتجف) للمادة الفعالة (ديسيكلومين) أو لأي من المركيبات الأخرى التي يحتوي عليها الدواء (انظر البند 6).
- علامات رد الفعل التحسسي تتضمن: طفحاً جلدياً، صعوبة في الابتلاء أو التنفس، انتفاخ الشفتين، الوجه، الحنجرة أو اللسان.

تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء

I. قبل العلاج بنوتنتسيل أقراص، أخبر الطبيب إذا كنت:

- تعاني من الزرق (جاوكوما). تشمل العلامات المما في العينين مصحوباً بتشوش الرؤية.
- تعاني من تضخم غدة البروستات.

• تعاني من صعوبات في الهضم أو من حرقة المعدة، الناجمة عن الفتق الحجاجي.

II. الفحوص والمتتابعة:

قد يشوش المستحضر نتائج فحص إفراز الحمض في المعدة.

III. التفاعلات بين الأدوية

- إذا كنت تستعمل الآن، أو قد استعملت مؤخراً أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبيب وإضافات غذائية، فأخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك.
- يجب الفصل بين تناول نوتنتسيل والأدوية الأخرى، لأن نوتنتسيل قد يؤثر على كثافة عمل الأدوية الأخرى، أو بشكل متناوب، قد تؤثر الأدوية الأخرى على كثافة عمل نوتنتسيل.

IV. استعمال الدواء والطعام

يجب تناول الدواء بعد أو قبلوجبة الطعام.

V. الحمل، الرضاعة والخصوبة

- إذا كنت حاملاً، ظنيتك أنك حامل، أو تخططين للحمل، كنت مرضعاً أو تخططين للرضاعة، فعليك استشارة الطبيب قبل البدء بالعلاج.

VI. السياسة واستعمال الماكولات

خلال فترة العلاج قد تشعر بالدورار، التعب، الميل إلى النوم أو تشوش الرؤية. في هذه الحالات، لا يجوز السباحة أو تشغيل الماكولات القليلة.

بالنسبة للأولاد يجب تحذيرهم من ركوب الدراجة الهوائية أو اللعب بالقرب من الشارع وما شابه ذلك.

VII. معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء

يحتوي الدواء على اللاكتون. إذا أخذت الطبيب بأن لديك عدم تحمل لسكريات معينة، فاستشر الطبيب قبل استعمال الدواء.

يحتوي كل قرص على 1.05 ملجم من السوربيتون.

نشرة طبية للمستهلك بمحظوظ أنظمة الصيادة (مستحضرات) 1986

يُسوق هذا الدواء بحسب وصفة طبيب فقط

نوتنتسيل أقراص 10 ملг

يحتوي كل قرص على 10 ملجم من ديسيكلومين هيدروكلوريド

Dicyclomine Hydrochloride 10 mg

المواضي غير المعقولة ومستحبات الأرجحة في المستحضر - انظر البند 6.

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء" والبند 6
اقرأ النشرة بامانع حتى نهايتها قبل استعمال الدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات ملخصة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسللة إضافية، فراجع الطبيب أو الصيدلي.

لقد وصف هذا الدواء من أجلك. لا تطعمه للأخرين. قد يضر بهم الدواء حتى لو بدا لك أن مرضهم مشابه.

الدواء غير مخصص للأولاد الذين عمرهم أقل من عامين.



- فقدان الشهية (أنور يكسيما)
- غثيان، تقيؤات
- إمساك
- صداع
- ألم أو صعوبة في التبول

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية أو إذا عانيت من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، فعليك استشارة الطبيب. بالإضافة إلى التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "التبليغ عن أعراض جانبية عقب العلاج الدوائي" الموجود في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) والذي يوجه إلى الاستمارة المترتبة للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق الدخول إلى الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il/>

5. كيف يجب تخزين الدواء؟

- امنع التسمم! هذا الدواء، وأي دواء آخر، يجب حفظه في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي الأولاد و/أو الأطفال الرضع و المجال روئيهم، وبذلك ستمنع التسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp.) المدون على العبوة. يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- يجب التخزين في درجة حرارة أقل من 25 درجة مئوية.

6. معلومات إضافية:

بالإضافة إلى المواد الفعالة، يحتوي الدواء أيضاً على:

Lactose, Maize Starch, Povidone, Magnesium Stearate, Sorbitol Solution 70%.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة:
الأقراص بيضاء، محببة من كلا الجانبين.

تُزَوَّد الأقراص في عبوة كرتونية تحتوي على 20 قرصاً في عبوة شرائط حوبصلات.

اسم المصنع/صاحب الامتياز وعنوانه: ك. ص ط للصناعات الكيميائية م.ض.، شارع هكيدما 3، كريات ملاخي 83057.

تم تحرير هذه النشرة في 05/2021 وفقاً لإرشادات وزارة الصحة.
رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة: 1178523254

من أجل التبسيط ولتسهيل القراءة، تم تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكورة. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.