

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תק Shirim)

התש"מ-ו - 1986

התרופה משווקת על פי מרשם רפואי בלבד

נתנסיל טבליות 10 מ"ג

כל TABLET מכילה 10 mg דיציקלומין הידרוכלוריד
Dicyclomine Hydrochloride 10 mg

"מידע חשוב על חלק המרכיבים של תכשיש וסעיף 6.6 – ראה סעיף

קרא עיון את העלון עד סוף בטרם משתמש בתרופה.

עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות תחולת התפקיד.

תגובה או גשומה עוברך, אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם פולוי, אם נאה לך כי מחלתם דומה.

התרופה אינה מיועדת לילדים מתחת לגיל שנתיים.

1. מה מיועדת התרופה?

התרופה מיועדת לטיפול עדר בתסמונת המעי הרגי. קבוצה תרופיטית: החומר הפעיל שייר לקבוצת האנטיכולינרגים.

2. לפני השימוש בתרופה:

א אין לשימוש בתרופה אם:

- אטה רגש (אלרג) לחומר הפעיל (דיציקלומין) או לכחד מהרכיבים הנוסכים אשר מכילה התרופה (ראם סעיף 6). הסימנים של תגובה אלרגית כוללים: פריחה, קשי בבליעת אבשנה, נפיחות של השפתיים, הפנוי, הרון או הלשון.

לאחרות מיזוגות נוגעות לשימוש בתרופה:

• לפני הטיפול בנטסיל טבליות, ספר לרופא אם הגר.

• סובל מברקתי (גלאוקומיה). היסונים כוללים כאב בעינים המלווה בשטוח ראייה.

• סובל מעורמות מוגדלת.

• סובל מתקשי עיכול או מצרבת הנגרמים מבקע סרעפרי. ההטsher על הגומם בנטסיל טבליות, ספר לרופא אם חומיות בקיבה.

• אינטראקציות/תגובהות בין תרופות:

אם אתה לוחץ, או אם לוחצת לאחורה, תרופות אחרות יכול תרופות אלה לארם ומוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.

יש להפריד נטילת נתנסיל מתרופות אחרות, כיוון שנטסיל עלול להשפיע על האופן או לחופין, תרופות אחרות עלולות להשפיע על האופן בו מטופל עבד.

3 שימוש בתרופה ומזהן
יש ליטול את התרופה אחריו או לפני הארוחה.

4. תופעות לוואי:
אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה,

כמו בכל תרופה, השימוש בנטסיל עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמטופשים. אל תיבלהן לפחות רשיימת תופעות הללו. יתכן שלא תסבול מ一封 אחת מהן.

של הפסיק את השימוש בתרופה ולפנות מיד לרופא ואל תטשטש אליה. בסקרים אלו, אין להגог או להפיג מכונות בבדות. באשר לילדים, יש להזכיר מרכיבה על אופנים או מושגים בקדמתם.

5. מידע חשוב על חלק המרכיבים של התרופה
התרופה מכילה קלוטן. אם נאמר לך על ידי הרופא שיש לך סבלות מסווגים, הייעוץ ברופא לפני Nutzung המרופה.

כל TABLET מכילה 10 mg דיציקלומין הידרוכלוריד
Dicyclomine Hydrochloride 10 mg

"מידע חשוב על חלק המרכיבים של תכשיש וסעיף 6.6 – ראה סעיף

קרא עיון את העלון עד סוף בטרם משתמש בתרופה.

עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות תחולת התפקיד.

תגובה או גשומה עוברך, אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם פולוי, אם נאה לך כי מחלתם דומה.

התרופה אינה מיועדת לילדים מתחת לגיל שנתיים.

6. כיצד תשתמש בתרופה?
יש לשמש בתכשיש תמיד בהתחשב להוראות הרופא.

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אין בטוח לגבי תופעות לוואי או אופון הטיפול בקדמתם.

למיון ואופון הטיפול ייקבע על ידי הרופא בלבד. המינון המקובל בדרך כלל הוא:

למבוגרים ולילדים מעל גיל 12: 1-2 טבליות, 3 פעמים ביום.

כל TABLET מכילה 1.05 mg דיסורביטול.

7. איך לאחxon את התרופה?
אם הופיעה תופעת לוואי, אם אתה מתופען להוואי,

מחמירה או כאשר אתה סובל ממהותת להוואי בעולון, עליך להתייעץ עם הרופא.

ניתן לדוח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לוחצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי" ע�ב טיפול תרופה" שנמצא בדף הבית של ארכט משרד הבריאות (www.health.gov.il).

תופעות לוואי, או ע"י כינסה לkipshah:
<https://sideeffects.health.gov.il/>

5. איך לאחxon את התרופה?

מנע הרעליה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמרם במקומות סגור מחוץ להישג ידים וסוווח ראייתם של ילדים /או תינוקות ועל ידי קר תמנע הרעליה. אל תגרום להקה לאלה הוראה מפורשת מהרופא.

- אין לשימוש בתרופה אחריו תאריך התגובה (exp.) המופיע על גבי האריזה. תאריך התגובה מתייחס לו ליום האחרון של טמפרטורתה הנמוכה מ-25°C.
- יש לאחxon בטמפרטורה הנמוכה מ-25°C.

6. מידע נוסף:
נוסח על החומר הפעילים התרופה מכילה גם: Lactose, Maize Starch, Povidone, Magnesium Stearate, Sorbitol Solution 70%.

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:
הטבליות לבנות, קימות מושג האגדים.

הטבליות מושקות בארכט קרוטון המכילה 20 טבליות בארכט בliestטר. שם היצרך/בעל הרישום וכתובתו: נס טעשיות כימיות בע"מ, רחוב הקידימה 3, קרתת מלאי 83057. עלון זה נערך בתאריך 05/2021 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

מספר רשות התרופה בפנקס התרופות הממלכתי:
במשרד הבריאות: 1178523254
לשם הפשטות ולהקלת הקיראה, עלון זה נכתב בלשון זכר.
על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שניהם.

כמו בכל תרופה, השימוש בנטסיל עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמטופשים. אל תיבלהן לפחות רשיימת תופעות הללו. יתכן שלא תסבול מ一封 אחת מהן.

של הפסיק את השימוש בתרופה ולפנות מיד לרופא ואל תטשטש אליה. בסקרים אלו, אין להגог או להפיג מכונות בבדות. באשר לילדים, יש להזכיר מרכיבה על אופנים או מושגים בקדמתם.

7. תופעות לוואי:
• יובש בפה, צמא

• סחרחותם
• עיפות, גומם
• טשוטש ראייה

• פריחה
• איבוד תיאבון (אנורקסיה)
• בחילות, הקאות
• עצירות
• כאב ראש

• כאב או כאב בהטלה שתנתן

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אתה מתופען להוואי, מחמירה או כאשר אתה סובל ממהותת להוואי בעולון, עליך להתייעץ עם הרופא.

ניתן לדוח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לוחצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי" ע�ב טיפול תרופה" שנמצא בדף הבית של ארכט משרד הבריאות (www.health.gov.il).

תופעות לוואי, או ע"י כינסה לkipshah:
<https://sideeffects.health.gov.il/>

5. איך לאחxon את התרופה?

מנע הרעליה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמרם במקומות סגור מחוץ להישג ידים וסוווח ראייתם של ילדים /או תינוקות ועל ידי קר תמנע הרעליה. אל תגרום להקה לאלה הוראה מפורשת מהרופא.

