

3. كيف تستعملين الدواء؟

يجب استعمال المستحضر دائمًا حسب تعليمات الطبيب. يجب عليك الفحص مع الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكون متأكداً فيما يتعلق بالجرعة وطريقة العلاج بالمستحضر. الجرعة وطريقة العلاج سيحددهما الطبيب، فقط. الجرعة المتبعة عادة، هي قرص واحد في اليوم لمدة 21 يوماً. يجب تناول القرص كاملاً مع الماء يومياً في ساعة محددة. الساعة التي يتم فيها تناول القرص ليست مهمة، لكن يجب الالتزام بالساعة التي تم اختيارها بدأية، مثلًا بعد وجبة الفطور أو بعد وجبة العشاء. يمنع سحق/شطر/مضغ القرص خوفاً من عدم التوصل إلى جرعة دقيقة. تحتوى العبوة على ورقة واحدة مع 7 شرائط لصقات أيام الأسبوع. لتحضير العبوة لاستعمال، يجب عليك إزالة شريط اللاصقة الأسبوعية التي تبدأ في اليوم الذي ستبدين فيه تناول الأقراص، وألصق هذا الشريط على عبوة الأقراص في الموضع "شريط أيام الأسبوع." بحيث أن القرص الذي يتم تناوله في اليوم الأول هو القرص المشار إليه بـ "1". مثلًا: إذا كان اليوم الأول الذي تناولت به القرص هو يوم الأربعاء، يتم لصق شريط "أيام الأسبوع" الذي يبدأ بـ "يوم الأسبوع" على العبوة. لذلك، يتم الإشارة إلى بقية الأقراص بباقي أيام الأسبوع المناسب، مما يتيح لك بنظرية الفحص فيما إذا تم تناول القرص في يوم معين.

- متى بإمكانك بدء الاستعمال لأول مرة؟
- إذا كانت لديك دورة شهرية منتظمة، ابدي تناول الدواء في اليوم الخامس من النزيف.

• إذا لم تكن لديك دورة شهرية منتظمة، بإمكانك البدء بتناول الدواء في كل لحظة تختارينها.

• إذا كنت تتناولين علاجاً هرمونياً بديلاً آخر الذي يسبب ظهور الدورة الشهرية لديك، أكملي العلاج كما هو مطلوب، وفي اليوم التالي ابدي بتناول بروجليوتون.

• إذا كنت تتناولين علاجاً هرمونياً بديلاً آخر الذي لا يسبب ظهور الدورة الشهرية لديك، بإمكانك البدء بتناول بروجليوتون في اللحظة التي تختارينها.

يمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.

مدة العلاج

سيحدد الطبيب - وفقاً لاحتياجاتك - كم من الوقت عليك تناول بروجليوتون.

إذا تناولت عن طريق الخطأ جرعة أعلى

لم يتم الحصول على تقارير عن جرعة مفرطة. مع ذلك، يتحمل ظهور صداع، غثيان، تقيؤات، إحساس بالضغط في الثديين ونزيف في الرحم. لا حاجة لعلاج خاص، لكن يجب عليك التوجه إلى طبيب.

إذا قام طفل بتناول كمية من الدواء عن طريق الخطأ، يجب التوجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى، وإحضار علبة الدواء معك.

إذا نسيت تناول القرص:

• إذا كان التأخير بتناول القرص يقل عن 12 ساعة، تناولي القرص بأسرع وقت ممكن واستمرri بتناول بقية الأقراص كالمعتاد باتجاه السهم، وفي الساعة المحددة لذلك.

• إذا كان التأخير بتناول القرص يزيد عن 12 ساعة، أتركي القرص المنسي في الخليط واستمرri في تناول بقية الأقراص كالمعتاد باتجاه السهم، وفي الساعة المحددة لذلك.

• من المحتمل ظهور نزف في حال نسيت تناول القرص. هذه حالة طبيعية. يجب الاستمرار في العلاج حسب توصية الطبيب.

حتى إذا طرأ تحسن على حالتك الصحية، يمنع التوقف عن العلاج بالدواء بدون استشارة الطبيب.

يمنع تناول الأدوية في الظلام! تتحققى من الملصق على عبوة الدواء ومن الجرعة الدوائية في كل مرة تتناولين فيها دواء. ضعي النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.

5. كيف يخزن الدواء؟

تجنب أي التسمم! يجب حفظ هذا الدواء، وكل دواء آخر، في مكان مغلق، بعيداً عن متناول أيدي الأطفال وروبة الأطفال وأو الأطفال، وكذلك تجنب التسمم. تسبّب أي التقوّي بدون تعليمات صريحة من الطبيب. يمنع تناول الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) الظاهر على العبوة/الشريط. تاريخ انتهاء الصلاحية ينبع إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

شروط التخزين

يمنع تخزين درجة حرارة تزيد عن 25°C.

6. معلومات إضافية

بالإضافة إلى المركبات الفعالة، يحتوي الدواء، أيضًا:

أقراص بيضاء

lactose monohydrate, maize starch, polyvidone 25000, talc, magnesium stearate.

طلاء القرص:

sucrose, calcium carbonate, talc, macrogol 6000, polyvidone 700 000, montaglycol wax (wax E).

أقراص بنية

lactose monohydrate, maize starch, polyvidone 25, talc, magnesium stearate.

طلاء القرص:

sucrose, calcium carbonate, talc, macrogol 6000, titanium dioxide E171, polyvidone 700 000, glycerol 85%, ferric oxide pigment red E172, ferric oxide pigment yellow E172, montaglycol wax (wax E).

كيف يبدو الدواء وماذا تحوي العبوة:

يوجد في علبة بروجليوتون 10 أقراص بلون بني فاتح و- 11 قرصاً بلون أبيض. في كل عبوة يوجد 21 قرصاً ممزوجة في شريط.

صاحب التسجيل وعنوانه: باير إسرائيل م.ض. شارع هرريش 36، هود هشارون 4527702.

اسم المنتج وعنوانه: باير وايمر GmbH وكو KG، وايمر، ألمانيا.

تم تحريرها في حزيران 2020.

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة:

032 90 22502 00

- نمو أورام عضلية (أورام حميدة في الرحم)،
أو الصيدلي.

- ازدياد اختلالات الصرعر،
- ارتفاع حاد في ضغط الدم.

أعراض جانبية إضافية

شائعة جداً

احساس ضغط في الثديين، ألم في الثديين، حالات نزف غير منتظمة (نزف طمتي متزايد، نزيف بين الدورات الشهرية، إفراز دموي وغيرها).

شائعة

ازداد الوزن، تغيرات في المزاج، اكتئاب، صداع، غازات في البطن، ألم في المعدة، حالات غثيان، حموضة فانصة في المعدة، طفح جاهي، حكة، ألم ظهر، ألم في البطن السفلية، إفراز مهيلي متزايد، نمو أورام عضلية في الرحم (ورم حميد في الرحم)، تضخم الثديين، وذمة (احتباس الماء)، ضعف أو وهن.

غير شائعة

سرطان ثدي، ردود فعل حساسية مفرطة، تغيير في الرغبة الجنسية، عصبية، اضطرابات نوم، دوار، شقيقة (صداع نصفي)، اضطرابات في المعدة، خفقان في قلب، ارتفاع في ضغط الدم، تختثر شريانين أو وريدي (ختارات دموية)، تقيؤات، قيم شاذة في أداء عمل الكبد، حب الشباب، فرط الشعر (كثرة الشعر)، تساقط الشعر، شرى، تشنجات عضلية.

إذا كانت لديك أسللة إضافية بالنسبة إلى استعمال الدواء فاستشيري الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

جميع الأدوية، قد يسبب استعمال بروجليوتون أعراضًا جانبية لدى قسم من المستخدمين. لا تصدمى عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية من المحتوى الآتى من أي منها.

أعراض جانبية خطيرة

يجب التوقف عن الاستعمال فوراً في الحالات التالية:

- ظهور حالات صداع شبيهة بالشقيقة (الصداع النصفي) للمرة الأولى أو ظهور متكرر أكثر لحالات صداع شديدة بصورة شاذة،

- اضطراب ادراكي فجائي (مثل اضطرابات في الرؤية، اضطرابات في السمع)، علامات أولى لالتهاب وريدي المصروف بتختثر أو باضطرابات الناجمة عن تجلط دموي (انصمام) (مثل ألم شاذ في الساق أو انتفاخ في الساق، ألم حادة أثناء التنفس أو سعال بدون سبب ظاهر للعين، إغماء)،

- ألم وإنحساب بالضغط في منطقة الصدر،

- يرقان،

- التهاب في الكبد،

- حكة في كل أنحاء الجسم،

ابدئي بتناول القرص المشار إليه في اليوم المناسب في الأسبوع. الأسهم سترشدك بالنسبة لاتجاه القسم. يجب تناول القرص واحد أليس في اليوم، خلال الأيام الـ 11 الأولى من ثم قرص واحد بدني في اليوم، خلال الأيام الـ 10 التالية. بعد 21 يوماً من تناول الأقراص، قومي بالاستراحة لمدة 7 أيام. خلال أيام الاستراحة الـ 7، من المحتل أن يظهر نزيف شبيه بنزيف الدورة الشهرية، هذه حالة طبيعية. ابدي بتناول أقراص من العلبة التالية في اليوم الثامن، حتى إذا استمر النزيف أيضاً. بهذه الحالة ستبدين في كل شهر علىة جديدة في نفس اليوم من الأسبوع.

متى بإمكانك بدء الاستعمال لأول مرة؟

- إذا كانت لديك دورة شهرية منتظمة، ابدي تناول الدواء في اليوم الخامس من النزيف.

• إذا لم تكن لديك دورة شهرية منتظمة، بإمكانك البدء بتناول الدواء في كل لحظة تختارينها.

• إذا كنت تتناولين علاجاً هرمونياً بديلاً آخر الذي يسبب ظهور الدورة الشهرية لديك، أكملي العلاج كما هو مطلوب، وفي اليوم التالي ابدي بتناول بروجليوتون.

• إذا كنت تتناولين علاجاً هرمونياً بديلاً آخر الذي لا يسبب ظهور الدورة الشهرية لديك، بإمكانك البدء بتناول بروجليوتون في اللحظة التي تختارينها.

يمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.

نادرة

قلق، طمث مصحوب بألم، متلازمة سابقة - للطمث.

نادرة جداً

برقان.

أعراض أخرى غير مرغوبة تم التبليغ عنها من قبل نساء تستعملن العلاج الهرموني البديل، لكن لم يتم تأكيد أو دحض العلاقة ببروجليوتون.

سرطان بطانة الرحم، انخفاض في الوزن، حصى مراراة (أمراض أخرى في كيس المراراة)، بقع بنية على الوجه (كلف)، تغيرات التهابية في الجلد مع تكاثل حمراء (حماري عدنة)، أوردة مفرقة تحت الجلد (فرفرية وعانية)، تضخم بطانة الرحم عديدة الأشكال، أوردة مفرقة تحت الجلد (فرفرية وعانية)، ازداد الوزن، تغيرات في المزاج، اكتئاب، صداع، غازات في البطن، ألم في المعدة، حالات غثيان، حموضة فانصة في المعدة، طفح جاهي، حكة، ألم ظهر، ألم في البطن السفلية، إفراز مهيلي متزايد، نمو أورام عضلية في الرحم (ورم حميد في الرحم)، تضخم الثديين، وذمة (احتباس الماء)، ضعف أو وهن.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية أو إذا عانيت من أعراض جانبية غير مذكورة في النشرة، عليك استشارة الطبيب.

أعراض جانبية غير شائعة

سرطان ثدي، ردود فعل حساسية مفرطة، تغيير في الرغبة الجنسية، عصبية، اضطرابات نوم، دوار، شقيقة (صداع نصفي)، اضطرابات في المعدة، خفقان في قلب، ارتفاع في ضغط الدم، تختثر شريانين أو وريدي (ختارات دموية)، تقيؤات، قيم شاذة في أداء عمل الكبد، حب الشباب، فرط الشعر (كثرة الشعر)، تساقط الشعر، شرى، تشنجات عضلية.

<https://sideeffects.health.gov.il>