

أسيفال 2 ملغ

أقراص

التركيب:

يحتوي كل قرص على:

2 مغ Diazepam

أسيفال 5 ملغ

أقراص

التركيب:

يحتوي كل قرص على:

5 مغ Diazepam

أسيفال 10 ملغ

أقراص

التركيب:

يحتوي كل قرص على:

10 مغ Diazepam

معلومات حول المركبات غير الفعالة ومشتقات الحساسية، انظر البند 2 "معلومات مهمة عن قسم مركبات الدواء"، والبند 6 - "معلومات إضافية".
 فرار النشرة بتمعن حتى نهائيتها و**لا تقل أبداً باستعمال الدواء**. تحتوي هذه النشرة على معلومات موزعة عن الدواء. إذا كانت لديك أسئلة إضافية، توجه إلى الطبيب أو الصيدلي.
 وُصف هذا الدواء لعلاجك. لا تعطيه للآخرين؛ لأنه قد يضرهم، حتى لو بدا لك تشابه بين حالتك الصحية وحالتهم.

مقدمة

يُنتمي هذا الدواء إلى مجموعة البنزوديازيبينات، التي لديها خصائص مميزة تتطلب توخي الحذر كثيراً عند استعمالها.

هناك أهمية كبيرة للمتابعة الطبية المكثفة عند تناول هذا الدواء. عندما تتناول هذا الدواء، احرص على التوجه إلى الطبيب بعد 2 - 4 أسابيع، لأن العلاج معذ لفترات زمنية قصيرة فقط.

قد يسبب استعمال هذا الدواء بشكل متواصل إلى تقليل تأثير الدواء. وقد يؤدي هذا الاستعمال إلى عراض خطير من الاعتماد، ما يصبغ على المريض أعراض تناول الدواء. يكون إيقاف العلاج بشكل غير مراف مصحوباً بأعراض انسحابية مثل: توتر، عصبية، ارتباك، رجفة، آرق، ألم في البطن، غثيان، تقوآت، متعرق، تشنجات.
 أحياناً، قد يؤدي استعمال هذا الدواء بشكل متواصل إلى تغيرات في التصرفات السلوكية وإلى أفكار مزعجة.

لدى المسنين بشكل خاص يوصى بتناول جرعة أقل من الجرعة المعتادة، لأن الدواء يحوّل ضرراً بالبطءة وأحياناً قد تتساق حركات الجسم، لذلك هناك خوف من التعثر والسقوط.

قد يؤدي تناول هذا الدواء مع أدوية من مجموعة الأفيونيات، أدوية الأجهز تثبط جهاز الأعصاب المركزي (بما في ذلك المخدرات) أو مع محلول الأفيونيات، البنزوديازيبينات، مضادات التشنج (نقص الشهوية)، غيبوبة، وإلى الوفاة.

1. لم تعد هذا الدواء؟

أسيفال 2 ملغ علاج حاد التوتر، القلق، عدم الهدوء العصبية التي تحدث نتيجة انسحاب الكحول، وكعلاج إضافي للتخفيف عن تقلص عضلات الهيكل العظمي، تشنجات.

المجموعة العلاجية: بنزوديازيبينات.
هذا الدواء غير مخصص عند الأطفال.

يجب أن يكون استعمال الدواء لفترة قصيرة قدر الإمكان ولا يتعدى أربعة أسابيع. إذا تم استعمال لفترة طويلة من دون توقف، هناك خطر لتطور اعتماد على الدواء أو تطوير مشاكل أثناء إيقاف العلاج. أثناء تناول هذا الدواء، هناك خطر لتطور اعتماد (الحاجة إلى تناول الدواء). يزداد الخطر سوية مع زيادة الجرعة ومدة العلاج. يكون الخطر أعلى إذا كان لديك ماضٍ من سوء استعمال الكحول أو المخدرات.

2. قَبْلِ استعمال الدواء

لا يجوز استعمال الدواء إذا:

- كنت حساساً (لديك حساسية) للمادة الفعالة أو لدواء آخر من مجموعة البنزوديازيبينات أو لأحد المركبات الأخرى التي يحتوي عليها الدواء (انظر البند 6 - "معلومات إضافية").
- كانت لديك مشاكل تنفسية قد تكون خطيرة، تتضمن تنفساً بطيئاً وأو سطحيًا.
- كنت تعاني من الاكتئاب (مع أو من دون قلق) أو من فرط النشاط.
- كنت تعاني من الرهاب (خوف من عنصر أو حالة محددة) أو من مرض نفسي آخر.
- كنت تعاني من مرض ضعف العضلات (myasthenia gravis) (حالة تسبب ضعف وتعب العضلات بسهولة).
- كنت تعاني من انفصاع النفس التومي (اضطراب في النوم مصحوب بتوقف التنفس بشكل غير سليم خلال النوم).
- كنت تعاني من اضطرابات خطيرة في الكبد.
- كنت تعاني من البرفيرية (حالة وراثية تسبب بثرات جلدية، آلام في البطن، وخلل في الدماغ أو جهاز الإخراج).
- كنت تحسطين للحمل، أو إذا كنت حاملاً (انظري أدناه البند "الحمل والإرضاع").

تحذيرات خاصة متعلقة باستعمال الدواء

قبل العلاج بأسيفال أخبر الطبيب إذا:

- كان لديك ماضٍ من الإفراط في استعمال الكحول أو سوء استعمال المخدرات • كانت لديك مشاكل في القلب والرئتين أو فشل كلوي خطير • كان لديك قريب عليله قد توفي مؤخرًا • كنت تعاني من مستويات منخفضة من بروتين في الدم عند القيام بالعمليات الجراحية • كنت تعاني من خلل في التزيد الدم في الدماغ (تلكس الشرايين) • كنت مسنناً قد تسبب آثار على أسيفال ارتباكاً وقد تؤثر في العقل، والعضلات، وكم ذلك يسبب السقوط والكمات • كانت لديك مشاكل في التنفس أو كنت مسنناً • كنت تعاني من الاكتئاب • كانت لديك أفكار انتحارية • كنت تعاني من داء الصرع أو إذا كان لديك ماضٍ من التشنجات.

اعتبارات أخرى

- أعراض جانبية نفسية - أخبر الطبيب إذا اخترت أعراضاً جانبية مثل القلق، فرط النشاط، عدم الهدوء، عدوانية، كوابين أو هوسية. قد تظهر هذه الأعراض الجانبية أكثر لدى الأطفال أو المسنين.

فقدان الذاكرة (فقدان الذاكرة الكامل أو الجزئي) - قد تعاني من فقدان الذاكرة خلال العلاج بالادوية. يمكن أن يحدث فقدان الذاكرة أكثر عند تناول جرعات عالية من أسيفال.

الاعتماد - عند تناول الدواء هناك خطر حدوث اعتماد، الذي يزداد مع زيادة الجرعة ومدة العلاج، وكذلك عند تناول الدواء عن غير قصد لفترات طويلة. قد يحدث اعتماد على أسيفال 10 ملغ أو 5 ملغ أو 2 ملغ. قد يحدث اعتماد على أسيفال 10 ملغ أو 5 ملغ أو 2 ملغ.

التحمل - إذا لاحظت بعد مرور عدة أسابيع أن الدواء لا يؤثر في ذات القدر مثلما كان تأثيره في بداية العلاج، عليك استشارة الطبيب.

الانسحاب - يجب إيقاف العلاج بأسيفال بشكل تدريجي. تظهر أعراض الانسحاب المتعلقة بأسيفال حتى عند إعطاء جرعة سلبية لفترات زمنية قصيرة. انظر الفصل 3 تحت عنوان - "التوقف عن استعمال أسيفال والأعراض الانسحابية".

التفاعلات بين الأدوية:
 إذا كنت تتناول، أو تناولت مؤخراً، أدوية أخرى، بما فيها أدوية دون وصفة طبية ومكملات غذائية، تخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك. لا سيما إذا كنت تتناول:

- **أوكسبيبات الصوديوم** (يستعمل لمنع حالات نوبات العناس المفاجئ (narcolepsy) المصحوبة بضعف العضلات).
- **أدوية مضادة للاكتئاب** (مثل: فلوروفكسامين، فلو أوكسيتين).
- **أدوية مضادة للذهان** مثل كلوزابين (علاج مشاكل نفسية).
- **أدوية مضادة للهستامين** (علاج الحساسية).
- **أدوية للتخدير العام.**
- **أدوية مهدئة** (تعطى للتأثير المهدئ).
- **أدوية منومة** (تساعد على النوم).
- **إريثروميسين** (مضاد حيوي).

أدوية لإرخاء العضلات (مثلًا: سوكسيميتونيوم، توبوكورارين).

يمكن أن يزيد بعض مضادات الالام القوية مثل مورفين (أفيونيات) الشعور العام الجيد عند تناولها بالجمع مع أسيفال، ما قد يزيد الحاجة إلى متابعته استعمال هذه الأدوية (اعتماد) أو يشعرك بالنعاس جدا. رابربيرتات مثل فينوباريتال (علاج داء الصرع والاضطراب النفساني).

أدوية تخفض ضغط الدم، مدرات البول، مدرات الأيونات (مشاكل القلب) لأنها قد تخفض ضغط الدم أكثر من الضروري.

مضادات الحموضة (تخفف الحموضة في المعدة) قد تبطئ امتصاص أسيفال في الجسم. قد يؤثر تناول هذه الأدوية بالجمع مع أسيفال في حالتها النفسية، قد يشعرك بالنعاس بدرجة كبيرة، يكتف أنتجها ويخفف ضغط الدم.

سيفالوبرام (علاج الإمان على الكحول). يمكن أن يسبب لك تناول هذا الدواء سوية مع أسيفال الشعور بالنعاس بدرجة كبيرة وأن يجعل الجسم يتخلص من أسيفال ببطء أكثر من المعتاد.

أدوية لداء الصرع مثل فينوباريتال، فنتوينين وكاربامازين، صوديوم وفالبروات قد يؤثر أسيفال في مستويات هذه الأدوية في الدم. علاوة على ذلك، قد يؤثر أسيفال في طريقة عمل فنتوينين.

فيوفيلين (علاج الربو واضطرابات التنفس الأخرى). وهو قد يُصَفِّف تأثير أسيفال لأنه قد يجعل الجسم يتخلص من أسيفال أسرع من المعتاد.

سيميثيدين، **أوميبرازول** أو **أيزوميبرازول** (أدوية الأجهز تثبط جهاز الأعصاب المركزي). لأنه قد يجعل الجسم يتخلص من أسيفال أسرع من المعتاد.

ريهاميسين لعلاج العدوى (مضاد حيوي)، لأنه قد يجعل الجسم يتخلص من أسيفال أسرع من المعتاد. وقد يصفف تأثير أسيفال.

أميريتامبين (St John's wort) - نبتة شبيهة).

أميريتامبين، **أنتايفانير**، **ريوتانيفر**، **ديلافيرين**، **إيفارفين**، **إنديفيرين**، **نيليفانيفر**، **زيدوفيرين**، **ساكوبوتريف** (مضاد الفيروسات)، **فلوكيتازون**، **إيتراكونازول**، **كينوكيتازول** أو **فوريفونازول** (أدوية مضادة للفطريات)، لأن هذه الأدوية قد تجعل الجسم يتخلص من أسيفال ببطء أكثر من المعتاد. وهكذا يزيد احتمال حدوث أعراض جانبية. قد تجعلك هذه الأدوية تشعر بالنعاس لو توفت أطول أو قد تؤدي إلى صعوبات في التنفس.

أيزونيازيد (المستعمل لعلاج السل)، لأنه قد يجعل الجسم يتخلص من أسيفال ببطء أكثر من المعتاد.

أقراص منع الحمل، لأنها قد تجعل الجسم يتخلص من أسيفال ببطء أكثر، وهكذا يزداد تأثيره. قد يحدث تزييف بين طرفين خلال استعمال أسيفال وأقراص منع الحمل سوية، ولكن هذه الحالة لا تحدث خارجة عن قصد من الحمل.

سيسابردي (المستعمل لعلاج مشاكل في المعدة)، لأنه قد يجعل الجسم يتخلص من أسيفال ببطء أكثر من المعتاد.

كورتيكوستيرويدات (أدوية مستعملة لعلاج التهاب)، لأنها قد تضعف تأثير أسيفال.

ليدوفوبيا (المستعمل لعلاج الرئتين)، قد يخفف أسيفال تأثير ليدوفوبيا.

مضاد الفلوروكربون (المستعمل لعلاج داء الصرع والاضطرابات النفسية)، لأنه قد يجعل الجسم يتخلص من أسيفال ببطء أكثر، وهكذا يزداد تأثيره.

كيماتين (دواء منوم) لأن أسيفال يرفع تأثيره.

لوفكسينين (يساعد على تخفيف الأعراض عندما تتوقف عن تناول الأفيونيات).

تايلولون (علاج الغثيان والتقيؤ).

محصرات ألفا، **محصرات بيتا** أو **موسكولينين** (تخفيف ضغط الدم).

استعمال أسيفال والأفيونيات في نفس الوقت (مستحبات الألام الشديدة، أدوية تساعد على التوقف عن تعاطي المخدرات وجزء من الأدوية للسعال). يرفع ضغط حدوث الشعور بالنعاس العميق، صعوبات في التنفس (نقص الشهوية)، غيبوبة، وقد يشكل خطراً على الحياة.

إنها يجب التذكير في استعمال هذه الأدوية بالترتيب فقط عندما لا تتوفر إمكانيات العلاج الأخرى. يرفع خطر عدم التخلص من أسيفال ببطء أكثر، ويضعف تأثيره على الأطفال.

ارتبج بزيادة الجرعة عند العلاج الضرورية. أخبر الطبيب بكل الأدوية من مجموعة الأفيونيات التي تتناولها واتبع بدقة نمط الجرعة التي وصفها الطبيب. يكون من المفيد أن تخبر الأصدقاء أو الأقرباء بالعلامات والأعراض المذكورة أعلاه. توجه إلى الطبيب عندما تختبر مثل هذه الأعراض.

استعمال الدواء واستهلاك الكحول
 لا يجوز استهلاك الكحول أثناء العلاج بأسيفال. قد يزيد الكحول التأثير المهدئ لأسيفال ويشعرك بالنعاس بدرجة كبيرة.

استعمال الدواء أثناء الحمل
 قد يرفع عصير الجريب فروت كمية أسيفال في الدم. إذا كنت مسنناً، تعاني من تليف

كلمة

