

התרופה משוקקת על פי מרשם רופא ובלבד

מונוקורד® 20, 40, טבליות

מונוקורד® SR 50, טבליות שחרור מושהה

מונוקורד 20: כל טבליה מכילה איזוסורביד מונוניטראט (Isosorbide mononitrate) 20 מ"ג.
מונוקורד 40: כל טבליה מכילה איזוסורביד מונוניטראט (Isosorbide mononitrate) 40 מ"ג.
מונוקורד SR 50: כל טבליה ששחרור מושהה מכילה איזוסורביד מונוניטראט (Isosorbide mononitrate) 50 מ"ג.

חומרים בלתי נרשמים (ואלרגנים בתרופה – ראה סעיף 6 "מידע נוסף" ובסעיף 2 "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה".

קרא בעיון את העלון עד סופו תשומת שכתמה בתרופה. עלון זה מכיל מידע טכני על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

תרופה זו נרשמה עבורך. אל תעביר אותה לאחרים. חלה עליון להדיק להם אפילו אם נראה לך כי מעבב הרופא דומה.

1. להם מיעדת התרופה?

ליטול בתעוקת חזה (אנגינה פקטוריס) ולמניעת התחפר תעוקת חזה.

מונוקורד 20, 40: משמשים גם ליטול באי ספיקת לב.

קבוצה תרופטית: ניטראטים אורגניים. ניטראטים אורגניים פועלים על ידי הרחבת כלי הדם בלב בכדי להעלות את ספיקת הדם ללב. תעוקת חזה מתבטאת בכדי כלי תהובשה של כאב לוחץ בחזה, בוצור או באזור הדרור. הכאב מגיע למחשבה חלה ומהווה סימן לכך שחלק ממנו אינו מקבל מספיק חמצן הדרוש לתפקודו.

2. לפני השתמש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה גרש (אלרגי) לחומר הפעיל (איזוסורביד מונוניטראט); ניטראטים אחרים או כל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה סעיף 6)
- אתה סובל מאנמיה חמורה (ירידה בחיידק הדם האדומים אשר עלולה לגרום לעור חיוור, לחולשה או קילוצר בשמיה)
- היה לך התקף לב (אטום שריר הרלב)
- היה לך דימום במוח
- היה לך קפיצת רמות סוכר (סרואמה)
- יש לך נפח דם נמוך באופן חריג (hypovolemia)
- יש לך לחץ דם נמוך מאוד
- אתה סובל מהרמה, מאחר שהדם הפסיק לזרום
- כאית בנפר (כשל ברימת הדם)
- אתה נוטל סילדנפיל, טדלפיל או דרנפיל (תרופות לטיפול בספיידואטור או לר לחץ דם ריאתי) או כל מעכב פוספדייאטור אחר
- יש לך מחלת עיניים חמורה בלגלוקומה
- אובחנת לאחר איתח בעקרת הלב הבאות: היפרטרופיה שכימית של הלב (HOCM), דלקת מיערה של כפורת הלב (constrictive pericarditis), שנופדה של הלב, לחצים נמוכים במילוי הלב, היצרות של מסתם אבי הערוקים/

נהיגה ושימוש במכונית

מניגה לנהיג לנהיג ללא כאב ראש, שטשוש ראיה, סחרחורת או עייפות. אם זה קורה לך, אל תנהג ושתמש במכונית.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה מונוקורד: מכיל קלזוט וסוכרוז. אם נאמר לך בעבר על ידי רופא שיש לך אי סבילות לסוכרים מסוימים, היועק ברופא בעת טיטול תרופה זו. **מונוקורד 20, 40:** התרופה מכילה פחוט מ-1 גרם (מילוגרם 23) של נתרן טבליה, כלומר היא למעשה "נטולת נתרן".

3. כיצד שתשמש בתרופה?

אזרזרת מיוחדת הנובעת לשימוש בתרופה לפני הטיטול במונוקורד, ספר לרופא את:

- יש לך תת פעילות של בלוטת התריס (תירואיד)
- אתה סובל מיתח תזונה
- יש לך מחלת כבד או ליה
- אתה סובל מהיפותרמיה (טמפרטורה נמוכה מאוד של הגוף)

אתה סובל מהפרעות קשות ברמת הדם וליקוי שיש לך מה נמוכה באופן חריג של חמצן בדם וליקוי בשילוף גזים עקב מחלת ריאות או אי ספיקת לב אסימקת

נגובות בין תרופות

אין ליטול מונוקורד עם מעכבי פוספדייאטור כגון טדלפיל, אלפרוסדיל, טדלפיל או דרנפיל, המשמשים לטיפול באי אונות. שימוש בזמן של מונוקורד עם תרופות אלה יכול לגרום ללחץ הדם של לרדת לרמה נמוכה באופן חריג. **לפני לקחת את הטיטול במונוקורד על מנת לקחת תרופות אחרות, מאחר שלא יעביר את סיכויי ללקות ברקתה של תעוקת חזה.**

אין להשתמש בתרופה עם תכשירים המכילים רויסאטאם או אתה יטול מונוקורד עם לקחת תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. מיוחד אם אתה לוקח:

- תרופות הרגומות להרדת לחץ הדם כגון: חומסי בטא (אטנולול, פרופרנולול), חומסי תעלות סידן (דיפניפין לידטאזם), תרופות המרחיבות כל דם (לדילורל לסיטופיל, מתילדורה), מעכבי אנזימ המפרק אצטילכולין (ACE), חומסי קולטנים לאנגיטנסין (אלוסטרטן), מקדוקומיל, קנדסרטן סילקסטיל, מעכבי מנואמי קאפסידאז
- גונג דראון
- סיליקליים כגון אמירפטילין, קלופראמיין (ליטופיל דיאקון)
- תרופות הורליפטיס לטיפול בכפיסחה (דלזוזית, הרזול או הפרעה בחשיבה) כגון פנוטיאזינים (פנופאזין) או בורטרופינים (הלופרדיל)
- ארוסולמיין (ליטופיל ביטרגט)
- גולגולטין (ליטופיל ביטרגט)
- תרופות המיליות סאפורטרין לטיפול בהיפרפניאלגיהנימה (HPA)

שימוש בתרופה זוכרית אלוכהול אין לשתות אלוכהול. זה עלול להגביר את השפעת מונוקורד ולגרום ללחץ הדם יורד מדי. אם זה קורה, אתה עלול להרגיש סחרחורת או עילפון.

הריון, הנקה ופוריות אם את בהריון, נוספת להיכנס להריון או מניקה, היועק ברופא או ברקח לפני טיטול מונוקורד. הרופא יחליט אם עליון ליטול תרופה זו.

ככל פעם שאתה נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם אתה זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היועק ברופא או ברקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש במונוקורד עלול לגרום לתופעות לוואי. בחלק מהמשתמשים, אל תיבה למקור שאלות מן. תופעות לוואי: ייתכן שלא הסבול מלקחת תרופה זו.

אנרגיה רפואית או אתה חווה תגובה אלרגית ההתגובה יכולה להיות אל התסמינים הבאים:

- קשיש שימיה
- התנפחות הסימנים הפסיפיים, הפנים והשפתיה פריחה או גרד במיוחד על פני כל הגוף
- סחרחוטות
- עילפון
- דרמטיסס אקספוליאטיב (מחלה חמורה עם שלפוחיות בעור, פה, עיניים ואיבר המין)

פנה מייד לרופא אם אתה חווה תסמינים כלהם או התמוטטות לאחר המה הרפואיים. תופעות לוואי שכיחות מאוד (תופעות שמופיעות ביותר ממשמשש אחד ממשרה):

- כאב ראש
- תופעות לוואי שכיחות (תופעות שמופיעות ב-10-1 משמשש מתוך 100):
 - סחרחורת במעבר למצב עמידה
 - סחרחורת
 - שינויות חולשה
 - דופק מהיר
 - נמנום
- תופעות אלה יכולות להופיע בימים הראשונים לטיפול או לאחר העלאת המינון.
- תופעות לוואי שכיחות (תופעות שמופיעות ב-10-1 משמשש מתוך 1,000):
 - עילפון או התמוטטות
 - בחייה או הקאה
 - פירות פוער
 - חיוורון
 - חזה מוגברת
 - הרע מנחה

המחרה של תעוקת חזה (כאב לוחץ בחזה, בוצור או באזור הדרור) הסמקה

תופעות לוואי בדרות מאוד (תופעות שמופיעות בפחות ממשמשש אחד מתוך 10,000):

- צורת
- תופעות לוואי שכיחות (תופעות ששיכיחות טרם נקבעה):
 - אדמומית או קילוף של העור (דרמטיסס)
 - אקספוליאטיב (לחץ דם נמוך)
- התנפחות העור

אתה עלול לסבול גם מעלייה בכאב חזה עקב מחסור בחמצן לשריר הלב ואזורים מסביב ללב. קצב לב איטי מאוד חוזם עם השימוש ביטראטים.

אם אתה מתפעת לוואי, אם אתה מתפעות לוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעות לוואי שכיחות רבות (מחלה חמורה עם שלפוחיות בעור, פה, עיניים ואיבר המין) פנה מייד לרופא אם אתה חווה תסמינים כלהם או התמוטטות לאחר המה הרפואיים. תופעות לוואי שכיחות מאוד (תופעות שמופיעות ביותר ממשמשש אחד ממשרה):

לוואי שלא צוינה בעלון, עליון להתייעק עם הרופא. ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות במצומעות לחיזה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיטול תרופות" שנמצא בצד הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) התפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או על ידי כניסה לקישור: https://sideeffects.health.gov.il

5. אין להשתמש בתרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום בטיח יחד עם קלויש ידניים וטווח ארימים של ילדים ו/או יתקנות על כך בתמנה הרעה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מרופא.

אין להשתמש בתרופה אחרת תוך התפוגה המופיע על גבי התרופה. תאריך התאריך מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

הנאי אחסון: אין לאחסן מעל 25°C.

אין להשליך תרופות לביוב או לפח אשפה ביתי. שאל את הרוקח איך להשליך תרופות שאינן בשימוש עוד. מועמים אלו יטיעו להקטן על הסביבה.

6. מידע נוסף

נוסף על המרכיב הפעיל התרופה מכילה גם: **מונוקורד 20:** Lactose monohydrate, compressible sugar, sodium starch glycolate, hypromellose, magnesium stearate, titanium dioxide (E171), silica colloidal anhydrous, macrogol 400, carnauba wax.

מונוקורד 20 מכיל בוספי: Indigo carmine aluminum lake (E132), erythrosine aluminum lake (E127) Copovidone

מונוקורד 40 מכיל בוספי: Hypromellose, compressible sugar, lactose monohydrate, magnesium stearate, titanium dioxide (E171), silica colloidal anhydrous, erythrosine aluminum lake (E127), quinoline yellow aluminum lake (E104), macrogol 400, indigo carmine aluminum lake (E132), carnauba wax.

כיכד נראית התרופה ומה תונו האריזה: **מונוקורד 20:** טבליה סגולה, קמורה משני הצדדים, מצופה עם קו חצייה בצד אחד. גודלי אריזה מאושרים: 10, 28, 30, 50, 60 טבליות. ייתכן שלא כל גודלי האריזות משוקיים.

מונוקורד 40: טבליה לבנה, עגולה, מצופה עם קו חצייה בצד אחד. גודלי אריזה מאושרים: 10, 28, 30, 50 טבליות. ייתכן שלא כל גודלי האריזות משוקיים.

מונוקורד SR 50: טבליה אדומה, עגולה, מצופה. גודלי אריזה מאושרים: 10, 28, 30, 50 טבליות. ייתכן שלא כל גודלי האריזות משוקיים.

סמך רישום התרופה להנחיות משרד הבריאות. הממלכתי במשרד הבריאות: 052-51-23128-00

מונוקורד 40: 049-99-26415-00

מונוקורד SR 50: 050-88-26416-00

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה מסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

ביצור ובעל רישום: דקסל כ"ב בע"מ רח" דקסל 1, אור עקיבא 3060000, ישראל