

نشرة للمستهلك وفق أنظمة الصيادلة (مستحضرات) للعام 1986

يتم تسويق هذا الدواء بموجب وصفة طبيب فقط.

سيپريکس أقراص

10 ملغ، 15 ملغ، 20 ملغ

التركيب: المادة الفعالة وكميتها:

سيپريکس 10 ملغ: يحتوي كل قرص مغلف على: 10 ملغ أسيتالوبرام (كاؤكسالات)، (Ecitalopram (as oxalate))

سيپريکس 15 ملغ: يحتوي كل قرص مغلف على: 15 ملغ أسيتالوبرام (كاؤكسالات)، (Ecitalopram (as oxalate))

سيپريکس 20 ملغ: يحتوي كل قرص مغلف على: 20 ملغ أسيتالوبرام (كاؤكسالات)، (Ecitalopram (as oxalate))

المواد غير الفعالة: أنظر البند 6.

- اقرأ النشرة بامانع حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات ملخصة عن الدواء. إذا كانت لديك أسئلة إضافية فتوجه إلى الطبيب أو إلى الصيدلي.
- هذا الدواء وصف لعلاج مرضك. لا تقم بتمريره إلى آخرين. من شأنه أن يلحق الضرر بهم حتى وإن كان يبدو لك أن مرضهم مشابه لمرضك.
- هذا الدواء غير مخصص عادة للاستعمال لدى الأطفال والمرأهقين دون جيل 18 سنة.

تزيد الأدوية المضادة للإكتئاب والقلق من خطر سلوك وأفكار انتحارية لدى الأطفال، المراهقين والكبار في مقتبل العمر حتى جيل 25 سنة.
مع بداية العلاج بالدواء، على المتعالجين في كافة الأجيال وعلى أقربائهم تعقب التغيرات في السلوك مثل: تفاقم الإكتئاب، أفكار انتحارية، عدوانية وما شابه.
في حال ظرأت تغيرات مثل هذه، يجب التوجه إلى الطبيب على الفور.

1. من مع الدواء؟

سيپريکس هو دواء مضاد للإكتئاب من مجموعة معيقات امتصاص السيروتونين الانتقائي (SSRI). تعمل الأدوية التابعة لهذه المجموعة على جهاز السيروتونين في الدماغ وذلك برفع مستوى السيروتونين. تعتبر الأضطرابات في جهاز السيروتونين مسببات هامة في تطور الإكتئاب وأمراض متعلقة بالإكتئاب. يستخدم سيپريکس لعلاج الحالات التالية:

اضطرابات الهمم

القلق العام

القلق الاجتماعي

اضطراب الوسواس القهري

قد تمر عدة أسابيع حتى تبدأ بالتحسن. يجب الاستمرار بتناول الدواء حتى لو يستغرقك وقت حتى تشعر بالتحسن.

عليك التحدث مع الطبيب إذا لم تشعر بتحسن أو إذا ساء شعورك.

2. قبل استعمال الدواء

يمنع استعمال الدواء إذا كنت:

- حساساً للمادة الفعالة أو لأي من المركبات الإضافية التي يحتوي عليها الدواء (راجع قائمة المواد غير الفعالة في البند 6).
- تتناول أدوية أخرى من مجموعة معيقات أوكسيداز أحادي الأمين (MAOI). غير انتقائية، غير عকوسية، مثل: فينيلزين، ابيرونيزيد، ايزوكاربوكسازيد، نيلاميد، ترانيسبيرومدين. يجب الانتظار لمدة 14 يوماً بعد تناول هذه الأدوية قبل بدء العلاج بواسطة سبيراليكس، أو الانتظار لمدة 7 أيام بعد تناول سبيراليكس قبل بدء العلاج بهذه الأدوية.

ذلك يمنع تناول سبيراليكس في نفس الوقت مع مثبطات أوكسيداز أحادي الأمين العكوسية من النوع MAO-AI (مثل موكلوبميد لعلاج الاكتئاب)، أو مثبط أوكسيداز أحادي الأمين (MAOI) غير الانتقائي والعكوس لينزوليد (مضاد حيوي)، أو مثبطات أوكسيداز أحادي الأمين B (MAOB) غير العكوسية (مثل سيلجيبلين لعلاج الباركنسون).

الدمج مع هذه الأدوية يزيد خطورة متلازمة سيرتونين (انظر البند "التفاعلات بين الأدوية").

- تعاني من اضطرابات في و蒂رة نظم القلب (كما تم فحصها بواسطة تحطيط القلب، فحص أداء القلب) أو من عاهة خلقية في النظام الكهربائي للقلب.

- تتناول أدوية لعلاج اضطرابات وتيرة نظم القلب أو قد يكون لها تأثير على وتيرة نظم القلب (راجع البند "التفاعلات بين الأدوية").

- تتناول الدواء بيموزيد.

تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء

قبل العلاج بـسـپـرـالـیـکـسـ، أـخـبـرـ الطـبـیـبـ إـذـاـ:

- كنت حاملاً أو مرضعة (راجع البند "الحمل، الإرضاع والأخصاب").
- كنت تعاني أو عانيت من داء الصرع. يجب وقف العلاج بـسـپـرـالـیـکـسـ إذا حدثت نوبة صرع للمرة الأولى أو إذا طرأ ارتقاض في وتيرة النوبات (راجع أيضاً البند "الأعراض الجانبية").
- كنت تعاني أو عانيت بالماضي من خلل في أداء الكبد أو الكلوي، قد يضطر الطبيب إلى ملائمة جرعة الدواء.
- كنت تعاني من السكري، العلاج بواسطة سـپـرـالـیـکـسـ قد يؤثر على توازن مستويات السكر، قد بطلب منك ملائمة جرعة الأنسولين و/أو أدوية أخرى لعلاج السكري.
- كان لديك هبوط في مستوى الصوديوم في الدم.
- كان لديك ميل لحدوث حالات نزيف أو كدمات بسهولة، أو إذا كنت حاملاً (أنظر البند "الحمل، الإرضاع والخصوصية")

- كنت تعالج بالصدمة الكهربائية (ECT).

- كنت تعاني أو عانيت من مرض القلب التاجي.

- كنت تعاني أو عانيت من اضطراب في أداء القلب أو إذا عانيت مؤخراً من نوبة قلبية.

- كانت وتيرة نظم قلب منخفضة أثناء الاستراحة وأو إذا كنت تعرف أنه قد ينتج عنك هبوط في مستويات الأملاح في الدم، كنتية للإسهال أو التقيؤات المتواصلة أو كنتية لتناول أدوية مدرة للبول.

- كنت تعاني أو عانيت من علامات قد تدل على اضطرابات في وتيرة نظم القلب مثل: وتيرة نظم قلب سريعة أو غير منتظمة، إغماء، إنهايار أو دوخة أثناء القيام من وضع الجلوس أو الاستلقاء.

- كنت تعاني أو عانيت في الماضي من أعراض في العينين مثل أنواع معينة من مرض الزرق (ضغط مرتفع في العينين).

انتبه:

بعض المتعالجين الذين يعانون من اضطراب هوس اكتئابي قد يدخلون في حالة من الهوس التي تتميز بأفكار غير اعتيادية تتبدل بسرعة، فرح غير مفسر ونشاط جسماني فوق الاعتيادي، إذا شعرت بهذه الأعراض يجب التوجه إلى الطبيب.

قد تظهر أيضاً أعراض مثل عدم الارتياح أو صعوبة في الجلوس بارتياح أو الوقوف بارتياح في الأسابيع الأولى من العلاج، يجب إبلاغ الطبيب بذلك فوراً، حال ظهورها.

أدوية مثل سيراليوكس (تسمى SSRI/SNRI) قد تسبب أعراض اضطراب في الأداء الجنسي (أنظر بند 4). في حالات معينة استمرت الأعراض حتى بعد وقف العلاج.

اضطراب الهرم

عند علاج اضطرابات الهرم تمر عادة 2-4 أسابيع قبل بدء الشعور بتحسن ما.

في بداية العلاج قد يشعر بعض المتعالجين بالقلق المفرط الذي سيزول خلال الأسبوعين الأول والثاني من العلاج. استناداً إلى ذلك يوصى في بعض حالات وجود اضطرابات هرم، البدء بجرعة منخفضة.

من المهم جداً التشديد على تنفيذ تعليمات الطبيب وعدم وقف العلاج أو تغيير الجرعة من دون استشارة الطبيب.

أفكار انتحارية وتفاقم الاكتئاب أو اضطرابات القلق

الأفكار الانتحارية أو الأفكار بإلحاق الضرر بالذات منتشرة في اضطرابات الأمراض العقلية وخاصة لدى متلقي العلاج الذين يعانون من الاكتئاب وأو اضطراب القلق. هذه الأفكار قد تزيد مع بداية العلاج بمضادات الاكتئاب، لأن تأثير هذه الأدوية يستغرق وقتاً، أسبوعين عادة. ولكن في بعض الأحيان أكثر من ذلك.

احتمال ظهور مثل هذه الأفكار يكون أكبر إذا:

- كانت لديك في الماضي أفكار انتحارية أو أفكار بإلحاق الضرر بالذات.
- كنت شاباً بالغاً. تظهر المعلومات من الأبحاث الطبية أن هناك خطورة زائدة لسلوك انتحاري بين البالغين ما دون سن 25 سنة وهم في حالة مرض نفسي وقد تم علاجهم بمضادات الاكتئاب.

بالتالي وكانت لديك أفكار انتحارية أو أفكار بالآلياء الذاتي في أي وقت من الأوقات. عليك التوجه إلى طبيبك أو التوجه إلى المستشفى فوراً.

يوصى بإعلام أحد أقرباء العائلة أو صديق مقرب بأنك تعاني من الاكتئاب أو من اضطراب قلق وأن تطلب منهم قراءة هذه النشرة. يمكن أن تطلب منهم بإعلامك إذا اعتقدوا أنه قد طرأ تفاقم حالة الاكتئاب أو اضطراب القلق لديك. أو إذا كانوا فلقين من تغيير طرأ على سلوكك.

الأطفال والمراهقون

سيراليوكس غير مخصص عادة للأطفال وللمراهقين دون جيل 18 سنة.

هناك خطر لدى المتعالجين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة والذين تناولوا أدوية من هذه المجموعة لحدث أعراض جانبية مثل محاولات الانتحار، أفكار انتحارية وعائية (وخاصة عائية، سلوك متمرد وغضب). على الرغم من ذلك، يمكن لطبيبك أن يصف هذا الدواء لمعالجين دون جيل 18 سنة، إذا اعتقد أن الأمر سيكون لمصلحتهم.

إذا قام الطبيب بوصف الدواء للمتعالجين دون جيل 18 سنة. وأنت معني بمناقشته ذلك – توجه إلى الطبيب ثانية.

يتعين عليك إبلاغ طبيبك إذا ظهر جزء من الأعراض الجانبية التي تم تنصيبها أو تفاقمت لدى المعالجين دون سن 18 سنة. إضافة إلى ذلك، لم تتحقق بعد التأثيرات طويلة الأمد لسييراليكس في هذه الفئة العمرية من ناحية النمو، البلوغ والتطور الذهني- السلوكي.

التفاعلات بين الأدوية:

إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخرًا أدوية أخرى بما فيها أدوية غير ملزمة بوصفة طبية ومكممات غذائية، أخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك. يجب إبلاغ الطبيب أو الصيدلي بشكل خاص إذا كنت تتناول:

- مثبطات أكسيداز أحادي الأمين (MAOI) غير الانقائية (مثلا: فينيلزين، ابيرونيزيد، ايزوكاربوكسازيد، نيلاميد، ترانيسيبرومين). إذا تناولت أحد هذه الأدوية، يجب الانتظار لمدة 14 يومًا قبل بدء العلاج بسييراليكس. بعد وقف العلاج بسييراليكس، يجب الانتظار لمدة 7 أيام قبل بدء العلاج بهذه الأدوية.
- يمنع الاستعمال بالتزامن مع مثبطات أكسيداز أحادي الأمين A (MAOAI) الانقائية، العكوس، مثل موكلوبimid (العلاج الاكتئاب).
- يمنع الاستعمال بالتزامن مع مثبطات أكسيداز أحادي الأمين B (MAOBI) الغير عكوس، مثل سيلجيبلين (العلاج مرض الباركنсон). قد تزيد خطورة ظهور أعراض جانبية.
- يمنع الاستعمال بالتزامن مع المضاد الحيوي لنزوبيك.
- ليثيوم (علاج الهوس الاكتئابي) وتربوفان.
- أيميرامين وديسيبرامين (أدوية لعلاج الاكتئاب).
- سومتربيتان وأدوية مشابهة (العلاج الصداع النصفي) وترايمدول (التسكين الآلام الحادة). قد تزيد خطورة ظهور أعراض جانبية.
- سيميتين، لنسوفرازول وأوميرازول (العلاج القرحة المعدية)، فلوكونازول (العلاج تلوثات فطرية)، فلوفوكسامين (العلاج الاكتئاب) ونيكلوبيدين (التقليل خطر السكتة الدماغية). هذه الأدوية قد تزيد تركيز أسيتالوبرام في الدم.
- سانت جون وورت: (هيريكوم بروفوراتوم، دواء نباتي لعلاج الاكتئاب).
- أسيبرين (حمض أسيتيك ساليسيليک) ومضادات الالتهاب غير الستيروئيدية (أدوية لتسكين الآلام أو تلميع الدم، مضادات التخثر). قد تزيد الميل إلى حدوث حالات نزيف.
- وارفارين (Warfarin)، ديبيريدامول (dipyridamole) وفيپروکومون (phenprocoumon) (أدوية لتخفيف الدم، مضادات التخثر): من المؤكد أن الطبيب سيتحقق مدة تخثر دمك عند بداية العلاج ومع انتهاء العلاج بسييراليكس. بهدف التأكيد من أن جرعة دواء تلميع الدم التي تتناولها ملائمة.
- أدوية من شأنها أن تخفض سقف الحساسية لنوبات الصرع: ميفلوكين (العلاج الملاريا)، بوبروبيون (العلاج الاكتئاب) وترايمدول (العلاج الألم الحاد)، مستحضرات مضادة للذهان (أدوية لعلاج انفصام الشخصية والهوس) وأدوية مضادة للاكتئاب (من فئة مضادات الاكتئاب ثلاثة الحلقة و SSRIs)، عقب خطر محتمل لخض عنبة حدوث الاختلاجات.
- فليكاينيد (Flecainide)، بروبافينون (propafenone) (العلاج أمراض القلب والأوعية الدموية)، كلوميرامين (clomipramine)، نورتريبتين (nortriptyline) (مضادات اكتئاب) ورسيريدون (risperidone)، ثيوريدازين (thioridazine) (أدوية مضادة للهوس). قد تطلب ملائمة لجرعة سييراليكس.
- أدوية تخفض مستويات البوتاسيوم أو المغنيزيوم في الدم. لأنه مثل هذه الحالات تزيد من خطورة اضطرابات وتيرة نظم القلب التي تشكل خطراً على الحياة.

يمنع تناول سييراليكس بالتزامن مع أدوية لعلاج اضطرابات وتيرة نظم القلب أو الأدوية التي قد يكون لها تأثير على وتيرة نظم القلب، مثل أدوية علاج اضطرابات وتيرة نظم القلب من النوعين IIA و III، أدوية مضادة للذهان (مثل: مشتقات فينوثيازين، هالوبيريدول)، مضادات الاكتئاب ثلاثة الحلقات، مستحضرات معينة مضادة للميكروبات (مثل سيبروفلوكساسين، موكتسيفالوكساسين، إريثروميسين بإعطاء وريدي، بنتاميدين، أدوية مضادة للملاريا وخاصة هالوبينتررين) مضادات هستامين معينة (العلاج الحساسية، أستميوزول، هيدروكسيزين، ميزولستين). إذا كانت لديك أسلمة إضافية حول هذا الموضوع توجه إلى الطبيب.

- الأدوية المضادة للاكتئاب من مجموعة SNRI و SSRI قد تؤدي إلى متلازمة سيروتونين (نادر) التي تشمل اعراض مثل عصبية، عدم هدوء، بلبلة، تعرق، حرارة مرتفعة، ردود فعل تلقائية مفرطة، تشنجات في العضلات، ارتجافات، ارتفاع في وتيرة نظم القلب. (راجع "الأعراض الجانبية").

يمكن للمتلازمة أن تحدث بوتيرة أعلى إذا كنت تتناول أدوية إضافية في الوقت ذاته والتي، تؤثر على الجهاز العصبي (أنظر أعلاه).
يجب تبليغ الطبيب عن أي دواء إضافي تتناوله.

استعمال الدواء والطعام

يمكن تناول سيراليكس مع أو من دون طعام.

استعمال الدواء واستهلاك الكحول

كما هو الحال بالنسبة لأدوية كثيرة، يوصى بعدم استهلاك الكحول مع سيراليكس، على الرغم من أنه من غير المتوقع حدوث تفاعل بين سيراليكس والكحول.

الحمل، الإرضاع والخصوصية

أخبر طبيبك إذا كنت حاملاً أو تخططين للحمل. لا تستعمل سيراليكس إذا كنت حاملاً أو مرضعة، إلا إذا استشرت طبيبك وناقشت معه الخطورة مقابل الفائدة من تناول هذا الدواء.

في حال تناولت سيراليكس خلال الأشهر الـ 3 الأخيرة من الحمل، قد تظهر العلامات التالية لدى الطفل المولود: مشاكل في التنفس، تزرق الجلد، تشنجات، تغيير في درجة حرارة الجسم، مشاكل في الإطعام، تقيؤات، مستوى سكر منخفض في الدم، عضلات متصلة أو مرتبطة، ردود فعل مفرطة، رجفة، اهتياج بالغ، عصبية، نعاس، بكاء غير منقطع، صعوبة في النوم. يجب التوجه فوراً إلى الطبيب إذا ظهرت هذه العلامات عند طفلك.

تأكد من أن القابلة وأو الطبيب يعرفان أنك تتناولين سيراليكس. عندما يتم تناول أدوية من نوع سيراليكس أثناء الحمل وخاصة خلال الأشهر الـ 3 الأخيرة من الحمل. تزيد خطورة ظهور حالة خطرة لدى المولودين يدعى فرط ضغط الدم الرئوي المتواصل (PPHN)، الذي يؤدي بالطفل إلى التنفس بسرعة أكبر ويبدو أزرق. هذه الإشارات تظهر عادة خلال الـ 24 ساعة الأولى بعد الولادة. في حال ظهرت هذه الإشارات لدى طفلك. عليك التوجه إلى القابلة أو الطبيب فوراً.

إذا كنت تتناولين سيراليكس قبيل نهاية الحمل قد يكون خطر زائد لحدوث نزيف مهبلي شديد بعد وقت قصير من الولادة، خاصة إذا كان لديك سابقة اضطرابات نزيف. على الطبيب أو القابلة الخاصة بك أن يكونوا على علم بأنك تتناولين سيراليكس لكي يتمكنوا من تقديم المشورة لك.

في حال تناولت سيراليكس خلال الحمل، يجب عدم وقف تناوله بشكل فجائي.

قد ينتقل سيراليكس إلى حليب الأم. ولذلك لا يوصى بالإرضاع أثناء استعمال الدواء.

أظهرت أبحاث أجريت على الحيوانات أن سيتالوبرام وهو دواء مشابه لإسيتالوبيرام، يقلل جودة النطاف. نظرياً، يمكن لهذا الأمر أن يؤثر على الإخصاب، غير انه لم يلاحظ بعد تأثير على الإخصاب لدى الإنسان.

السيارة واستعمال الآلات

قبل أن تعرف كيفية تأثير سيراليكس عليك. يوصى بعدم سياقة السيارة أو تشغيل ماكينات خطيرة، أو ممارسة أي نشاط يستوجب اليقظة.

سيراليكس يحتوي على صوديوم

يحتوي هذا الدواء على أقل من 1 مليمول صوديوم (23 ملغ) في القرص. وبالتالي فهو فعلياً "خل من الصوديوم".

يجب دائمًا استعمال الدواء حسب تعليمات الطبيب. عليك أن تفحص مع الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكداً. يتم تحديد الجرعة وطريقة العلاج من قبل الطبيب فقط. الجرعة الموصى بها عادة هي:

للبالغين

اكتئاب: الجرعة الموصى بها عادة هي 10 ملغ مرة في اليوم (جرعة واحدة يومياً). يمكن لطبيبك أن يرفع الجرعة حتى 20 ملغ في اليوم.

اضطراب الهلع: الجرعة الأولية هي 5 ملغ في اليوم (جرعة واحدة يومياً) طيلة الأسبوع الأول وبعد ذلك رفع الجرعة إلى 10 ملغ في اليوم. يمكن لطبيبك أن يرفع الجرعة حتى 20 ملغ للاليوم.

القلق الاجتماعي: الجرعة الموصى بها عادة هي 10 ملغ مرة في اليوم (جرعة واحدة يومياً). يمكن لطبيبك أن يقلل الجرعة إلى 5 ملغ في اليوم أو رفع الجرعة حتى 20 ملغ في اليوم. وفقاً لردة فعلك للعلاج بالدواء.

اضطراب قلق: الجرعة الموصى بها عادة هي 10 ملغ مرة في اليوم (جرعة واحدة يومياً). يمكن لطبيبك أن يرفع الجرعة حتى 20 ملغ في اليوم.

اضطراب وسواس قهري: الجرعة الموصى بها عادة 10 ملغ مرة في اليوم (جرعة واحدة يومياً). يمكن لطبيبك أن يرفع الجرعة حتى 20 ملغ في اليوم.

المسنون (فوق جيل 65 سنة):

الجرعة الموصى بها عادة هي 5 ملغ مرة في اليوم (جرعة واحدة يومياً). يمكن لطبيبك أن يرفع الجرعة حتى 10 ملغ في اليوم.

الأطفال والمراهقون

سيبراليكس غير معد للأطفال وللمراهقين (راجع البند "2. قبل استعمال الدواء").

اعتلال بأداء الكلى

يوصى بتوكيد الحذر في متعالجين لديهم اعتلال في أداء الكلى بشكل وخيم. يجب تناول الدواء كما سجل من قبل الطبيب.

اعتلال بأداء الكبد

على المتعالجين من هذه المجموعة عدم تلقي أكثر من 10 ملغ من الدواء للاليوم. يجب تناول الدواء كما وصف لك من قبل الطبيب.

متعالجون يعرف بأن لديهم استقلاب منخفض لأنزيم CYP2C19

على المتعالجين الذين يعرف بأن لديهم نمط جيني من هذا النوع عدم تلقي أكثر من 10 ملغ من الدواء للاليوم. يجب تناول الدواء كما وصف من قبل الطبيب.

يمنع تجاوز الجرعة الموصى بها

طريقة الاستعمال: يجب ابتلاع الدواء مع القليل من الماء. يمنع مضغ أو تفتيت القرص لأن طعمه مر!

يمكن تناول الدواء مع أو من دون طعام.

يمكن تقسيم القرص. إذا كان هناك حاجة لشطر القرص، يجب وضعه على سطح مستوي بحيث يكون خط الشطر نحو الأعلى، لأنه يجب الضغط بالسبابتين نحو الأسفل على طرف القرص كما هو مبين في الرسم.



مدة العلاج:

قد تمر بضعة أسابيع حتى تشعر بتحسن. يجب مواصلة تناول الدواء حتى إذا استغرق وقتاً حتى يتحسن الشعور. يجب عدم تغيير الجرعة من دون استشارة الطبيب.

يتعين عليك إكمال العلاج الموصى به من قبل الطبيب. وقف العلاج مبكراً قد يؤدي إلى عودة الأعراض، يوصى بالمواظبة على العلاج لمدة 6 أشهر على الأقل بعد تحسن شعورك.

-إذا تناولت جرعة مفرطة من الدواء، عن طريق الخطأ أو إذا ابتلعه أحد الأطفال، توجه إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ التابعة للمستشفى فوراً مصطحباً عبوة الدواء معك. قم بذلك أيضاً إذا لم يكن شعورك سيئاً. الأعراض المحتملة للجرعة المفرطة هي: دوخة، رجفة، عصبية، تشنجات، سبات، غثيان، تقيؤ، تغيرات في و Tingira نظم القلب، هبوط ضغط الدم، تغيير في توازن الأملاح/السوائل في الجسم.

- إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المطلوب، يمنع تناول جرعة مضاعفة. إذا نسيت تناول الدواء ونذكرت قبل النوم. تناول الوجبة التي نسيتها فوراً وتتابع كما هو معتمد في اليوم التالي. إذا نذكرت خلال الليل فقط أو في اليوم التالي، لا تتناول الجرعة التي نسيتها وتتابع كالمعتمد.

- يجب المواظبة على العلاج وفقاً لتوصية الطبيب. يجب استعمال هذا الدواء في الأوقات المحددة كما تم تحديدها من قبل الطبيب المعالج. حتى إذا طرأ تحسن على وضعك الصحي. يمنع التوقف عن العلاج بالدواء من دون استشارة الطبيب أو الصيدلي.

-إذا توقفت عن تناول الدواء: لا تتوقف عن العلاج بسيبيراليكس قبل أن تلتقي أمراً من الطبيب بذلك. عند إكمال العلاج، يوصى عادة بقليل الجرعة الدوائية تدريجياً على امتداد عدة أسابيع. التوقف الفجائي عن العلاج يمكن أن يسبب أعراضًا شائعة في نهاية العلاج بسيبيراليكس. خطر ظهور هذه الأعراض يكون أكثر حدة كلما كان العلاج بسيبيراليكس أطول أو بجرعة عالية أو إذا تم خفض العلاج بسرعة كبيرة. لدى معظم متلقى العلاج. تكون هذه الأعراض طفيفة أو أنها تزول من تلقاء ذاتها خلال أسبوعين. على الرغم من ذلك، يمكن للأعراض لدى بعض المعالجين أن تكون حادة أو أن تستمر لوقت أطول (3-2 شهر أو أكثر). إذا شعرت بأعراض وقف العلاج، عند انتهاء العلاج بسيبيراليكس. استشر الطبيب. يبدو أن الطبيب سيطلب منك العودة لتناول الدواء وخفض الجرعة بشكل أبطأ.

تشمل اعراض وقف العلاج: دوخة (عدم استقرار أو فقدان التوازن)، إحساس بباليه (" وخز طفيف")، إحساس بحرقة وتيار كهربائي (أفال انتشاراً)، في الرأس أيضاً. اضطرابات في النوم (أحلام قوية، كوابيس، عدم القرءة على النوم)، شعور بالقلق، صداع، غثيان، تعرق (بما في ذلك تعرق ليلى)، شعور بعدم الراحة أو العصبية، رجفة، بلبلة أو عدم معرفة الاتجاهات، شعور بالانفعال أو العصبية، إسهال، اضطرابات في الرؤية، نبضات قلب (خفقان).

- يمنع تناول الأدوية في الظلمة! افحص لاصقة الدواء والجرعة في كل مرة تتناول فيها الدواء. قم باستعمال نظارات إذا كنت بحاجة إليها.

إذا كانت لديك أسئلة أخرى حول استعمال الدواء. استشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية:

على غرار أي دواء آخر. فإن استعمال سبيرواليكس قد يؤدي إلى أعراض جانبية لدى بعض المستعملين. لا تفرز عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية. قد لا تتعانى من أي منها.

عادة ما تزول هذه الأعراض بعد بضعة أسابيع من العلاج. انتبه إلى أن جزءاً من الأعراض الجانبية قد يكون أعراض مرضك ولذلك ستتحسن حين يبدأ شعورك بالتحسن.

يجب التوجه إلى الطبيب أو إلى المستشفى فوراً إذا ظهرت الأعراض التالية:

غير شائع، شيوخ حتى 1 من بين 100 متعالج:

-نزيف شاذ، يشمل نزيف في جهاز الهضم.

نادر، شيوخ حتى 1 من بين 1000 متعالج:

- انفاس الحبل، اللسان، الشفتين الحلق أو الوجه، شرى أو صعوبات في التنفس أو البلع (علامات رد فعل تحسسي وخيم).

- سخونة، عصبية أو قلة هدوء، ارتباك، ارتعاد، تقلص العضلات بشكل قوي، قد يكون ذلك علامات حالة نادرة تسمى متلازمة السيروتونين.

شيوخ غير معروف:

- صعوبة في إدرار البول.
- تشنجات (راجع أيضاً البند "تحذيرات خاصة ذات علاقة باستعمال الدواء").
- اصفرار الجلد والمنطقة البيضاء في العينين. وهي إشارات لمشاكل في أداء الكبد/التهاب في الكبد (هيباتيتيس).
- خفقان قلب سريعة وغير منتظمة وإغماء. قد تكون إشارات لوضع خطير على الحياة يدعى Torsade de Pointes (اضطراب وتيرة نظم القلب).
- أفكار باليذاء الذات أو أفكار انتحارية (أنظر أيضاً البند "تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء").
- انفاس فجائي للجلد أو الأنسجة المخاطية (وذمة وعانية).

أعراض جانبية أخرى:

تظهر على فترات متقاربة جداً (شيوخ أكثر من 1:10):
غثيان، صداع

تظهر على فترات متقاربة (شيوخ حتى 10:1):

احتقان في الأنف (التهاب الجيوب الأنفية)، هبوط في الشهية أو ارتفاع في الشهية، قلق، عدم الراحة، أحلام غير طبيعية، صعوبة في النوم، نعاس، دوخة، تثاؤب، رجفة، إحساس بالتنميل في الجلد، إسهال، إمساك، تقيؤ، جفاف في الفم، تعرق مفرط، آلام في العضلات والمفاصل، اضطرابات في الأداء الجنسي (دفق النطاف متأخرًا، مشكلة في الانتصاب، هبوط في الرغبة الجنسية، صعوبات في الوصول إلى النشوة الجنسية لدى النساء)، تعب، حرارة، ارتفاع في الوزن.

تظهر على فترات متباudeة (شيوخ حتى 100:1):

طفح، حكاك في الجلد، صرير الأسنان، انفعال، عصبية، نوبة هلع، بلبلة، اضطرابات في النوم، اضطرابات في حاسة الذوق، إغماء، تضخم البوئين، اضطرابات في الرؤية، طنين في الأذنين، تساقط الشعر، نزيف حاد في الدورة الشهرية، دورة شهرية غير اعتيادية، تقليل الوزن، وتيرة نظم قلب سريعة، انفاس في الأطراف، نزيف من الأنف.

تظهر في أحيان نادرة (شيوخ حتى 1000:1):

عدوانية، تبدد الشخصية، هلوسة، وتيرة نظم قلب بطيئة.

أعراض جانبية شيوها غير معروفة:

هبوط في مستوى الصوديوم في الدم (الأعراض هي شعور سيء وغثيان مع ضعف في العضلات أو بلبلة). دوخة أثناء القيام من وضع الجلوس أو الاستلقاء بسبب ضغط دم منخفض، أداء كبد غير سليم (ارتفاع في إنزيمات الكبد في الدم)، اضطرابات في الحركة (حركات غير إرادية للعضلات)، انتصاع مؤلم. حالات نزيف (تشمل نزيف في الجلد وفي الأغشية المخاطية) افراز غير سليم لهرمون ADH يجعل الجسم يحبس الماء ويخفف الدم، ويقلل كمية الصوديوم، افراز الحليب في الرجال والنساء الغير مرضعات، هوس، ارتفاع في هطر كسور شوهد في متعالجين بأدوية من هذا النوع، تغير في وتيرة القلب (يسمى إطالة مقطع QT، يمكن رؤيته في فحص مخطط كهربائية القلب). نزيف مهيلي ثقيل بعد وقت قصير من الولادة، (أنظري معلومات أخرى في بند "الحمل، الإرضااع والخصوصية" الذي يظهر في الفصل 2 من النشرة).

إضافة لذلك، هناك أعراض جانبية معروفة تظهر حين يتم تناول أدوية تعمل بشكل مشابه لاسيتالوبرام (المادة الفعالة في سيبيريكس)، وهي: أكتيزيا (فلة الراحة أثناء الحركة)، فقدان الشهية.

إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية، أو إذا عانيت من عارض جانبي لم يتم ذكره في النشرة. عليك استشارة الطبيب.

التبلیغ عن اعراض جانبية

يمكن التبلیغ عن اعراض جانبية لوزارة الصحة من خلال الضغط على الرابط "تبلیغ عن اعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود في صفحة المنزل في موقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجه للنموذج الانترنت للتبلیغ عن اعراض جانبية، أو من خلال دخول الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il/>

5. كيف يحفظ الدواء؟

- **تجنب التسمم!** يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول ايدي الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتفادي التسمم.

لا تسبب التقيؤ من دون تعليمات صريحة من الطبيب!

- يجب عدم استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. Date) الظاهر على ظهر العبوة/القنينة/علبة الكرتون/اللاصقة.

تاريخ انتهاء الصلاحية يتطرق إلى اليوم الأخير من الشهر ذاته.

- **شروط التخزين:** يجب التخزين بدرجة حرارة تقل عن (30°C).

6. معلومات إضافية

- بالإضافة إلى المادة الفعالة، يحتوي الدواء أيضًا على:

Talc, Croscarmellose Sodium, Microcrystalline Cellulose silicified, Magnesium Stearate, Purified water, Opadry OY-S-28849 (white)

كيف يبدو الدواء سبيبر اليكس وما هو محتوى العبوة:

سيپر اليکس 10 ملغ: قرص مغطى، إهليجي، أبيض، مشار إليه بـ "E" و "L" من كلا جانبي خط التقسيم. في أحد وجهي القرص.

سيپر اليکس 15 ملغ: قرص مغطى، إهليجي، أبيض، مشار إليه بـ "E" و "M" من كلا جانبي خط التقسيم. في أحد وجهي القرص.

سيپر اليکس 20 ملغ: قرص مغطى، إهليجي، أبيض، مشار إليه بـ "E" و "N" من كلا جانبي خط التقسيم. في أحد وجهي القرص.

الأقراص متوفرة بعبوات نقطات، تحتوي على 7، 14، 28، 56، 98 قرصاً. ليست كل أحجام العبوات مسوقة.

صاحب التسجيل وعنوانه: لوندبیک اسرائیل מ.ض، چلچالی هپلادا 11، ص.ب 13105، هرتسليا 4672211.

عنوان البريد الإلكتروني: Israel@Lundbeck.com

اسم المنتج: H. Lundbeck A/S, Ottiliaevej 9, DK-2500 Valby, Denmark

تم تحرير النشرة في أيار 2021 وفق تعليمات وزارة الصحة.

- رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي بوزارة الصحة:

127.01.30558 سبيبر اليکس 10 ملغ

127.02.30559 سبيبر اليکس 15 ملغ

127.03.30560 سبيبر اليکس 20 ملغ

- للتبسيط ولتسهيل القراءة جاء نص هذه النشرة بلغة المذكر. مع ذلك فالدواء مخصص لكلا الجنسين.