

بيتاهايستين تيشف 16 ملخ

أقراص

المادة الفعالة وكيفيتها:

يحتوي كل قرص على: بيتاهايستين ديهيدروكلوريد 16 ملخ (Betahistine dihydrochloride 16 mg)

لمعلومات عن المركبات غير الفعالة وموادات الحساسية أنظر الفقرة 2

"معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء" و الفقرة 6 "معلومات إضافية".

اقرأ النشرة تمعن حتى نهايتها قبل إستعمال الدواء. حتى توفرت لديك أسلطة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.

وُصف هذا الدواء لعلاج مرضك، لا تعطيه للآخرين. فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن مرضهم مشابه لمرضك.

(1) لأى غرض مخصص الدواء؟

- لعلاج متلازمة متير (Meniere's syndrome).
- لعلاج أمراض الدوار المحيطي.

الفصيلة العلاجية: مضاد الدوار

يحتوي الدواء على بيتاهايستين الذي يعتبر قرین للهيستامين الذي يستعمل لعلاج أمراض متلازمة متير:

دوار (غير تيفو)، رنين في الأذنين (tinnitus)، فقدان السمع أو صعوبة في السمع.

يميل الدواء على تحسين جريان الدم في الأذن الداخلية، الأمر الذي يقلل من تراكم الضغط.

(2) قبل إستعمال الدواء

لا يجوز إستعمال الدواء إذا:

- كثت حساساً (أيبريج) لـ بيتاهايستين (المادة الفعالة) أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (أنظر الفقرة 6).

• كثت تعاني من ورم في الغدة الكظرية (ورم خلية الكروماتين القاتمة).

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء

قبل العلاج بـ بيتاهايستين تيشف 16 ملخ إستشر الطبيب إذا:

- كثت تعاني من الربو

- كثت تعاني من قرحة في المعدة (Ulcer)

- كثت في فترة الحمل، تعتقدين بأنك حامل أو تحظطين للحمل

- كثت في فترة الرضاعة

إذا إنطبخت عليك أحدي الحالات الموصوفة أعلاه، يقدّم لك الطبيب الإستشارة فيما إذا كان بالنسبة لك بدء تناول بيتاهايستين تيشف 16 ملخ

من الجائز أن يرغب الطبيب أيضاً لمتابعة حالة الربو لديك خلال العلاج بـ بيتاهايستين تيشف.

التفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تتناولين، أو إذا تناولت مؤخرًا، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، احك للطبيب أو للصيدلي عن ذلك. يجب إبلاغ الطبيب أو الصيدلي قبل بدء العلاج بالأشخاص إذا كنت تتناول:

- أدوية مضادة للهيستامين - قد تقلل هذه الأدوية من تأثير بيتاهايستين تيشف.

- مثبطات موتونامين - أوكسيداز (MAOIs) - لعلاج الاكتئاب أو مرضاً الباركيتيسنوس - قد تزيد هذه الأدوية من تأثير بيتاهايستين تيشف.

الأطفال والمرأهات

لا يوصي باستعمال بيتاهايستين تيشف لدى أطفال دون عمر 18 سنة لعدم توفر ما يكفي من المعلومات حول سلامته ونجاعته واستعمال.

استعمال الدواء والطعام

يجب تناول الدواء مع أو بعدوجبة طعام.

الحمل والإرضاع

لا يجوز تناول بيتاهايستين تيشف خلال فترة الحمل، إلا إذا قرر الطبيب بأن هذا الأمر ضروري.

لا يعرف فيما إذا كان بيتاهايستين تيشف ينتقل إلى حليب الأم، لا يجوز الإرضاع خلال فترة إستعمال الدواء، إلا إذا أوصاك الطبيب بشيء ما.

السياقة واستعمال الماكولات

من غير المتوقع أن يؤدي بيتاهايستين تيشف إلى ضعف في القدرة على السياقة أو إستعمال المعدات أو الماكولات.

بالرغم من ذلك، يجب التذكر، بأن الأمراض التي من أصلها يتم تناول هذا الدواء (الدوار، رنين في الأذنين وفقدان السمع المتعلقة بمتلازمة متير) قد تسبب الشعور بالدوخة أو الغثيان، والتي قد تؤثر على القدرة على القيادة وتشغيل الماكولات.

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء

يحتوي المستحضر على لكتوز وقد يسبب الحساسية لدى الأشخاص الذين لديهم حساسية للكتوز.

يحتوي كل قرص على 140 ملخ لكتوز.

(3) كيفية إستعمال الدواء؟

يجب دائمًا إستعمال المستحضر حسب تعليمات الطبيب، بلائم الطبيب المقدار الدوائي وفقاً لحالتك الطبية. من الجائز أن يكون تأثير بيتاهايستين تيشف فوريًا.

عليك إستيقاظ من النوم أو الصيدلي إذا لم تكن واثقًا بخصوص المقدار الدوائي وطريقة العلاج.

المقدار الدوائي وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط. المقدار الدوائي الاعتيادي للكبار هو عادة: قرص واحد (16 ملخ) ثلاث مرات في اليوم.

عند الحاجة، بالإمكان البدء بمقدار دوائي ذي 8 ملخ (نصف قرص) ثلات مرات في اليوم.

يتعين

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في النشرة، عليك استشارة الطبيب.

التبلیغ عن اعراض جانبية

بإمكان التبلیغ عن اعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "تبلیغ عن اعراض جانبية بغلج دوائي" الموجود في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجه إلى النموذج المباشر للتبلیغ عن اعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il>

5) كيفية تخزين الدواء؟

- يجب التسليم بحفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متطلبات أيدي و المجال رؤية الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتقديم إصافتهم بالتنفس.
- لا يجوز استعمال الدواء بعد إنقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) (الذي يظهر على ظهر العلبة). بشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- يجب تخزين في مكان جاف، دون 25 درجة مئوية. يجب الحفظ في الغلة الأصلية للحماية من الضوء.
- لا يجوز رمي الأدوية في النفايات. إسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من أدوية ليست قيد الاستعمال. تساعد هذه الوسائل في الحفاظ على البيئة.

6) معلومات إضافية

يحتوي الدواء بالإضافة للمادة الفعالة أيضًا:

Lactose monohydrate, microcrystalline cellulose, crospovidone, stearic acid, colloidal silica anhydrous, povidone.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة:
قرص دائري، بلون أبيض حتى شبه أبيض، يظهر على أحد جانبيه B16 ومن الجانب الآخر خط شطر.

تحتوي العلبة على 30 قرصاً.

صاحب الامتياز وعنوانه:

أبيك للتسويق م.ض، ص.ب. 8077، نتانيا

المنتاج وعنوانه:

ديسفار إيتريناشونال .V.، هنجلو، هولندا

رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:

150.24.33758

تم إعداد هذه النشرة في كانون الأول 2020 بموجب تعليمات وزارة الصحة. من أجل سهولة وتوهين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.

المقدار الدوائي اليومي يتراوح ما بين 24 إلى 48 ملخ ويوصى بتقسيمه إلى ثلاثة مقدار متساوي بشكل ثابتة. حاول تناول الأقراص في نفس الوقت من كل يوم. لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به.

طريقةتناول

يجب بلع الدواء مع الماء. يفضل تناول الدواء مع الطعام. بالإمكان شطر القرص في خط الشطر. لا تتوفر معلومات حول السحق والمضخ.

إذا تناولت الخطأ مقداراً دوائياً أكبر

إذا تناولت مقداراً دوائياً مفرطاً أو إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء، توجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى، وأخْرِجْ عليه الدواء معاك.

إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المطلوب، فلا يجوز تناول مقداراً دوائياً مضاعفاً. تناول الدواء الناري في الوقت المعاد واستشر الطبيب.

يجب المواظفة على العلاج حسب توصية الطبيب. لا يجوز التوقف عن العلاج بالدواء بدون استشارة الطبيب أو الصيدلي، حتى ولو طرأ تحسن على حالتك الصحية.

لا يجوز تناول أدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.

4) الأعراض الجانبية

كما يكل دواء، إن إستعمال بيتاهيستين تيقع 16 ملخ قد يسبب أعراضًا جانبية لدى بعض المستعملين. لا تذهب من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز أن تعاني أي منها.

يجب التوقف عن إستعمال الدواء والتوجه مباشرة إلى الطبيب إذا ظهرت الأعراض الجانبية التالية:

ردود فعل تحسسية مثل:
• إنفاس في الوجه، الشفتين، اللسان أو العنق، الذي قد يسبب صعوبات في التنفس.

• طفح جدي أحمر أو التهاب وتهيج في الجلد.

أعراض جانبية شائعة (أعراض تظهر لدى 1-10% من مستعملين من بين 100):

غثيان، صعوبات في الهضم، صداع

أعراض جانبية إضافية:
تهيج، طفح، شرى (رد فعل تحسسي للأوعية الدموية في الجلد). إضطرابات معدنة في الجهاز الهضمي مثل تقيؤات، ألم في البطن والشعور بإنتفاخ في البطن.

إن تناول الدواء مع الطعام يساعد على تقليل هذه الأعراض.