

עלון לצריך לפי תקנות הרוקחים (תקנירים)

התשמ"א - 1986

התרופה משוקקת ללא מרשם רפואי

## גופן

### כמוסות רכות,

### עמידות לחומציות הקיבה

החוור הפעיל ומומתו ביחיד מינין:

**Each Gastro-resistant soft capsule contains:**

Peppermint oil 90 mg, Caraway oil 50 mg

כל כמוסה רכה מכילה:

90 מ"ג שמן מנטה, 50 מ"ג שמן קימל

לרישמת חומרים בלתי פעילים ואלרגניים  
בתרופה - ראה סעיף 6.

למיידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה  
- ראה סעיף 2.

קרא בעין את העلون עד סופו בטרם  
תשמש בתרופה.

עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם  
יש לך שאלות נוספת נספנות, פנה אל הרופא או אל  
הרוקח.

עליך ליטול את התרופה גספן על פי ההוראות  
בסעיפים המינוי בעלון זה. היועץ ברוקח אם הנר

זקוק למידע נוספים. עליך לפנות לרופא באמידה  
ותסמנטי המחללה (סינפטומים) מחמירים, אינם  
משתפרים, חזורים ונשנים או במידה ותסמנטי  
המחלה נמשכים מעבר לשבעו ימים ברציפות.

ספר לרופא או לרוקח במידה אתה מרגיש  
השפעת התרופה חזקה או חלה מדי.

## 1. למה מיועדת התרופה?

תרופה מקור צמחי המיועדת למוגדים,  
לטיפול בהפרעות במערכת העיכול, המלוות  
בהתכווצויות קלות, גזים, תחושת נפיחות  
וכאב בטן.

**קבוצה תרפואית:** תרופה צמחית לטיפול  
בהתכווצויות במערכת העיכול.  
התרופה גספן פועלת ע"י הפחתת גזים.

ציפוי התרופה עמיד לחומציות הקיבה ולכך  
אפשרך את שחרור החומרים הפעילים לאחר  
הפעולה הרצוי במעט.

## 2. לפני שימוש בתרופה:

### א אין להשתמש בתרופה:

- אם אתה רגיש (אלרגי) לצמחיים הבאים:  
מנטה (נענע חריפה, Peppermint), קימל  
(Caraway) או צמחים אחרים ממשפחת  
הסוככיים; מתול או כלל אחד מהמריכבים  
הנוספים אשר מכילה התרופה. המרכיבים  
הנוספים מפורטים בסעיף 6.
- אם אתה סובל מגעה בגין חומצת הקיבה  
(אכלה-הידרזה).
- אם אתה סובל מחלת כבד.
- אם אתה מוגבב מחלת כיס המרה, דלקת של  
דרכי המרה, או מחלות אחרות של כיס המרה.

### אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:

**II לפני הטיפול בתרופה גספן, ספר לרופא אם:**  
הפרעות במערכת העיכול עשויו להலות  
למחלות המכzieיות טיפול והשאגה רפואי, יש  
להיוועץ ברופא, במידה ואתה סובל מתס敏ים  
הנושאים מעבר לשבעו ימים ברציפות או  
תס敏ים החזריים ונשנים.

### III ילדים ומתבגרים:

אין להשתמש בתרופה גספן בילדים  
ובמתבגרים מתחת לגיל 18 שנים ולא קיים  
 מידע מספיק בנוגע לשימוש בתרופה בגילאים  
 אלה.

**IV אינטראקציות בין תרופות:**  
אם אתה לוקה או אם לךחת את אורה  
תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם  
ותוספי מזו, ספר על כך לרופא או לרוקח.  
טרם נערכו מחקרים להערכת האינטראקציות  
בין גספן לבין תרופות אחרות.

שימוש בתרופה גספן במקביל לשימוש  
בתרופות אחרות או גספן נוגדי נוגדי נוגצה (תרופות  
המפניות את חומציות הקיבה) עשוי לפגוע  
בציפוי המקנה לתרופה גספן Umidoות מפני  
חומציות הקיבה לרגוטם לך שותוק המכוסה  
יתפרק טרם הגיעו לאזור הפעולה הרצוי.  
לפיכך יש ליטול את התרופה גספן בהפרדה  
ובהפרש של שעיה לפחות מנטיליטם של נוגדי  
חומרה.

יש ליטול את התרופה גספן בהפרדה ובഫרס  
של שעיה עד שלוש שעות מנטיליטם של  
תרופות מקבוצות מעכבי משאבות פרוטוניים  
של רופאות מקבוצות את חומציות הקיבה), זאת במקרה  
(המפחיתות את חומציות הקיבה),  
למנוע פגעה בציפוי המקנה לתרופה גספן  
עמידות מפני חומציות הקיבה.

הגעתו לאטר הפעולה הרצוי. שחרור מוקדם של החומר הפעיל עשוי לגרום לגירוי מקומי בפה וובשטי.

#### אם נטלה בטיעות מינון גבואה יותר:

אין לעבור על המנה היומיית המומלצת בסוגרת המינון המקבול או בהתאם להמלצת הרופא. נטילה בטיעות של כמותה אחת עד שתיים יותר מהמנה המומלצת למנה, אינה גורמת לדדר כל לתופעות לוואי או השלכות שליליות. יחד עם זאת, נטילה של כמות גבוהה יותר עשויה לגרום לתופעות נוספות של מינון יתר (כוגמת: הקאה, כאב בטן, סחרורתת, הפרעות בתפקוד לבבי). במרקחה כזה, יש לפנות לרופא או לחדר מין של בית חולים, גם אם טרם התפתחו תסמינים כלשהם. הנחיה זו חשובה במיוחד בomidah וILD נטלה בטיעות מינון יתר.

במרקחה של נטלה מינון יתר, אין לשותות חלב או משקאות אלכוהוליים, שכן אלה עשויים להגבריר את מעברם של המרכיבים הפעילים למוחזור הדם.

#### אם שכחת ליטול את התרופה בזמן המיעוט, אין ליטול מונה כפולה. קח את המנה הבאה בזמן הרגיל והיוועץ ברופא. יש להתמיד בטיפול כפי שモמלץ על ידי הרופא. גם אם חל שיפור במצב בירואתו, אין להפסיק הטיפול בתרופה ללא תיעישות עם הרופא.

אין ליטול תרופות בחוושן לבדוק את התוויות ומהנה בכל פעע שהינך נטול תרופה. הריבב משקפיים אם הינך זיקוק להם. אם יש לך שאלות נוספת נספנות בוגרנו לשימוש בתרופה, היועץ ברופא או ברוקט.

#### 4. תופעות לוואי:

כמו בכל תרופה, השימוש בסופן עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימות תופעות הלואין, יתכן ולא תסבול מכך. תופעות הלואין המופיעות החל מילודות את כל תופעות הלואין שדווחו במהלך טיפול באמצעות שמן מונה (Peppermint oil) או שמן קימל (Caraway oil), לרבות במרקrams של מינון גבוה ובשימוש ארוך טווח:

**(Very rare):** תופעות לוואי חריגות מאוד (rare): מופיעות בפחות ממשתמש אחד מתוך 10,000: תגובה לא ריגוטית עשויה להופיע. יש להפסיק את השימוש בתרופה ולפנות לרופא בהופעת הסימן הראשון.

**(Rare):** תופעות לוואי שכיחותן אינה ידועה (תופעות שכיחותן טרם נקבעה):חוור נחות במעטפת להבטיח שהחומר הפעיל לא ישחרר טרם

באם אתה נוטל תרופות אחרות המיועדות להפחית חוםיצות הקיבה, יש להකפיד על נטילה מדויקת של התרופה בסופן בהתאם להנחיות המפורטות בסעיף 3.

#### 3. שימוש בתרופה ומזון:

נטילת התרופה בסופן עם האוכל,عشוויה לפגוע ביצפוי המקנה לרופאה בסופן עמידות מפני חוםיצות הקיבה. לפיכך, יש ליטול את התרופה בסופן לפחות 30 דקות לפני הארוחה.

#### 4. הרין והנקה:

אחר ואיל ק"מ מידע מספיק בוגר לשימוש בתרופה במהלך הרין או הנקה, אין להשתמש בתרופה בסופן בשיטש הרות או מניקות.

#### 5. הניגה ושימוש במוכנות:

לא ידוע על השפעה של התרופה בסופן על יכולת הניגה או הפעלת מכונות.

#### 6. מידע חשוב על חלק המרכיבים של התרופה:

התרופה בסופן מכילה 12 מ"ג סורביטול לכל כמותה רכה. על להיוועץ ברופא לפני השימוש בתרופה אם הירק סובל מאירועים מסוימים.

התרופה בסופן מכילה פחות מ- 23 מ"ג נתרן לכל כמותה רכה.

### 3. כיצד תשתמש בתרופה?

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח או אין בטוח בוגר על מינון ולאופן הטיפול בתרופה.

**המינון המקבול בדרך כלל במוגרים מגיל 18 שנים ומעלה הוא:** כמותה אחת פעמיים ביום. מליקוי בתפקיד למינון המדיוק בחולמים הסובלים

אי מידע בוגר בענוג על מנת להקלות. אין לעבור על המנה המומלצת.

**משתגל הטיפול בתרופה:** אין מגלה באשר למשך השימוש בתרופה בסופן. יש להיוועץ ברופא בomidah ווסמיין המחללה נשכים מעבר לשבעו ימים או יותר ונסנים.

**צורת הנטילה:** יש לבלוע את הכמוסה בשלמותה עם כמות מספקת של נוזל שתייה (למשל כוס מים), לפחות 30 דקות לפני הארוחה, בעמידותם בבודק ובצהרים. ניתן ליטול את הכמוסות גם ללא ארוחה.

**כתייה/ חציה/ לעיסה:** אין לחוץ, לחתך או לרטגן את תוכן הכמוסה.

לפני הטילה, יש לוודא כי פין הכמוסה חלקם ללא פגם, אין לטלע את הכמוסה, זאת כדי להבטיח שהחומר הפעיל לא ישחרר טרם

**גודל האריזה:** התרופה גספן מסופקת באריזות קרטון המכילות מגשי פלסטיק ובתוכם 14 כמוסות רכות בכל אחד. קיימות אריזות המכילות 14, 42 או 84 כמוסות. יתכן ולא כל גגלי הארץות משוקקים.

**בעל הרישום ויבואן:** ד"ר סמואלב יבאו, שיוק בע"מ, ח.פ. 512260944, ת.ד. 2486, רעננה 4365007. טלפון: 09-7483769. [info@drsamuelov.co.il](mailto:info@drsamuelov.co.il).

**יצרן:** ד"ר וילמר שוואבה, קרלסרוהה, גרמניה. אושר בנובמבר 2020

**מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:**  
165-98-3618200

שם הפשטות והקלות הكريאה, עלון זה נכתב בלשון צרר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

Gaspan PIL HEB 1120

העיכול (לדוגמה: גיהוקים), עשויים להופיע במטופלים בעלי רגישות קימית למערכת העיכול. אם הופעה תופעת לואו, אם אתה מטופעת הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מטופעת לואו שלא הוזכרה לעילו, עיר להתייעץ עם הרופא.

ניתן לדוח על תופעות לואו באירועים הביריאוטיים באמצעות לחיצה על הקישור "דיוח על תופעות לואו" עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של מ משרד הבריאות ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) המפנה לטופס המקיים לדוח על תופעות לואו, או ע"י כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov>. בנוסף, ניתן לדוח על תופעות לואו לחברת ד"ר סמואלב יבאו ושיוק באמצעות המייל: [drugsafety@drsamuelov.co.il](mailto:drugsafety@drsamuelov.co.il)

## 5. איך לאחסן את התרופה?

מן הרעללה התרופה זו וכל התרופות אחרות יש לשמר במקום סגור מחוץ להישג ידים של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי תמנוע הרעללה אל תגומות להקה לא הרואה מופרשת מהרופה.

אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התופה או הבליטטר. תאריך התופה מתיחס ליום האחרון של אותו חודש.  
**תנאי אחסון:** אין לאחסן בטמפרטורה העולה על 30°C.

## 6. מידע נוסף:

ኖסף על החומר הפעיל, התרופה מכילה גם את החומרים הבאים:

Gelatin, succinylated; medium-chain triglycerides; methacrylic acid ethyl acrylate copolymer (1:1) dispersion 30% - dry substance; glycerol 85%; sorbitol liquid solution 70% (non crystallizing, dry substance); propylene glycol; glycerol monostearate 40-55 (type II); polysorbate 80; iron oxide yellow (E 172); titanium dioxide (E 171); quinoline yellow 70% (E 104); patent blue V 85% (E 131).

**כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:** התרופה גספן נראית ככטיפה אובאלית רכה בעיגול יוק בהירה. הרכמות הרכות ארוזות במגשי פלסטיק ("בליסטרים"), אשר ארוזים בקופסאות קרטון.