



עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו – 1986
התרופה משווקת ללא מרשם רופא

פניסטיל ג'ל

Dimethindene Maleate 0.1% w/w

דימטינדן מליאט 0.1% w/w

*חומרים בלתי פעילים ואלרגניים בתכשיר – ראה סעיף 6

קרא/י בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה.

עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח. עליך להשתמש בתכשיר בצורה הנכונה. היוועץ ברוקח אם הינך זקוק למידע נוסף. עליך לפנות לרופא באם תסמיני המחלה (סימפטומים) מחמירים או אינם משתפרים לאחר 7 ימים.

1. למה מיועדת התרופה?

פריחה, גרד, מחלות עור לא דלקתיות, כוויות, עקיצות חרקים, דלקת עורית על רקע אלרגי ואקזמה. **קבוצה תרופוטית: אנטי היסטמינים**

2. לפני שימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה

- אם אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל דימטינדן מליאט או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה פניסטיל ג'ל, כמפורט בסעיף 6 של העלון.
- כאשר קיימת אלרגיה ידועה לעקיצות חרקים.
- על פצעים פתוחים או מודלקים, דלקות עור עם קרומים ריריים או נוזל על פני השטח, או קרוב לעיניים, במיוחד בילדים ותינוקות.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

- הימנע ממריחה על אזורים נרחבים, במיוחד בילדים קטנים ובתינוקות.
- הימנע מחשיפה ממושכת לשמש של האזורים המטופלים.
- התייעץ עם הרופא במקרה של גרוד משמעותי או נגעים מורחבים.
- התייעץ עם הרופא אם התסמינים ממשיכים מעבר לשבעה ימים.
- פניסטיל ג'ל מכיל פרופילן גליקול ולכן עלול לגרום לגירויים עוריים מקומיים.
- ספר לרופא אם יש לך מחלה אחרת, אם אתה אלרגי, ובמיוחד לתרופות אחרות, אם אתה כבר נוטל או משתמש בתרופות אחרות דרך הפה או במריחה (אפילו בטיפול עצמי!).

אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחורונה, תרופות אחרות, כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.

הריון והנקה

בזמן הריון והנקה, יש למרוח פניסטיל ג'ל בזהירות, ולא למרוח על אזורים נרחבים, צרובים או מודלקים של העור. אין למרוח את הג'ל על הפטמות בזמן ההנקה.

נהיגה ושימוש במכונית

לפניסטיל ג'ל אין השפעה או שיש לו השפעה זניחה על היכולת לנהוג ולהפעיל מכונית.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

פניסטיל ג'ל מכיל פרופילן גליקול ובנזלוקוניום כלוריד ולכן עלול לגרום לגירויים עוריים מקומיים.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח.

המינון המקובל בדרך כלל הוא:

מבוגרים וילדים:

למרוח שכבה דקה 2-4 פעמים ביום על האזור הפגוע ולעסות בעדינות.

אין לעבור על המנה המומלצת.

אין לבלוע. לשימוש חיצוני בלבד.

יש להשתמש בתרופה כפי שמוסבר בעלון או כפי שהורה לך רופאך. אם אתה מרגיש כי השפעת התרופה חלשה מדי או חזקה מדי, ספר לרופא או לרוקח.

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך.

• אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה **בכל פעם** שהינך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הינך זקוק להם.

• אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בפניסטיל ג'ל עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. יתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

תופעות לוואי שכיחות (מופיעות במקרה 1 עד 10 מקרים מכל 1000 מטופלים): יובש בעור או תחושת צריבה.

תופעות לוואי נדירות (מופיעות במקרה 1 עד 10 מקרים מכל 10,000 מטופלים): תגובות עור אלרגיות, כולל פריחה עורית וגרוד.

במקרה זה, הפסק את הטיפול והתייעץ עם הרופא או רוקח.
אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה, או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא הזכרה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא
ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור:
<https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedic@moh.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה?

מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה/תווית. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
אין לאחסן מעל 25°C.

6. מידע נוסף

- נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם Purified Water, Propylene Glycol, Sodium Hydroxide Solution, Carbomer, Disodium edetate, Benzalkonium Chloride
- כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:
ג'ל שקוף עד צהבהב וכמעט חסר ריח.
אריזה: שפופרת אלומיניום סגורה בפקק מפוליאתיילן.
גודל אריזה: 30 גרם ו-100 גרם.
לא כל גודלי האריזות משווקים.
- בעל הרישום וכתובתו: ג'.א.ס.קיי קונסיומר הלת'קר ישראל בע"מ, ת.ד. 3256, פתח תקווה
- שם היצרן וכתובתו: ג'.א.ס.קיי קונסיומר הלת'קר SA, ניון, שוויץ.
- עלון זה נבדק ואושר ע"י משרד הבריאות בתאריך: יוני 2018 (ת.ק. 2.7.2018)
- מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות 133-24-24020
- לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.