

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו - 1986
התרופה משווקת ללא מרשם רופא

כרומו-קומוד טיפות עיניים 2% w/v

חומר פעיל

חומצה כרומוגליצינית (כמלח נתרן) 20 מ"ג/מ"ל
cromoglicic acid (as sodium) 20 mg/ml
לרשימת החומרים הבלתי פעילים, אנא ראה סעיף 6 - "מידע נוסף".

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או הרוקח.
עליך להשתמש בתכשיר על פי ההוראות בסעיף המינון בעלון זה. היוועץ ברוקח אם הינך זקוק למידע נוסף.
עליך לפנות אל הרופא אם תסמיני המחלה (סימפטומים) מחמירים או אינם משתפרים לאחר יומיים.

1. למה מיועדת התרופה?

התרופה מיועדת לטיפול מונע לכל סוגי הדלקות האלרגיות של הלחמית.

קבוצה תרפויטית: החומר הפעיל שייך לקבוצת נוגדי אלרגיה.

2. לפני השימוש בתרופה:

אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל (חומצה כרומוגליצינית) או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה סעיף 6). סימנים של תגובה אלרגית כוללים: פריחה, בעיות בבליעה או בנשימה, התנפחות השפתיים, הפנים, הגרון, הלשון, והחמרה של האודם, הגרד או הנפיחות של העין או העפעף.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

לפני תחילת הטיפול עליך להיות בטוח שהגירוי בעיניך הוא כתוצאה מאלרגיה. אם אינך בטוח בכך, עליך לפנות לרופא לפני תחילת הטיפול.
אין להרכיב עדשות מגע בזמן השימוש ובמשך לפחות 15 דקות לאחר השימוש בתרופה.

אינטראקציות/תגובות בין תרופתיות

אם אתה לוקח או אם לקחת לאחרונה תרופות אחרות, כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח, במיוחד אם אתה לוקח תכשירים אחרים לשימוש בעין.

היריון והנקה:

אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול אם את בהיריון, מתכננת להרות או חושבת שאולי את בהיריון, או אם את מניקה או מתכננת הנקה.

נהיגה ושימוש במכונות:

ייתכן שטטוש ראייה מיד אחרי השימוש בתרופה. במקרה כזה, אין לנהוג או להפעיל מכונות מסוכנות עד התבהרות הראייה.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון או לאופן הטיפול בתכשיר.
המינון המקובל בדרך כלל הוא טיפה אחת בכל עין, 4 פעמים ביום במרווחים קצובים. המינון המקסימלי הוא 8 טיפות ביום.

אין לעבור על המנה המומלצת.

יש להשתמש בטיפות עיניים כרומו-קומוד באופן סדיר כדי להבטיח טיפול אופטימלי בתסמיני הדלקת האלרגית. מומלץ להמשיך בטיפול במשך כל תקופת החשיפה לגורם האלרגיה גם אם לא הופיעו תסמינים. אם לא חל שיפור במצבך או שמצבך הורע יש לפנות לרופא. יש להשתמש בתרופה זו בזמנים קצובים.

אין לבלוע, לשימוש חיצוני בלבד.

אופן השימוש

- א. כדי להימנע מזיהום, אין לאפשר לקצה הבקבוק לגעת במשטח כלשהו (כולל העין עצמה). יש לשמור על הבקבוק סגור היטב.
 - ב. כיצד להשתמש בטיפות:
 1. נער היטב לפני השימוש.
 2. רחץ היטב את ידיך.
 3. הטה את ראשך או שכב על המיטה.
 4. בעזרת האצבע הרחק מעט את העפעף התחתון מהעין. לתוך המרווח שנוצר טפטף 1-2 טיפות בזהירות. הקפד שפיית הבקבוק לא תבוא במגע עם העין.
 5. שחרר את העפעף התחתון ומצמץ מספר פעמים כדי להבטיח פיזור מלא של הנוזל בעין.
 6. הקפד לסגור את מכסה הבקבוק מיד לאחר השימוש.
 7. יש לחזור על התהליך גם בעין השנייה, במידת הצורך.
- אם אתה חושב שהטיפול לא נקלטה השתמש בעוד טיפה. נקה עם מגבון את שארית התמיסה שמסביב לעין.

אם השתמשת ביותר כרומו-קומוד ממה שהיית צריך:

פנה לרופא אם השתמשת בטיפות העיניים בתדירות גבוהה מהמומלץ. אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך.

אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן הקצוב, השתמש בטיפות מיד כשנזכרת. אולם, אם הזמן שנזכרת קרוב לזמן בו יש לקחת את המנה הבאה, דלג על המנה שנשכחה. אין לקחת מנה כפולה כפיצוי על המנה שנשכחה.

אם אתה מפסיק את נטילת התרופה:

גם אם חל שיפור בתסמינים, יש להמשיך להשתמש בטיפות אלה אם אתה נמצא עדיין בסביבת הגורמים שאתה אלרגי אליהם. כרומו-קומוד עלול למנוע תגובה אלרגית, כך שאם תפסיק את הטיפול, סימני האלרגיה עלולים לחזור.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהינך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הינך זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי:

כמו בכל תרופה, השימוש בכרומו-קומוד עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות לוואי. ייתכן שלא תסבול מאף אחת מהן.

יש להפסיק את הטיפול בתרופה ולפנות לרופא בהקדם האפשרי אם העקצוץ, האודם או הנפיחות מחמירים. ייתכן שאתה אלרגי לתכשיר.

יש להיוועץ ברופא או ברוקח אם תופעות הלוואי הבאות מחמירות או נמשכות יותר ממספר ימים או אם אתה מבחין בתופעת לוואי שאינה מצוינת בעלון זה:

- עקצוץ וצריבה בעיניים או טשטוש ראייה. תופעות אלו אמורות להימשך רק למשך זמן קצר ולהופיע מיד לאחר השימוש בטיפות.
- גירוי קל בעין.

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור:

<https://sideeffects.health.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה?

מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל-ידי כך תמנע הרעלה.
אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (Exp. Date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו החודש.
תנאי אחסון: אחסן בטמפרטורה הנמוכה מ-25°C.
לאחר פתיחת הבקבוק לראשונה ניתן להשתמש במשך 12 שבועות.
אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה.

6. מידע נוסף

נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם:

Sorbitol, sodium edetate, water for injection.

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:

10 מ"ל תמיסה צלולה חסרת צבע עד צהבהבה בבקבוקון.

שם היצרן וכתובתו:

Ursapharm Arzneimittel GmbH
Industriestrasse, D-66129 Saarbrücken, Germany.

בעל הרישום וכתובתו:

קיומא בע"מ, רחוב החורש 33, כפר שמריהו 46910.

נערך בינואר 2021 בהתאם להנחיות משרד הבריאות

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 1339031040.

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.