

## 2. قبل استعمال الدواء:

❗ **لا يجوز استعمال الدواء إذا:**

- كانت لديك حساسية (أرجية) للمادة الفعالة أميودارون، لليود أو لأيّ من المركّبات الأخرى التي يحتوي عليها الدواء. تشمل أعراض ردّ الفعل التحسّسيّ: طفحًا جلديًا، صعوبات في البلع أو في التنفّس، انتفاخًا في الشفتين، الوجه أو اللسان.
- كنت تعاني الآن أو عانيت في الماضي من دقات قلبية أبطأ من المعتاد (وهي ظاهرة تسمى "بطء القلب الجيبي") أو مرض يسمى الإحصار "الجيبي الأذيني" في القلب.
- كنت تعاني من اضطرابات أخرى في نظم القلب ولا توجد في جسمك ناظمة قلبية مزروعة.
- كنت تعاني الآن أو عانيت في الماضي من اضطرابات في وظيفة الغدّة الدرقيّة. يجب على طبيبك أن يفحص وظيفة الغدّة الدرقيّة قبل البدء بالعلاج بالدواء.
- كنت تستعمل أدوية أخرى قد تتسبّب اضطرابات النظم (انظر البند "التفاعلات بين الأدوية").
- كنت تستعمل أدوية لعلاج التلوثات (انظر البند "التفاعلات بين الأدوية").
- كنت تستعمل أدوية لعلاج الفصام أو الأمراض النفسية الأخرى (انظر البند "التفاعلات بين الأدوية").
- كنت تستعمل أدوية لتجمي الدم الملاريا (انظر البند "التفاعلات بين الأدوية").
- كنت تستعمل أدوية تتسبب مضادات الهيستامين لعلاج حمى الكلا، الطفح الجلدي أو الأوجيات الأخرى (انظر البند "التفاعلات بين الأدوية").
- كنت تستعمل أدوية لعلاج التهاب الكبد الفيروسيّ C (انظر البند "التفاعلات بين الأدوية").
- كنت حاملًا أو مرضعًا (انظري البند "الحمل، الإرضاع والحصولية").

**نشرة طبيّة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدالفة (مستحضرات) 1986**

**يُستَعمل هذا الدواء بحسب وصفة طبيب فقط**

### أميوكارد أقراص 200 ملغ

يحتوي كلّ قرص على: 200 ملغ أميودارون هيدروكلوريد

Amiodaron Hydrochloride 200 mg

لاطلاع على المواد غير الفعالة ومسيّبات الأرجية في المستحضر - انظر البند 2

"معلومات هامّة عن بعض مركّبات الدواء" والبند 6 "معلومات إضافية".

**اقرأ النشرة بإيمان حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء.** تحتوي هذه النشرة على

معلومات مخصّصة عن الدواء. إذا توفّرت لديك أسئلة إضافية، فراجع الطبيب أو الصيدليّ.

لقد وُصف هذا الدواء لعلاج مرضك. لا تعطه لأخريين. قد يضرّمه الدواء حتّى لو بدا لك أنّ مرضهم مشابه.

هذا الدواء غير مخصّص للأطفال الرضّع والأولاد.

## 1. لأيّ غرض مخصّص هذا الدواء؟

الدّواء مخصّص لعلاج قصور الشرايين التاجيّة واضطرابات نظم القلب

(Arrhythmias) المُقاومة لعلاجات أخرى.

**الفصيلة العلاجيّة:** أدوية مضادّة لاضطراب النظم.

تسيطر آلية عمل الدواء على دقات القلب غير المنتظمة (وهي ظاهرة تسمى

"اضطراب النظم")، يساعد تناول القرص على إعادة دقات القلب إلى الوضع الاعتيادي.



LFL 627 06/21

فقد تحتاج إلى مراقبة إضافية للقلب.

أخبر الطبيب فورًا إذا كنت تستعمل دواء يحتوي على سوفوسوفير لعلاج التهاب الكبد C وكنّت خلال فترة العلاج تشعر بـ:

- دقّات قلبية بطيئة أو غير منتظمة أو اضطرابات في نظم القلب
- ضيق التنفّس أو تفاقم ضيق التنفّس قائم
- الدم في الصدر
- نوار
- ضربات القلب (دقات قلبية قوية)
- أثك على وشك الإغماء أو عند حدوث إغماء

### ❗ حماية الجلد من الشّمس

يجب الامتناع عن التعرض المباشر للشّمس خلال فترة استعمال الدواء وطوال بضعة أشهر بعد الانتهاء من استعمال الدواء، ذلك لأنّ جلدهم سيصبح أكثر حساسية عند التعرض للشّمس وقد يحترق، ويسبب شعورًا بالوخز أو يكوّن حويصلات خطيرة إذا لم تقم بتأثيرها وسائل الحماية التالية: الحرص على استعمال كريم وقاية من الشّمس ذي معامل وقاية مرتفع، وضع القبعة بشكل دائم وارتداء ملابس تغطي الزراعين والرّجلين.

### ❗ الفحوص المنتظمة

سيقوم طبيبك خلال فترة العلاج بهذا الدواء بإجراء فحوص منتظمة لوظائف الكبد لأن أميوكارد قد يؤثر على وظيفة الكبد. إذا حدث تأثير كبدًا، سيقرّر طبيبك ما إذا كان عليك مواصلة استعمال هذه الأقراص.

قد يقوم طبيبك بإجراء فحوص منتظمة لوظيفة الغدّة الدرقيّة خلال فترة استعمال الدواء، لأنّ الدواء يحتوي على اليود مما قد يسبب المشاكل في الغدّة الدرقيّة. من المهمّ أن يقوم طبيبك بإجراء فحوص منتظمة إضافية، مثل: فحوص الدم، تصوير الصدر بالأشعة السينية (رنتجن)، مخطط كهربية القلب (فحص كهربياني لدقات قلبك) وفحوص للعينين قبل استعمال الدواء وخلافه.

**❗ التفاعلات بين الأدوية:**

إذا كنت تستعمل الآن، أو قد استعملت مؤخرًا أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبيب وإضافات غذائيّة، فأخبر الطبيب أو الصيدليّ بذلك.

**خصوصًا يجب إعلام الطبيب أو الصيدليّ إذا كنت تستعمل:**

سوفوسوفير لعلاج التهاب الكبد C.

- أدوية قد تؤدّي إلى إطالة مقطع QT مثل الأدوية لعلاج التلوثات، مثل: كلاريثروميسين، سبيروفلوكساتسين، أوفلوكساتسين أو ليفوفلوكساتسين.
- أدوية تسمى حاجيات البنيّا لعلاج مشاكل القلب، مثل: بروبونولول.
- الأدوية المسماة حاصرات قنوات الكالسيوم لعلاج الذبحة الصدرية (أنجيّنا) أو ضغط الدم المرتفع، مثل: ديلتيازيم أو فيراپاميل.
- أدوية لعلاج (مشاكل عمال، استعمل خلال فترة الحمل غير متّبع.
- أدوية لعلاج المستويات المرتفعة للكوليسترول (ستاتينات)، مثل: سيمفاستاتين أو أتورفاستاتين.

**يجب إعلام الطبيب أو الصيدليّ ولا يجوز تناول أميوكارد بالدمج مع الأدوية التاليّة:**

- أدوية أخرى لعلاج اضطرابات النظم القلبي، مثل: سوتالول، كينيدين، بروكاياميد، ديزوبيramid أو بريثيليوم.
- أدوية لعلاج التلوثات، مثل: إيريثروميسين للإعطاء داخل الوريد، كوتريموكسازول، موكسيفلوكساتسين أو بينثاميدين.
- أدوية لعلاج الفصام، مثل: كلورپرومازين، ثيوريدازين، فلوفلنازين، بيموزيد، هالوبريدول، أميسولپريد أو سير نيندول.
- أدوية لعلاج الأمراض النفسية الأخرى، مثل: ليثيوم، دوكسيبين، ماپروتييلين أو أميتريپتيلين.
- أدوية لعلاج الملاريا، مثل: كينيّن، ميفلوكوين، كلوروكوين أو هالوفانترين.

- أدوية تسمى مضادات الهيستامين لعلاج حمّى الكلا، الطمح الجلدي أو الأوجيات الأخرى، مثل: تيريفينادين، أستيemizول أو ميزولاستين.
- أدوية لعلاج التهاب الكبد C، مثل: سوفوسوفير، داكلاتسفير، سيميپيريفر أو ليديباسفير.

**قد تزيد الأدوية التاليّة من احتمال نشوء أعراض جانبيّة عندما يتّم استعمالها بالدمج مع أميوكارد:**

- أمفوتريسين B (عند إعطائه مباشرةً أو الوريد)، لعلاج التلوث الفطريّ.
- أدوية للالتهاب (كورتيكوستيرويدات)، مثل: هيدروكورتيزون، بيتامتازون أو پردنيزولون.
- أدوية مدّرة للبول.
- أدوية للتخدير الكليّ أو جرة عالية من الأكسجين أثناء العمليّة الجراحيّة.
- تيترازاكتيد، لعلاج المشاكل الهورمونيّة التشخيصيّة.
- قد يزيد أميوكارد من تأثير الأدوية التاليّة:**
- تاكروليموس أو تسيكلوسبورين، لمنع رفض الأعضاء المزروعة.
- أدوية لعلاج الحجز الجنسيّ (العنّة) مثل: سيلدينافيل، تادالافيل أو فارديناफल.
- فيتناتيل، لتسكين الآلام.
- إيچروتامين، لعلاج الصداع النصفيّ (عمليّة جريّنا).
- ميدازولام، لعلاج الطاق أو للتهدئة قبل عمليّة جراحيّة.
- كولخيستين، لعلاج مرض النقرس (جوارت).
- فليكيتاينيد، دواء إضافي لعلاج اضطرابات النظم. يجب على طبيبك مراقبة العلاج وقد يقلّ الجراء هورمونيّة لفليكيتاينيد إلى النصف.
- ليدوكاين، مخدّر موضعيّ.
- وارفارين، لمنع تخنّر الدم.
- ديجوكسين، لعلاج مشاكل القلب.

دايباجتران، لتسريع العلاج.

**❗ استعمال الدواء والطعام:**

لا يجوز استهلاك عصير الجريبفروت خلال فترة العلاج بهذا الدواء. قد يزيد استهلاك عصير الجريبفروت خلال فترة استعمال أميوكارد من احتمال نشوء أعراض جانبيّة لديك.

**❗ استعمال الدواء واستهلاك الكحول:**

يجب الحدّ من شرب الكحول عند استعمال الدواء، لأنّ ذلك قد يزيد من احتمال حدوث مشاكل في الكبد لديك. استشر الطبيب أو الصيدليّ بالنسبة لكمية الكحول التي تستطيع أن تشربها.

**❗ الحمل، الإرضاع والحصولية:**

قبل استعمال الدواء اخبري الطبيب إذا كنت حاملًا، قد تكوين حاملًا، تخططين للحمل أو مرضعًا. تشمل عمال، استعمل خلال فترة الحمل غير متّبع. لا يجوز استعمال الدواء إذا كنت مرضعًا أو تخططين للإرضاع، لأن كميات صغيرة من الدواء قد تنتقل عبر حليب الأم.
**❗ السيفالّة واستعمال الماكناث:**

قد يؤدي استعمال هذا الدواء إلى تشوش الرؤية. إذا شعرت بهذا العرض، فلا يجوز سيقاية السيارة أو تشغيل المعدات أو الماكناث الخطرة.

**❗ معلومات هامّة عن بعض مركّبات الدواء:**

يحتوي الدواء على اللاكتوز. إذا أخبرك طبيبك بأنّ لديك عدم تحمّل لسكّرات معيّنة، فاستشر الطبيب قبل استعمال الدواء. يحتوي كل قرص على 60 ملغ من اللاكتوز.

## 3. كيف تستعمل الدواء؟

يجب استعمال الدواء دومًا بموجب تعليمات الطبيب.

عليك استشارة الطبيب أو الصيدليّ إذا لم تكن متأكدًا من الجرعة الدوائيّة ومن كميّة العلاج بالمستحضر. الجرعة الدوائيّة وكميّة العلاج سيحددهما الطبيب فقط.

**يُمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.**

هذا الدواء غير مخصّص للأطفال الرضّع والأولاد.

**متلقو العلاج المسنّن:** قد يُتخذ قرار بإعطاء جرعة دوائية أقلّ من أميوكارد لتلقي العلاج المسنّن. كذلك، يجب متابعة ضغط الدم وفحوص الغدّة الدرقيّة بشكل دائم عند هؤلاء المتعالجين.

**كميّة تناول:** يجب ابتلاع الدواء مع القليل من الماء، مع وجبة الطعام أو بعدها.

**الهرس /النظر/المنضع**

عند الحاجة يمكن شطر القرص من أجل تسهيل البلع. يمكن الهرس وبلع جميع أجزاء القرص فورًا.

**إذا تناولت خطأ جرعة دوائية أكبر من اللازم** فقد تظهر أعراض مثل: شعور بالدوار، إغماء أو تقيؤ، ارتباك، نبض بطيء، ضرر للكبد أو تقيوات. إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا تمّ ولد ببلع الدواء خطأ، فتوجّه فورًا إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى واحضر معك عبوة الدواء.

**إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المحدّد،** فتناول الجرعة القادمة عند تذكرك. مع ذلك، إذا كان موعد الجرعة القادمة بالتقريب، فتخطّ الجرعة الفائتة. لا يجوز تناول جرعة مضاعفة للتعويض عن جرعة منسيّة.

يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب. حتّى لو طرأ تحسّن على حالتك الصحيّة، فلا يجوز التوقّف عن العلاج بالدواء دون استشارة الطبيب أو الصيدليّ. **إذا توقّفت عن تناول الدواء** فقد تعود اضطرابات النظم القلبيّ. الشيء الذي قد يكون خطيرًا.

لا يجوز تناول الأدوية في العمته! راجع الملصق وتأكّد من الجرعة في كلّ مرّة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبيّة إذا كنت بحاجة إليها.

إذا توفّرت لديك أسئلة إضافية حول استعمال الدواء، فاستشر الطبيب أو الصيدليّ.

## 4. الأعراض الجانبيّة:

مثل كلّ دواء، قد يؤدي استعمال أميوكارد إلى نشوء أعراض جانبيّة عند بعض المستعملين. لا تلتق عند قراة قائمة الأعراض الجانبيّة. قد لا تعاني من أيّ واحد منها.

قد يبيى أميوكارد في جسمك لمدة تصل إلى شهر بعد إيقاف العلاج، وقد لا تزال تعاني من أعراض جانبيّة في هذه الفترة.

**توقّف عن الاستعمال وتوجّه فورًا إلى الطبيب أو إلى المستشفى إذا كنت تعاني من:**

- ردّ فعل تحسّسيّ. قد تشمل الأعراض: طفحًا جلديًا، صعوبات في التنفّس أو في البلع، انتفاخ في الإحجان، الوجه، الشفتين، البلعوم أو اللسان.
- حويصلات أو تقشّر الجلد حول الشفتين، العينين، الفم، الأنف والأعضاء التناسليّة، وأعراض شبيهة بالإنفولنزا وحمّى. قد تشبّر هذه الأعراض إلى حالة تسمى "متلازمة ستيفينس-جونسون".
- طفح جلدي خطير مصحوب بالحويصلات، قد تقشّر فيه طبقات الجلد وتترك الجلد مكتنفا في مناطق كبيرة من الجسم. كذلك قد تشعر بأنك لست على ما يرام، قد تشعر بالحُمى، بالقتعريّة وبعضلات مؤلمة (تقشّر الأسجة الممتوتة البشريوة التسممي - توكسيك إبييديرمال نيكروليزيس).
- التهاب في الجلد يتميّز بحويصلات مليئة بالسائل (bullous dermatitis).
- أعراض شبيهة بالإنفولنزا وطفح جلدي في الوجه يتبعه طفح جلدي موسع مع حمّى مرتفعة، مستويات متزايدة لإنزيمات الكبد تشاهد في فحوص الدم وارتفاع في نوع من كريات الدم البيضاء (كثرة البوزينيات) وغد ليفاوية متضخمة (DRESS).

**أعراض جانبيّة شائعة (common)، أعراض تظهر عند 10-1 مستعملين من بين 100:**

اصفرار الجلد أو العينين (يرقان)، شعور بالتعب، غثان، انعدام الشهية، الآم البطن
عليك مراقبة. قد تكون هذه الأعراض أعراضًا لمشاكل أو ضرر في الكبد، من شأنها أن تكون خطيرة جدًا.

• صعوبة في التنفس أو إحساس بالضغط في الصدر، سعال مزعج، أزيز، فقدان الوزن والحمى. قد تكون هذه الأعراض أعراضاً لالتهاب الرئتين الذي قد يكون خطيراً جداً.

**أعراض جانبية غير شائعة (uncommon) - أعراض تظهر عند 10-1 مستعملين من بين 1.000:**

• تتفاقم عدم الانتظام وعدم الاستقرار في نظم القلب. قد يؤدي هذا الوضع إلى حدوث نوبة قلبية ولذلك يجب التوجه فوراً إلى المستشفى.

**أعراض جانبية نادرة جداً (very rare) - أعراض تظهر عند أقل من مستعمل واحد من بين 10.000:**

• فقدان البصر في إحدى العينين أو أن الرؤية تصبح ضبابية وخالية من الألوان. إحساس بألم أو حساسية في العينين والتآلم عند تحريكهما. قد تكون هذه الأعراض أعراضاً لمرض يسمى "الاعتلال العصبي البصري" أو "التهاب العصب".

• تباطؤ أو توقف دقات القلب. إذا شعرت بهذا العرض، فيجب التوجه فوراً إلى المستشفى.

**أعراض جانبية مدى شيوعتها غير معروف (أعراض لم يتم تحديد مدى شيوعتها بعد):**

• متلازمة شبيهة بالذئبة (مرض يهاجم فيه جهاز المناعة أجزاء مختلفة من الجسم ويسبب الالتهاب والتصلب والانتفاخ في المفاصل ويجعل الجلد أحمر، أحياناً على شكل أوجحة فراشة في الوجه).

**يجب إيقاف الاستعمال والتوجه فوراً إلى الطبيب، إذا كنت تعاني من الأعراض الجانبية الخطيرة التالية - قد تحتاج إلى علاج طبي طارئ:**

**أعراض جانبية غير شائعة (uncommon) - أعراض تظهر عند 10-1 مستعملين من بين 1.000:**

• انعدام الإحساس أو ضعف، وخز أو لذع في أحد أجزاء الجسم.

**أعراض جانبية نادرة جداً (very rare) - أعراض تظهر عند أقل من مستعمل واحد من بين 10.000:**

• طفح جلدي ينجح عن تضيق أو انسداد الأوعية الدموية (يسمى "الالتهاب الوعائي").

• صداع (يأخذ في الاستدادة عادة في ساعات الصباح أو ينشأ بعد السعال أو الجهد)، غثيان، تشنجات، حالات إغماء، مشاكل في الرؤية أو ارتباك. قد تكون هذه الأعراض أعراضاً لمشكلة في الدماغ.

• حركة غير مترنة أو متارحة، كلام (نطق) مشوش أو بطيء.

• شعور بالإغماء، دوام، تعب غير عادي وضيق التنفس. قد تكون هذه الأعراض أعراضاً لنظم قلبي بطيء جداً (خاصة لدى الأشخاص الذين عمرهم أكثر من 65 عاماً) أو لمشاكل أخرى في نظم القلب الطبيعي لديك.

**أعراض جانبية مدى شيوعتها غير معروف (أعراض لم يتم تحديد مدى شيوعتها بعد):**

• الألم في الصدر، ضيق التنفس ونظم قلبي غير منظم. قد تكون هذه الأعراض أعراضاً لحالة تسمى "Torsade de pointes".

• تم التليغ عن حالات معينة من التزيف العموي الرئوي لدى متلقي العلاج الذين استعملوا الدواء. يجب التوجه إلى الطبيب فوراً إذا نشأ سعال دموي.

**يجب التوجه إلى الطبيب بأسرع وقت ممكن إذا كنت تعاني من الأعراض الجانبية التالية:**

**أعراض جانبية شائعة جداً (very common) - أعراض تظهر عند أكثر من مستعمل واحد من بين عشرة:**

• رؤية مشوشة أو رؤية هالة ملونة في الأضواء الماطعة.

**أعراض جانبية شائعة (common) - أعراض تظهر عند 10-1 مستعملين من بين 100:**

• الشعور بعدم الراحة أو الانتفاخ المتطرف، انخفاض الوزن، التعرق المتزايد، عدم تحمّل الحر. قد تكون هذه الأعراض أعراضاً لفرط نشاط الغدة الدرقية (فرط الدرقية).

• شعور بالتعب الشديد، الضعف أو انتهاك القوى، ارتفاع الوزن، عدم تحمّل البرد، إمساك وآلام في العضلات. قد تكون هذه الأعراض أعراضاً لنقص نشاط الغدة الدرقية (فصور الدرقية).

• ارتخاف عند تحريك اليدين أو الرجلين.

• علامات زرقاء أو رمادية على أجزاء الجلد التي كانت معرضة لضوء الشمس، تحديداً في الوجه.

**أعراض جانبية غير شائعة (uncommon) - أعراض تظهر عند 10-1 مستعملين من بين 1.000:**

• نقصانات، تصلب أو تشنجات في العضلات.

**أعراض جانبية نادرة جداً (very rare) - أعراض تظهر عند أقل من مستعمل واحد من بين 10.000:**

• انتفاخ في الخصيتين.

• بقع حمراء مغطاة بالقشرة على الجلد، تساقط الشعر أو تقلّف الأظفار (تسمى "exfoliative dermatitis").

• شعور بالتعب، إغماء، دوام وشحوب الجلد. قد تكون هذه الأعراض أعراضاً لفرط الدم.

• ميل إلى الزفوف أو الجرح بسهولة أكبر. قد تكون هذه الأعراض أعراضاً لمشاكل في الدم (تسمى "قلة الصفائح").

• شعور بالمرض، ارتباك أو ضعف، غثيان، فقدان الشهية، عصبية. قد تكون هذه الأعراض أعراضاً لمرض يسمى "syndrome of inappropriate anti-diuretic hormone secretion (SIADH)".

**أعراض جانبية مدى شيوعتها غير معروف (أعراض لم يتم تحديد مدى شيوعتها بعد):**

• ألم شديد في البطن قد تشعر به حتى ظهره. قد يكون هذا العرض عرضاً لالتهاب البنكرياس.

**يجب التوجه إلى الطبيب أو إلى الصيدلي إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية التالية أو استمر لأكثر من عدة أيام:**

**أعراض جانبية شائعة جداً (very common) - أعراض تظهر عند أكثر من مستعمل واحد من بين عشرة:**

• غثيان أو تقيؤات.

• تغيير في حاسة الذوق.

• تغيرات في كمية إزيمات الكبد عند البدء بالعلاج. يمكن رؤية ذلك في فحوص الدم.

• ميل لحدوث حروق في الجلد عند التعرض للشمس (انظر البند "2 حماية الجلد من الشمس").

**أعراض جانبية شائعة (common) - أعراض تظهر عند 10-1 مستعملين من بين 100:**

• تباطؤ خفيف في نظم القلب.

• كوابيس ليلية، اضطرابات في النوم.

• إمساك.

• طفح جلدي مثير للحكة ومغطى بالقشرة (إيكزيما).

**أعراض جانبية غير شائعة (uncommon) - أعراض تظهر عند 10-1 مستعملين من بين 1.000:**

• جفاف الفم.

**أعراض جانبية نادرة جداً (very rare) - أعراض تظهر عند أقل من مستعمل واحد من بين 10.000:**

• صداع.

• مشاكل في التوازن ودوار (فيرتيجو).

• اضطرابات في تحقيق الانتصاب أو المحافظة عليه أو في القذف المنوي.

• تساقط الشعر، صلح.

• طفح جلدي.

• احمرار الجلد نتيجة للعلاجات بالإشعاع.

**أعراض جانبية مدى شيوعتها غير معروف (أعراض لم يتم تحديد مدى شيوعتها بعد):**

• شرى (طفح جلدي مثير للحكة مع درنات).

• أورام خبيثة، كتل حمراء صغيرة تظهر على الجلد أو داخل الجسم ويتم تمييزها بواسطة التصوير الأشعة السينية.

• تقليل الشعور بالجوع.

• حركات غير خاضعة للسيطرة، تحديداً في اللسان، الفم، الفك، الذراعين والرجلين (باركينسونية).

• إحساس بالأرتباك أو رؤية أو سماع أشياء غير موجودة.

• تورم خبيثة، كتل حمراء صغيرة تظهر على الجلد أو داخل الجسم ويتم تمييزها بواسطة التصوير الأشعة السينية.

**إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية أو إذا عانيت من عرض جانبي لم يُذكر في هذه النشرة، فعليك استشارة الطبيب.**

**التبليغ عن الأعراض الجانبية:**

• بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط <https://www.health.gov.au> والذي يوجه إلى الاستمارة المتصلة للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق الدخول إلى الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.au>

**5. كيف يجب تخزين الدواء؟**

• يمنع التسبم! هذا الدواء، وأني دواء آخر، يجب حفظه في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي الأولاد و/أو الأطفال الرضع ومجال رؤيتهم، وبذلك ستحمي التسبم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

• لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (EXP) المدون على العبوة. يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

• يجب التخزين في درجة حرارة أقل من 25 درجة مئوية. يجب التخزين في العبوة الأصلية للحماية من الضوء.

**6. معلومات إضافية:**

**بالإضافة إلى المركب الفعّال، يحتوي الدواء أيضاً على:**

Lactose, Maize starch, Povidone, Magnesium stearate, Colloidal silicone dioxide.

**كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة:**

• تحتوي العبوة على 3 ليوحات - في كل ليوحة 10 أقراص. كل قرص قطره 10 ملم، صابو الاميتاز/ المصنّع وعنوانه: ك ص ط للصناعات الكيمائية م.رض. هلكيما 3، كريات مألخي، 83057.

• رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة: 052072351700

• تم تحرير هذه النشرة في 06/2021 وفقاً لإرشادات وزارة الصحة.

• من أجل التبسيط ولتسهيل القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكّر. على الرغم من ذلك، فإنّ الدواء مخصّص لكلا الجنسين.