

## **2. לפני השימוש בתרופה:**

**⚠ אין להשתמש בתרופה אם:**

- אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל אמידורון, לידו או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה. תסמינים לתגובה אלרגית כוללים: פריחה, קשיי בליעה או נשימה, נפיחות בשפתיים, בפינים או בלשון.
- היך סובל או סבלת בעבר מפעימות לב איטיות מהרגיל (תופעה הנקראת 'סינסו ברידיקדיה') או מחלה הנקראת חסס 'סינו-פרוזדרי' של הלב.
- היך סובל מהפרעות אחרות בקצב הלב ובגופך **לא** מושתל קוצב לב.
- היך סובל או סבלת בעבר מהפרעות בתפקוד בלוטת התריס. על הרופא שלך לבדוק את תפקוד בלוטת התריס לפני תחילת הטיפול בתרופה.
- היך נוטל תרופות אחרות שעלולות לגרום להפרעות קצב (ראה סעיף "אינטראקציות/תגובות בין תרופתיות").
- היך נוטל תרופות לטיפול בזיהומים (ראה סעיף "אינטראקציות/תגובות בין תרופתיות").
- היך נוטל תרופות לטיפול בהגנת הבאים: הקפדה זו שיימשו בקנה הגנה המשמש עם מקדם הגנה גבוה, חבישה מתמדת של כובע ולבישת בגדים שמסכים את זרועות הידיים והרגליים.
- ⚠ בדיקות מעקב**
- בתקופת הטיפול בתרופה זו הרופא שלך יבצע בדיקות סדירות לתפקודי כבד כיוון שאמינותך עלולה להשפיע על תפקוד הכבד. עלייה כזו מתרחשת, הרופא שלך יחליט אם עליך להמשיך לטיפול בטלית אלן. ייתכן שהרופא שלך יבצע בדיקות סדירות לתפקוד בלוטת התריס בזמן נטילת התרופה, כיוון התרופה מכילה יוד העלול לגרום לבעיות בבלוטת התריס.
- ייתכן שהרופא שלך יבצע בדיקות סדירות נוספות, כגון: בדיקות דם, צילום רנטגן של בית החזה, א.ק.ג (בדיקה חשמלית של פעימות הלב שלך) ובדיקות עיניים לפני ובמהלך נטילת התרופה.
- ⚠ אינטראקציות/תגובות בין תרופתיות:**
- אם אתה לוקח, או אם ילקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי מזוןה, ספר על כך לרופא או לרוקח.**
- במיוחד יש ליידע את הרופא או הרוקח אם אתה לוקח:**
- סופוסובור לטיפול בהפטיטיס C.
- תרופות העלולות להאריך את מקטע ה-QT כגון תרופות לטיפול בזיהומים, כגון: קלריתרומיצין, ציפרופלוקסאצין, אופלוקסאצין או לבופלוקסצין.
- תרופות להגדלת הלביות כגון: ספר על כך לרופא או לרוקח.
- תרופות להפחתת לחץ הדם כגון: דיילטיאזם או ארפאמיל.
- תרופות להצטרות (משלשלים), כגון: ביסקודייל או סנה.
- תרופות לטיפול ברמות גבוהות של כולסטרול (סטטינים), כגון: סימבסטטין או אטורבסטאטין.
- יש ליידע את הרופא או הרוקח **אין לישול** **אמיאוקרד בשילוב עם התרופות הבאות:**
- תרופות אחרות לטיפול בהפרעות קצב הלב, כגון: סוטלול, כינידין,

בנוסף אתה עלול לחוש לא טוב, חום, צמרמורות ושרירים כואבים (טוקסיק אפידרמל קרוליזיס).

- היך נוטל תרופה המכילה סופוסובור לטיפול בהפטיטיס C, מכיוון שהיא עלולה לגרום להאטה מסכנת חיים בקצב פעימות הלב שלך. הרופא שלך עשוי לשקול טיפולים חלופיים. אם יש צורך בטיפול המשלב אמידורון וסופוסובור, ייתכן שתזדקק לניטור נוסף של הלב. ספר לרופא מיד על היות נוטל תרופה המכילה סופוסובור לטיפול בהפטיטיס C ובמהלך הטיפול אתה חש:
  - פעימות לב איטיות או לא סדירות או הפרעות בקצב הלב
  - קוצר נשימה או החמרה בקוצר נשימה קיים
  - כאב בחזה
  - סחרחורת
  - הלמוות לב
  - מעטע העור הפלופא או התעלפות

**⚠ הגנה על העור מפני השמש**

יש להימנע מהשיפה ישירה לשמש בזמן נטילת התרופה ובמשך מספר חודשים לאחר סיום נטילת התרופה. זאת כיוון שעורך היפוך רגיש יותר להשיפה לשמש עלול להישרף, להקצץ או לפתח שלפוחיות חמורות אם לא תנקוט באמצעי ההגנה הבאים: הקפדה זו שיימשו בקנה הגנה המשמש עם מקדם הגנה גבוה, חבישה מתמדת של כובע ולבישת בגדים שמסכים את זרועות הידיים והרגליים.

**⚠ בדיקות מעקב**

בתקופת הטיפול בתרופה זו הרופא שלך יבצע בדיקות סדירות לתפקודי כבד כיוון שאמינותך עלולה להשפיע על תפקוד הכבד. עלייה כזו מתרחשת, הרופא שלך יחליט אם עליך להמשיך לטיפול בטלית אלן. ייתכן שהרופא שלך יבצע בדיקות סדירות לתפקוד בלוטת התריס בזמן נטילת התרופה, כיוון התרופה מכילה יוד העלול לגרום לבעיות בבלוטת התריס.

ייתכן שהרופא שלך יבצע בדיקות סדירות נוספות, כגון: בדיקות דם, צילום רנטגן של בית החזה, א.ק.ג (בדיקה חשמלית של פעימות הלב שלך) ובדיקות עיניים לפני ובמהלך נטילת התרופה.

**⚠ אינטראקציות/תגובות בין תרופתיות:**

**אם אתה לוקח, או אם ילקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי מזוןה, ספר על כך לרופא או לרוקח.**

**במיוחד יש ליידע את הרופא או הרוקח אם אתה לוקח:**

- סופוסובור לטיפול בהפטיטיס C.
- תרופות העלולות להאריך את מקטע ה-QT כגון תרופות לטיפול בזיהומים, כגון: קלריתרומיצין, ציפרופלוקסאצין, אופלוקסאצין או לבופלוקסצין.
- תרופות להגדלת הלביות כגון: ספר על כך לרופא או לרוקח.
- תרופות להפחתת לחץ הדם כגון: דיילטיאזם או ארפאמיל.
- תרופות להצטרות (משלשלים), כגון: ביסקודייל או סנה.
- תרופות לטיפול ברמות גבוהות של כולסטרול (סטטינים), כגון: סימבסטטין או אטורבסטאטין.
- יש ליידע את הרופא או הרוקח **אין לישול** **אמיאוקרד בשילוב עם התרופות הבאות:**
- תרופות אחרות לטיפול בהפרעות קצב הלב, כגון: סוטלול, כינידין,

פרוקאיאמיד, דיזופיראמיד או ברטיליום.

- תרופות לטיפול בזיהומים, כגון: מתן תוך-וריד של אריתרומיצין, קו-טרמוקסאזול, מדיזוקסילוקסאצין או פנטמידין.
- תרופות לטיפול בסכיזופרניה, כגון: כלורפרומאזין, תירידאזין, פלופנאזין, פימוזיד, הלופרידול, אמיסולפריד או סרטינדול.
- תרופות לטיפול במחלות נפש אחרות, כגון: ליתיום, דוקספין, מאפרטילין או אמיטריפילין.
- תרופות לטיפול במלריה, כגון: כינין, מפלוקווין, כלרוקווין או הלופאנטרין.
- תרופות לטיפול בקדחת השחח, בפריחות או באלרגיות אחרות הנקראות אנטיהיטמינים, כגון: טרפנאזין, אסטמיזול או מיזולאסטין.
- תרופות לטיפול בהפטיטיס C, כגון: סופוסובור, דקלטסובר, סימפריב או לדיפסברי.
- הלמוות לב
- מעטע העור הפלופא או התעלפות

**התרופות הבאות עלולות להגדיל את הסיכוי לחוות תופעות לוואי: כאשר ילקחות בשילוב עם אמיאוקרד:**

- אמפותריצין B (כאשר ניתן ישירות לוריד), לטיפול בזיהום פטריתי.
- תרופות לדלקת (קורטיקוסטרואידים), כגון: הידרוקורטיזון, בטאמתאזון או פרדניזולון.
- תרופות משתנות.
- תרופות להרדמה כללית או מנה גבוהה של חמצן במהלך ניתוח.
- טטראקסוקאטיד, לטיפול באבחתי בעימות הרמונאליות.
- אמיאוקרד עלול להגביר את השפעתו של התרופות הבאות:**
- טקורליסום או ציקלופורין, למניעת דחיית שתלים.
- תרופות לטיפול באין אונות כגון: סילדנאפיל, טאדאלאפיל או וארדנאפיל.
- פאנטיל, לטיפול בכאבים.
- ארגוטאמין, לטיפול במיגרנות.
- מידאזולאם, לטיפול בחרדה או להרגעה לפני ניתוח.
- קולכיצין, לטיפול במחלת השגדון (גאوت).
- פלקאיניד, תרופה נוספת לטיפול בהפרעות קצב. על הרופא שלך לקחת אחר הטיפול ויתכן שפחית את מינון הפלקאיניד בחצי.
- לידוקאין, מאלחש מקומי.
- ארפרין, למניעת קרישת דם.
- דיגוקסין, לטיפול בבעיות לב.
- דביגטרן, לדילול דם.

**⚠ שימוש בתרופה ומזון:**

אין לצרוך מין אשכוליות בזמן הטיפול בתרופה זו. צריכת מיץ אשכוליות בזמן נטילת אמיאוקרד יכולה להגביר את הסיכוי שלך לחוות תופעות לוואי.

**⚠ שימוש בתרופה וצריכת אלכוהול:**

יש להגביל שתיית אלכוהול בעת נטילת התרופה, כיוון שזה עלול להגביר את הסיכוי לבעיות כבדד שלך. היועץ ברופא או ברוקח בנוגע למהות ולכמות של אלכוהול שתוכל לשתות.

**⚠ הריון, הנקה ופוריות:**

לפני נטילת התרופה ספרי לרופא אם היך בהריון, עשוייה להיות בהריון, מתכננת הריון או מניקה. התרופה בדרך כלל אינה מקבלת לשימוש במהלך הריון.

**הפסק את השימוש ופנה מיד לרופא או לבית חולים, אם היך סובל מ:**

- תגובה אלרגית. התסמינים יכולים לכלול: פריחה, קשיים בנשימה או בליעה, נפיחות בעפעפיים, בפינים, בשפתיים, בלוע או בלשון.

קטנות של התרופה עלולות לעבור דרך חלב האם.

**⚠ נהיגה ושימוש במכונית:**
השימוש בתרופה זו עלול לגרום לטשטוש ראייה. אם חשת בתופעה זו, אין לנהוג ברכב או להפעיל ציוד או מכונות מסוכנות.

**⚠ מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה:**

התרופה מכילה לקטוז. אם נאמר לך על-ידי הרופא שלך כי יש לך אי סבילות לטקטריל היועץ מרופא, היוועץ ברופא טרם נטילת התרופה. כל טבליה מכילה 60 מ"ג לקטוז.

### 3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש תמיד בהתאם להוראות הרופא.

עליך לבדוק עם הרופא אם הרוקח אם איך בטוח בנוגע למינון ולאופן הטיפול בתכשיר. המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד.

**אין לעבור על המנה המומלצת.**

תרופה זו אינה מיועדת לתינוקות וילדים.

**מטופלים קשישים:** ייתכן שיוחלט על מינון נמוך יותר של **אמיאוקרד** במטופלים קשישים. כמו כן, יש לנקוב אחר לחץ דם ובדיקות בלוטת התריס באופן קבוע במטופלים אלה.

**צורת הנטילה:** יש לבלוע את התרופה עם מעט מים, עם או אחרי הארוחה.

**כתשה/חצייה/לעיסה**

במקרה הצורך ניתן לחצות את הטבליה על מנת להקל על הבליעה. ניתן לכתוש ובלוע מיד את כל חלקי הטבליה.

**אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר** עלולים להופיע תסמינים כמו:

- תחושת סחרחורת, עילפון או יעייפות, בלבול, דופק איטי, נזק לכבד או הקאות. אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא את אריזת התרופה איתך.
- ארגוטאמין, לטיפול במיגרנות.
- מידאזולאם, לטיפול בחרדה או להרגעה לפני ניתוח.
- קולכיצין, לטיפול במחלת השגדון (גאוט).
- פלקאיניד, תרופה נוספת לטיפול בהפרעות קצב. על הרופא שלך לקחת אחר הטיפול ויתכן שפחית את מינון הפלקאיניד בחצי.
- לידוקאין, מאלחש מקומי.
- ארפרין, למניעת קרישת דם.
- דיגוקסין, לטיפול בבעיות לב.
- דביגטרן, לדילול דם.

**⚠ שימוש בתרופה ומזון:**

אין לצרוך מין אשכוליות בזמן הטיפול בתרופה זו. צריכת מיץ אשכוליות בזמן נטילת אמיאוקרד יכולה להגביר את הסיכוי שלך לחוות תופעות לוואי.

**⚠ שימוש בתרופה וצריכת אלכוהול:**

יש להגביל שתיית אלכוהול בעת נטילת התרופה, כיוון שזה עלול להגביר את הסיכוי לבעיות כבדד שלך. היועץ ברופא או ברוקח בנוגע למהות ולכמות של אלכוהול שתוכל לשתות.

**⚠ הריון, הנקה ופוריות:**

לפני נטילת התרופה ספרי לרופא אם היך בהריון, עשוייה להיות בהריון, מתכננת הריון או מניקה. התרופה בדרך כלל אינה מקבלת לשימוש במהלך הריון.

**הפסק את השימוש ופנה מיד לרופא או לבית חולים, אם היך סובל מ:**

- תגובה אלרגית. התסמינים יכולים לכלול: פריחה, קשיים בנשימה או בליעה, נפיחות בעפעפיים, בפינים, בשפתיים, בלוע או בלשון.

- שלפוחיות או קילוף של העור מסביב לשפתיים, לעיניים, לפה, לאף ולאברי המין, תסמינים דמויי שפעת וחום. תופעות אלו יכולות להצביע על מצב שנקרא 'טביבנס-לו'נסון'.

פריחה חמורה המלווה בשלפוחיות שבה שכבות העור עלולות להתקלף ולהשאיר אזורים גדולים בגוף של עור חשוף. בנוסף אתה עלול לחוש לא טוב, חום, צמרמורות ושרירים כואבים (טוקסיק אפיצורטל מקרוליזיס).

- דלקת בעור המאופיינת בשלפוחיות מלאות במזל (bullous dermatitis).
- תסמינים דמויי שפעת ופריחה בפנים ואחריה פריחה נרחבת עם חום גבוה, רמות מוגברות של אנזימי כבד הנאיאם בבדיקות דם ועלייה בסוג של כדורית דם לבנות (אאוזינופיליה) ובלוטות לימפה מוגדלות (DRESS).

**תופעות לוואי שכיחות (common) – תופעות שמופיעות ב-10-15 משתמשים מתוך 100:**

- הצהבת העור או העיניים (צהבת), תחושת יעייפות, בחילה, חוסר תיאבון, כאבי בטן או חום גבוה. תופעות אלו עלולות להיות תסמינים לבעיות או למקל לכבד, שעלולים להיות מסוכנים מאוד.
- קושי בנשימה או תחושת לחץ בחזה, שיעול טורדני, צצצופים, אובדן משקל וחום. תופעות אלו עלולות להיות תסמינים לדלקת ריאות שעלולה להיות מסוכנת מאוד.

**תופעות לוואי שכיחות (common) – תופעות שמופיעות ב-10-15 משתמשים מתוך 100:**

- הצהבת העור או העיניים (צהבת), תחושת יעייפות, בחילה, חוסר תיאבון, כאבי בטן או חום גבוה. תופעות אלו עלולות להיות תסמינים במטופלים קשישים. כמו כן, יש לנקוב אחר לחץ דם ובדיקות בלוטת התריס באופן קבוע במטופלים אלה.

**צורת הנטילה:** יש לבלוע את התרופה עם מעט מים, עם או אחרי הארוחה.

**כתשה/חצייה/לעיסה**

במקרה הצורך ניתן לחצות את הטבליה על מנת להקל על הבליעה. ניתן לכתוש ובלוע מיד את כל חלקי הטבליה.

**אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר** עלולים להופיע תסמינים כמו:

- תחושת סחרחורת, עילפון או יעייפות, בלבול, דופק איטי, נזק לכבד או הקאות. אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא את אריזת התרופה איתך.
- ארגוטאמין, לטיפול במיגרנות.
- מידאזולאם, לטיפול בחרדה או להרגעה לפני ניתוח.
- קולכיצין, לטיפול במחלת השגדון (גאוט).
- פלקאיניד, תרופה נוספת לטיפול בהפרעות קצב. על הרופא שלך לקחת אחר הטיפול ויתכן שפחית את מינון הפלקאיניד בחצי.
- לידוקאין, מאלחש מקומי.
- ארפרין, למניעת קרישת דם.
- דיגוקסין, לטיפול בבעיות לב.
- דביגטרן, לדילול דם.

**⚠ שימוש בתרופה ומזון:**

אין לצרוך מין אשכוליות בזמן הטיפול בתרופה זו. צריכת מיץ אשכוליות בזמן נטילת אמיאוקרד יכולה להגביר את הסיכוי שלך לחוות תופעות לוואי.

**⚠ שימוש בתרופה וצריכת אלכוהול:**

יש להגביל שתיית אלכוהול בעת נטילת התרופה, כיוון שזה עלול להגביר את הסיכוי לבעיות כבדד שלך. היועץ ברופא או ברוקח בנוגע למהות ולכמות של אלכוהול שתוכל לשתות.

**⚠ הריון, הנקה ופוריות:**

לפני נטילת התרופה ספרי לרופא אם היך בהריון, עשוייה להיות בהריון, מתכננת הריון או מניקה. התרופה בדרך כלל אינה מקבלת לשימוש במהלך הריון.

**הפסק את השימוש ופנה מיד לרופא או לבית חולים, אם היך סובל מ:**

- תגובה אלרגית. התסמינים יכולים לכלול: פריחה, קשיים בנשימה או בליעה, נפיחות בעפעפיים, בפינים, בשפתיים, בלוע או בלשון.

שיעול או מאמץ), בחילות, עוויתות, התעלפויות, בעיות בראייה או בלבול. תופעות אלו עלולות להיות תסמינים לבעיה במוח.

- תופעה לא יציבה או מתנדנדת, דיבור משובש או איטי.
- תחושת עילפון, סחרחורת, יעייפות בלתי רגילה וקוצר נשימה.
- תופעות אלו עלולות להיות תסמינים לקצב לב איטי מאוד (במיוחד אצל אנשים מעל גיל 65) או ידועה אחרות בקצב הלב הטבעי שלך.

**תופעות לוואי שכיחות (common) – תופעות שכיחות טרם נקבעה):**

- כאבים בחזה, קוצר נשימה וקצב לב לא סדיר. תופעות אלו עלולות להיות תסמינים של מצב שנקרא 'Torsade de pointes'.
- מקרים מסוימים של דימום ריאתי דווחו במטופלים שנטלו את התרופה.

יש לפנות לרופא מיד אם מופיע שיעול דמי.

**יש לפנות לרופא בהקדם האפשרי אם היך סובל מתופעות הלוואי הבאות:**

**תופעות לוואי שכיחות (common) – תופעות שמופיעות ב-10-15 משתמשים מתוך 100:**

- הצהבת העור או העיניים (צהבת), תחושת יעייפות, בחילה, חוסר תיאבון, כאבי בטן או חום גבוה. תופעות אלו עלולות להיות תסמינים במטופלים קשישים. כמו כן, יש לנקוב אחר לחץ דם ובדיקות בלוטת התריס באופן קבוע במטופלים אלה.

**צורת הנטילה:** יש לבלוע את התרופה עם מעט מים, עם או אחרי הארוחה.

**כתשה/חצייה/לעיסה**

במקרה הצורך ניתן לחצות את הטבליה על מנת להקל על הבליעה. ניתן לכתוש ובלוע מיד את כל חלקי הטבליה.

**אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר** עלולים להופיע תסמינים כמו:

- תחושת סחרחורת, עילפון או יעייפות, בלבול, דופק איטי, נזק לכבד או הקאות. אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא את אריזת התרופה איתך.
- ארגוטאמין, לטיפול במיגרנות.
- מידאזולאם, לטיפול בחרדה או להרגעה לפני ניתוח.
- קולכיצין, לטיפול במחלת השגדון (גאוט).
- פלקאיניד, תרופה נוספת לטיפול בהפרעות קצב. על הרופא שלך לקחת אחר הטיפול ויתכן שפחית את מינון הפלקאיניד בחצי.
- לידוקאין, מאלחש מקומי.
- ארפרין, למניעת קרישת דם.
- דיגוקסין, לטיפול בבעיות לב.
- דביגטרן, לדילול דם.

**⚠ שימוש בתרופה ומזון:**

אין לצרוך מין אשכוליות בזמן הטיפול בתרופה זו. צריכת מיץ אשכוליות בזמן נטילת אמיאוקרד יכולה להגביר את הסיכוי שלך לחוות תופעות לוואי.

- תסמונת דמויי צהבת (מחלה בה מערכת החיסון תוקפת חלקים שונים ומובילה לכאב, נוקשות ונפיחות במפרקים ולעור אדום, לעיתים בצורת נכפי פרפר בפנים).
- ליתיום בצורת נכפי פרפר בפנים).

**יש להפסיק את השימוש ולפנות מיד לרופא, אם היך סובל מתופעות הלוואי החמורות הבאות – אתה עלול להזדקק לטיפול רפואי דחוף:**

**⚠ תופעות לוואי שאינן שכיחות (uncommon) – תופעות שמופיעות ב-10-15 משתמשים מתוך 1,000:**

- חוסר תחושה או חולשה, קצוצים או צריבה באחד מחלקי הגוף.
- אמיאוקרד עלול להישאר בגופך עד לחודש לאחר הפסקת הטיפול, אתה עלול עדיין לסבול מתופעות לוואי בתקופה זו.

**⚠ תופעות לוואי נדירות מאוד (very rare) – תופעות שמופיעות בכחות משתמש אחד מתוך 10,000:**

- פריחה בעור הנגרמת על ידי היצרות או חסימת כלי דם (מקראת 'וסקוליטיס').
- כאב בטן עד העשוי להיות מורגש עד לגבך. תופעה זו עלולה להיות תסמיני לדלקת הלבלב.

יש לפנות לרופא או לרוקח אם אחת מתופעות הלוואי הבאות מחמירה או משכת מעבר למספר ימים:

**תופעות לוואי שכיחות מאוד (very common) – תופעות שמופיעות ביותר ממשמש אחד מתוך עשרה:**

- בחילות או הקאות.
- שינוי בחוש הטעם.
- שינויים בכמות אנזימי הכבד בתחילת הטיפול. ניתן לראות זאת בבדיקות דם.

נטייה לכוויות בעור בחשיפה לשמש (ראה סעיף 2 "הגנה על העור מפני השמש").

**תופעות לוואי שכיחות (common) – תופעות שמופיעות ב-10-15 משתמשים מתוך 100:**

- האטה קלה בקצב הלב.
- סינטי לילה, הפרעות שינה.
- עצירות.
- פריחה מוגדרת ומכוסה בקשקשים (אקזמה).

**תופעות לוואי שאינן שכיחות (uncommon) – תופעות שמופיעות ב-10-15 משתמשים מתוך 1,000:**

- האטה קלה בקצב הלב.
- סינטי לילה, הפרעות שינה.
- עצירות.
- פריחה מוגדרת ומכוסה בקשקשים (אקזמה).

**תופעות לוואי שכיחות (common) – תופעות שמופיעות ב-10-15 משתמשים מתוך 1,000:**

**תופעות לוואי נדירות מאוד (very rare) – תופעות שמופיעות בכחות משתמש אחד מתוך 10,000:**

- כאב ראש.
- בעיות בשוני משקל וסחרחורת (ורטיגו).
- הפרעות בהשגת או בשמירת זקפה או בפליטת זרע.
- נשירת שיער, התקררות.
- פריחה בעור.
- אדמומיות בעור כתוצאה מטיפול הקרנות.

**תופעות לוואי ששכיחות אינה ידועה (תופעות ששכיחות טרם נקבעה):**

- חרלת/סרפדת (פריחה מוגדרת עם גבשושיות).
- גרנולומות, גושים אדומים קטנים המופיעים על העור או בתוך הגוף אשר ניתן לזהותם ביצילום רנטגן.
- הפתחה בתחושת הרעב.
- תנועות בלתי נשלטות, בעיקר של הלשון, הפה, הלסת, זרועות הידיים והרגליים (פרקיניסידים).

- תחושת בלבול או ראייה או שמיעה של דברים שאינם קיימים.
- עיוות בחוש הריח (פרוסמה).
- תחושת יעייפות, עילפון, סחרחורות ועור חיור. תופעות אלו עלולות להיות תסמינים של אנמיה.

נטייה לדמם או להיפצע ביתר קלות. תופעות אלו עלולות להיות תסמינים של בעיות בדם (מקראת 'טרומבוציטופניה').

תחושת חולי, בלבול או חולשה, בחילה, אובדן תיאבון, עצבנות. תחושת אלו עלולות להיות תסמינים של מחלה הנקראת 'exfoliative syndrome of inapropriate anti-diuretic hormone secretion'.

**תופעות לוואי שכיחות (common) – תופעות שמופיעות בכחות משתמש אחד מתוך 10,000:**

- פריחה בעור הנגרמת על ידי היצרות או חסימת כלי דם (מקראת 'וסקוליטיס').
- כאב בטן עד העשוי להיות מורגש עד לגבך. תופעה זו עלולה להיות תסמיני לדלקת הלבלב.

## 5. אין לאחסן את התרופה?