

أقرت صيغة هذه النشرة من قبل وزارة الصحة وتم فحص محتواها والمصادقة عليه في 1.2016

درونثال بلوس بمذاق، بيطري
أقراص

Drontal plus Flavoured veterinary Tablets

للاستعمال البيطري فقط
ملزم بوصفة طبيب بيطري

التركيب:
كل قرص يحتوي على:
مركبات فعالة:

| | |
|-------------------|--------|
| Praziquantel | 50 mg |
| Pyrantel Embonate | 144 mg |
| Febantel | 150 mg |

مركبات غير فعالة: الرجاء الاطلاع على فصل "مركبات غير فعالة" لاحقاً في النشرة

الفئة العلاجية: مضاد للديدان

الفعالية الطبية:

أقراص بمذاق لعلاج الديدان المسطحة والمدورة في الكلاب
يشمل أنواع الديدان التالية:

| | |
|------------|--|
| Ascarid: | Toxocara canis, Toxascaris leonine (adult and late immature forms) |
| Hookworms: | Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum (adults) |
| Whipworms: | Trichuris vulpis (adults) |
| Tapeworms: | Echinococcus species, Taenia species, Dipylidium species (adult and immature forms). |

الجرعة والتقديم:

حسب تعليمات الطبيب البيطري.
قرص واحد لكل 10 كغم وزن جسم.
تقدم الأقراص مباشرة، أو توضع في الطعام. لا حاجة للصوم قبل أو بعد العلاج.

الجراء والكلاب الصغيرة:

3 - 5 كغم وزن جسم = ½ قرص
فوق 5 كغم - 10 كغم وزن جسم = 1 قرص

كلاب بحجم متوسط:

فوق 10 كغم - 15 كغم وزن جسم = 1 ½ أقراص
فوق 15 كغم - 20 كغم وزن جسم = 2 أقراص
فوق 20 كغم - 25 كغم وزن جسم = 2 ½ أقراص
فوق 25 كغم - 30 كغم وزن جسم = 3 أقراص

كلاب بحجم كبير:
فوق 30 كغم – 35 كغم وزن جسم = ½ 3 أقراص
فوق 35 كغم – 40 كغم وزن جسم = 4 أقراص

عند العلاج ب-Toxocara، سوف تعالج الكلاب المرضعة بعد أسبوعين من الإنجاب، ومن ثم كل أسبوعين حتى فطام الجراء، يجب البدء بعلاج الجراء بجيل أسبوعين، من ثم كل أسبوعين حتى جيل 12 أسبوع. بعد ذلك يجب العلاج كل 3 أشهر. يوصى بمعالجة الجراء والأم في نفس الوقت. في الكلاب البالغة يجب إعطاء العلاج كل 3 أشهر. في حال الإصابة الشديدة بالديدان المدورة، يجب إعطاء علاج متكرر بعد أسبوعين.

موانع الاستعمال والتحذيرات:

لا يجوز الاستعمال في الكلاب التي تزن أقل من 3 كغم.
لا يجوز التقديم بجرعة تزيد عن الجرعة الموصى بها، خاصة في علاج الكلاب الحوامل.
لا يجوز الاستعمال بشكل متزامن مع مستحضرات تحتوي Piperazine.
استشر البيطري قبل العلاج بكلبات حوامل ضد ديدان مدورة.
لمنع انتقال العدوى بشكل متكرر في حال ديدان مسطحة، يجب الحرص على المكافحة بشكل ملائم لعوامل ناقلة للعدوى مثل البراغيث، الفئران والخب.
يجب غسل اليدين جيداً بعد تقديم العلاج.

يمكن التبليغ عن أعراض جانبية لشركة ليدور للمواد الكيماوية على عنوان البريد الإلكتروني:

lidorvet@lidorr.com

أو لوزارة الصحة من خلال الضغط على الرابط "التبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود في موقع المنزل التابع لوزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجه للنموذج الانترنتي للتبليغ عن الأعراض الجانبية،

أو من خلال دخول الرابط :

[/https://sideeffects.health.gov.il](https://sideeffects.health.gov.il)

التخزين:

بدرجة حرارة الغرفة، دون 25 درجة مئوية، بعيداً عن الطعام ومتناول يد الأطفال.
لا يجوز استعمال المستحضر بعد انتهاء تاريخ صلاحيته.

مركبات غير فعالة:

Maize starch, Lactose monohydrate, Microcrystalline cellulose, Povidone, Magnesium stearate, Sodium lauryl sulphate, Colloidal anhydrous silica, Artificial beef flavor
irrad

كل مستحضر بيطري طبي لم يتم استعماله أو أي مادة متبقية تم الحصول عليها من استعمال منتج بيطري طبي يجب أن يتم التخلص منها كنفائيات سامة، ولا يجوز رميها في المجاري.

رقم تسجيل الدواء: 081 95 92122 00

المنتج: Bayer Animal Health, D-51368 Leverkusen, ألمانيا.
المستورد وصاحب التسجيل: ليدور المنتس م.ض شارع هنفيثيم، المنطقة الصناعية مورشا، رمات هشارون.