

אף טיפה – תרסיס מודוד לאף 0.5 מ"ג/מ"ל

החוורם הפעיל וריכוזו: אוקסימטוזמין הידרוchloride (Oxymetazoline hydrochloride) 0.05% (בrixich).

חומרים בלתי פעילים וארגנים: ראה "מידע חשוב על חלק ממרכיבי התרופה" וסעיף 6.

קרא בעין את העולן עד סופו בוטם ושתמש בתרופה. עלון זה מכיל מינרל מג'ני על הרופה. אם יש לך שאלות ונוסחות, פנו לא הרופא או אל הרוקה.

עלך להשתמש בכתשר על פי ההוראות בסעיפים המופיעים בעולן זה. היונץ ברוקח אם הנר זוקם בלבד לעזענות. עלייך לנמנת לרופא אם התסמים (ימיטופטים) מחמירים או אין מושפעים לאחר 3 ימים.

1. מהו מיצעת התרופה?

הקללה ומינית שוגש באף, כתוצאה מהצננות, סינוסיטיס, קדחת השחת או אלרגיות אחרות של רדרי הנשימה הבלתי.

קבוצה תרופיטית: סימפטומיטיים.

2. לפני שימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (אהה סעיף 6).

- אין להשתמש בתרופה זו בו זמן עם נטילת תרופות מקבוצת מעכביmonoamine-אוקסידי (MAOI) – לטיפול במלת פרכינסון ודיכאון), או במשך 14 ימים לאחר סיום הטיפול בהן. תרופות מקבוצת זאת כרוכה חריפה צרפת זווית (לחץ עיני גבורה).

- אתה סובל מגלאוקום חריפה צרפת זווית (לחץ עיני גבורה).

- עברת כירrhoה של הרופואה או רירית מודולרים של האף.

- אתה סובל מחלת לב קילילית חריפה או אי ספיקת לב שמאלית המתבטאת בסימני קדחת (אסתמה).

פני הטיפול בתרופה בוועץ ברופא אם אתה סובל או סבל בעבר:

• מליוקיר בעורקם הכליליים

• מיתר לחץ דם

• פעילות יתר של בלוטת התיריס (תירואיד)

• מסוכן

• מקורי בהטלת שחן עקב הגדלת בלוטת הערמוני

אזורות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:

• שימוש מוחשי עלול לגרום לדוחש באף. לא מומלץ להשתמש במשך יותר משבוע. פנה לרופא אם הסימפטומיטיים חממים או לא מושפעים לאחר 3 ימים.

ילדים ומוגברים

תרופה זו אינה מיועדת בדרך כלל לתינוקות ולילדים מתחת לגיל 6 שנים.

אינטרקציות/תגובה בין תרופות:

אם אתה לורק, או אם לך רקת לאரוקה. במיוחד יש לעיזץ את הרופא או הרוקח אם אתה לורק: תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. במקרה שאין לך דרך שוריה ביחס ייחודי:

ההשפעה של אוקסימטוזמין על ההוראה מושפעת מכך. נוגדי דיאנקטריציקליים, מאפרוטילין, או מעכבי monoamine-אוקסידי (MAOI) או במשך 14 ימים לאחר סיום הטיפול בהן.

הרירון, הנקה ופורות

אוקסימטוזמין אל נקשר לשפעה שלילית על ההרירון. ניתן להשתמש בשיטות הרות אם משתמשים עלי ההוראה. יש לבקש בזורהת במטפלות עם יתר לחץ דם או סינרנס של דרמת דם מופחתת לשילה. שימוש תכוף או ממושך במינונים גבוהים עשוי להפחית את זורמת הדם לשילה.

הנקה

לא מדובר אוקסימטוזמין מופרש להלב אם. לאו המסתור בנתונים על השימוש באוקסימטוזמין

פוריוט

אין מידי על השפעת התרופה על פוריוט בנשים או בגברים.

גיגיה ושימוש במכוון

לא נקבעה כל השפעה על יכולת הנהיגה או השימוש במכוון.

הזרע חותם על חלק ממרכיבי התרופה

התרופה מכילה 0.059 מ"ג אל נזלקרים כלויד לכלי מנת התזה בודדת, כמות שהיא שווה ערך ל- 0.54- מ"ג בazelklorים כלויד לכלי 1 מ"ל.

בנצלקרים כלויד (חומר משמר) עלול לגרום לגירוי או נפיחות בחור האף, במיוחד בשימוש לאחר רגנון.

התרופה מכילה 0.272 מ"ג בנזיל אלכלול לכלי מנת התזה בודדת, שווה ערך ל- 2.47- מ"ג בנזיל אלכלול בכלי 1 מ"ל.

בניל אלכלול עלול לגרום לתגובה אלרגית.

3. כיצד משתמש בתרופה?

עלך לבצע בכתשר על גונג למינון ואופן הטיפול בתקציר.

אין להשתמש בכתשר עם מעלת 3- מ"ג רצפים אלא אם רשם על-ידי הרופא.

עלך לנמנת אל הרופא בסימני המחלת (סימפטומיטים) מחמורים או אין מושפעים לאחר 3 ימים רצפים.

המינון המופיעים כריסטלים כל הוה: 2-3 ריסוטים בכל חור פערמיים ביום, בבוקר ובערב. הכתשר פועל עד 12 שעות.

אין לעורר על המנה המומצת.

יש לנער את היטב לפני השימוש.

אופן השימוש:

• ישך את האף מכחה הפלסטיק והוחזק 2 התוצאות באוויר לפני השימוש הראשון.

• קחנה בabweב את החיר השגען, רסס את התרופה אל תוך כל אחד מהנוגדים (תוך כדי כך שLASTOMIN נטהם בabweב את החיר השגען) בוגוף הבב: שאף מסר שאיפות קרותה תוך כדי חיציות מהירות ובקותם על הקובוק. המנת 3-5 דקות. קונה שבת האף בעיניות

וחזור על הפעול במדידת חור הקובוק. נגב

שושף את פיטת הרוסט בעירתם חמם, אך הקפד שלא ייכנס מים אל תוך הקובוק. נגב

בעירתם מפתן נירך והוא יטב. בצד להימנע מהחיר הרווחם, המונע נטול תרופה ליתר ממדים אחד.

עלך להשתמש בתרופה בצורה נרוכת. היונץ ברוקח אם אתה זוקם למידע נוסף.

אין לבולו. לשימוש חיטוי בלבד.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בתרופהอาจ לגרום לתופעות לוואי בחילוק מהמשתמשים. אל תיבהל

למקרה רשותת תופעות לוואי. יתכן ולא סובל מכך מהתוויות המופיעות ב-1-10 משתמשים מתור:

1,000: התעטשות, יובש או גירוי באף, פה או גורן, גודש באף (אף סתום).

10,000: תופעות לוואי נדירות (rare) תופעות שטוףיעות ב-1-10 משתמשים מתור: חרדה, עייפות, עצבנות, הפרעות שינה בידידים, פיעמות לב מהירין, חיקות או לא דירות (פלפיטציות), עלייה לחץ דם, נפיחות בדופן האף, כאבראש, בחילה, הסמקה, פריחה, הפרעות בריאות.

אם יש לך שאלות נוספת לגבי תופעות לוואי, אם אתה מטופע הלוואי מחמיר, או כאשר אתה סובל מטופענות לוואי שאינו שגרתי, יזמין לארון תרופות הלואוי מחמיר, או כראותך תופענות נוספת.

דיזוח על תופעות לוואי:

ניתן לזרום על תופעות לוואי למשדר הבריאות באמצעות "דייזוח על התופעה" (www.health.gov.il) לזרום עוקב טיפול הרווחת" שנפצעה בדף הבית של אחר מושד הבריאות (<http://sideeffects.health.gov.il>) המפנה לטופס המופיע לדייזוח על תופעות לוואי, או על-ידי כניסה לקישור:

בנוסף, ניתן לדוחה לחברת פריגו באמצעות התוויות המופיעות ב-www.perrigo-pharma.co.il

5. איך לאחסן את התרופה?

• מנע העטלה המבוקשת זו וכיל התרופה הפעיל מכילה גם:

ריאתומים של ילדים ו/או תינוקות ועל-ידי תינוקות ואלה-ידי תינוקות מהרפה.

• אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התופה (exp. date) המופיע על גביה הארייה. תאריך מופחתת של תרופה. שימוש תכוף או מושך במינונים גבוהים עשוי להפחית את זורמת הדם לשילה.

• נזון להשתמש בתרופה עד תאריך התופה גם לאחר פתייתה.

• יש לאחסן מתחת ל- 25°C.

6. מידע נוסף

• נזון על החומר הפעיל התרופה מכילה גם:

Purified water, polyethylene glycol, povidone, carboxymethylcellulose sodium, microcrystalline cellulose, monobasic sodium phosphate, benzyl alcohol, dibasic sodium phosphate, benzalkonium chloride, edetate disodium.

• כדי נראית התרופה ומה תוקן האריזה: בקובוק פלסטיק 30 מ"ל עם מסר לשימוש רב פעמי.

• בעל הרשות: פריגו ישראל סוכנות בע"מ, רחוב רפקט 1, שוהם.

• שם היצרן: חברת פריגו, אלגן, אר"ב.

• נזון בפברואר 2021 בהתחם מהרשות משרד הבריאות.

• מס' רשות התרופה בפקוס התרופות הממלכתי משרד הבריאות: 13133.31012.

שם הפצתו ולקחת הקיראה, על זה נשזה בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לשני המינים.