

מאי 2021

רופא /ה, רוקח/ת נכבד/ה

**זודורם 10 טבליות מצופות - Zodorm 10 coated tablets - לפי אתר משרד הבריאות**  
(Zolpidem tartrate 10 MG)

**עדכונים בעלון לצרכן**

ברצוננו להודיע שהעלון לצרכן עודכן. בפירוט שלהלן כלולים העדכונים העיקריים. שאר השינויים שנעשו בעלון הינם שינויים בפורמט העלון ושינויי נוסח, ואינם מפורטים מטה. תוספות המידע מודגשות **בצהוב**.

**עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו – 1986**  
**התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד**

**זודורם 10**

טבליות

חומר פעיל וכמותו:

כל טבליה של זודורם 10 מכילה: זולפידם טרטרט 10 מ"ג Zolpidem Tartrate 10 mg

חומרים בלתי פעילים ואלרגניים בתכשיר – ראה סעיף 2 "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" וסעיף 6 "מידע נוסף".

**קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה.**

שמור על עלון זה, ייתכן ותצטרך לקרוא בו שוב. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

תרופה זו נרשמה לטיפול עבורך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

תרופה זו אינה מיועדת לילדים ומתבגרים מתחת לגיל 18.

**1. למה מיועדת התרופה?**

לטיפול בחוסר שינה.

**קבוצה תרפויטית:** חומרים היפנוטים ומרגיעים

**2. לפני השימוש בתרופה:**

**אין להשתמש בתרופה אם:**

- חווית אי פעם התנהגות לא מודעת במהלך השינה (כגון נהיגה במכונית, הכנת ואכילת מזון, דיבור בטלפון או קיום יחסי מין בזמן שאינך ער לחלוטין) אחרי נטילת סטילנוקס.
- הנך רגיש לחומר הפעיל (זולפידם) או לאחד ממרכיבי התרופה האחרים (ראה סעיף 6).

- אם סבלת בעבר מתגובה אלרגית לתרופות המכילות זולפידם. תסמינים של תגובה אלרגית חמורה לזולפידם יכולים לכלול: התנפחות הפנים, השפתיים, הגרון, שעלולה לגרום לקושי בנשימה ובבליעה.
- הנך סובל מאי ספיקת כבד חמורה.
- שתית אלכוהול בערב או לפני שינה.
- נטלת תרופה אחרת המיועדת לעזור לך בהירדמות.
- אין באפשרותך לישון שנת לילה מלאה אחרי נטילת התרופה (7-8 שעות) לפני שעליך להיות פעיל שוב.

#### אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:

- אין ליטול יותר **זודורם** ממה שנרשם לך על ידי הרופא.
- יש ליטול סטילנוקס מיד לפני השינה, לא מוקדם יותר.
- אין להשתמש בתרופה יותר מארבעה שבועות ברציפות! שימוש ממושך עלול לגרום לתלות.
- אם השפעת התרופה פחתה בעקבות שימוש חוזר, אין להגדיל את המינון.
- בדומה לתכשירים אחרים לשינה, הפסקת טיפול בלתי מבוקרת עלולה להיות מלווה לעתים נדירות בתופעות גמילה, כגון: התכווצות שרירים, רעד, חזרת נדודי שינה, כאבי בטן, הקאות, בחילות, זיעה, פרכוסים.
- **זודורם עלול לגרום לתופעות לוואי חמורות הכוללות:**
  - התנהגויות לא מודעות במהלך השינה, שגרמו לפגיעה חמורה ומוות. אחרי נטילת **זודורם**, אתה עלול לקום מהמיטה כאשר אינך ער לחלוטין ולעסוק בפעילות שאינך יודע שאתה עושה (התנהגויות לא מודעות במהלך השינה). למחרת בבוקר אתה עלול שלא לזכור שעשית משהו בלילה. פעולות אלו יכולות להתרחש עם **זודורם** בין אם אתה שותה או לא שותה אלכוהול או לוקח תרופות אחרות שגורמות לך להיות ישנוני.
  - לאחר נטילת זודורם הנך עלול לקום מהמיטה כשאינך ער לחלוטין ולבצע פעולות שאינך מודע לביצוען **בבוקר**. סבירות גבוהה יותר לביצוע פעולות אלה אם הנך שותה אלכוהול או נוטל תרופות אחרות שגורמות לך להיות ישנוני יחד עם **זודורם**.
- פעולות שדווחו כוללות:
  - נהיגה במכונית ("נהיגה בשינה")
  - הכנת ואכילת מזון
  - דיבור בטלפון
  - קיום יחסי מין
  - הליכה מתוך שינה.
- יש להפסיק ליטול סטילנוקס ולפנות מיד לרופא שלך אם גילית שביצעת פעולה כלשהי מהפעולות המתוארות מעלה לאחר שנטלת **זודורם**.
- שמור על **זודורם** במקום בטוח על מנת למנוע שימוש לא נכון או שימוש לרעה. ספר לרופא אם בעברך השתמשת לרעה או פיתחת תלות באלכוהול, תרופות מרשם או סמים.
- אם התפתחה תגובה אלרגית חריפה לתרופה המתבטאת כאנגיואדמה (בצקת בלשון, בצקת בגלוטיס [פתיח הקנה], בצקת בלרינקס [בית הקול]), אין להשתמש שנית בתרופה זו.
- בקשישים - יש להשתמש בזהירות בבנזודיאזפינים ובתרופות דומות, כיוון שקיים סיכון לישנוניות ו/או ריפיון שרירים שעשויים להוביל לנפילות, לעיתים קרובות עם השלכות רציניות באוכלוסייה זו.
- רצוי מינון מופחת (5 מ"ג) בקשישים, בנשים ובמטופלים עם בעיות בתפקוד הכבד, ראה סעיף 3.
- שימוש ב**זודורם** יחד עם תרופות אחרות בעלות השפעה מרגיעה (כגון, תרופות ממשפחת הבנזודיאזפינים, אופיואידים, נוגדי דיכאון מסוימים, אלכוהול) מגביר את הסיכון לדיכוי מערכת העצבים המרכזית. אם

**זודורם** נלקח יחד עם תרופות אלה, על הרופא המטפל לשקול התאמת מינון של התרופות. אין ליטול זודורם יחד עם תרופות בעלות השפעה היפנוטית מרגיעה (כולל תרופות אחרות המכילות זולפידם) לפני שינה או בלילה, אלא אם רופאך הורה כך.

■ הסיכון של פגיעה פסיכומוטורית בבוקר שלמחרת נטילת **זודורם**, כולל פגיעה ביכולת הנהיגה, עולה אם נוטלים את התרופה לפני שינה ללא אפשרות שינה של 7-8 שעות, אם נוטלים מינון גבוה מהמומלץ על ידי הרופא, אם נוטלים בשילוב עם תרופות אחרות המדכאות את מערכת העצבים המרכזית, או **אלכוהול** או אם נוטלים בשילוב עם תרופות אחרות שעשויות להעלות את רמות זולפידם בדם. במקרים אלו על המטופלים לנהוג משנה זהירות לגבי נהיגה או כל פעילות אחרת הדורשת תפקוד מוחי וערנות מלאה.

■ **זודורם** עלול לגרום לטשטוש, לישנוניות ולירידה ברמת הערנות, שעלולים לגרום לנפילות, וכתוצאה מכך אף להוביל לפגיעות חמורות. דווחו פגיעות חמורות כגון שברים בירך ודימום תוך גולגולתי.

#### לפני הטיפול בתרופה ספר לרופא אם:

- יש לך היסטוריה של דיכאון, מחלות נפש או ממשבות אובדניות.
- יש לך היסטוריה של שימוש לרעה או התמכרות לאלכוהול.
- הנך סובל ממחלת כליה או מחלת כבד.
- הנך סובל או ממחלת ריאות או מבעיות בנשימה בנשימה (כגון אסטמה), הכבד, הכליה/מערכת השתן.
- הנך בהריון, מתכננת הריון, מניקה או מתכננת להניק.
- ילדים ומתבגרים

■ הטבליות אינן מומלצות לטיפול בילדים ובמתבגרים מתחת לגיל 18 מאחר ולא הוכחו יעילות ובטיחות בשימוש בתרופה בגילאים אלה.

#### אינטרקציות/תגובות בין תרופתיות

אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. במיוחד יש ליידע את הרופא או הרוקח אם אתה לוקח:

תרופות המדכאות את מערכת העצבים המרכזית כגון: תרופות ממשפחת הבנזודיאזפינים, אופיאידים, נוגדי דיכאון טריציקלים ואלכוהול- ראה סעיף "אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה".

**St.john's wort (היפריקום)**, סרטראלין, פלואוקסטין, פלובוקסאמין - נוגדי דיכאון.

כלורפרומאזין, הלופרידול- לטיפול במחלות נפש.

ריפאמפין, ציפרופלוקסצין - לטיפול בזיהומים.

קטוקונזול - לטיפול בפטריות.

תרופות עלולות להשפיע על הפעילות אחת של השניה ולעיתים לגרום לתופעות לוואי חמורות.

אל ליטול **זודורם** עם תרופות אחרות שעלולות לפגוע לך בעירנות אלא אם קיבלת הנחייה כזו מהרופא שלך.

הכר את התרופות שהינך נוטל. שמור רשימה של התרופות שלך על מנת להראות לרופא שלך ולרוקח בכל פעם שהנך מקבל תרופה חדשה.

#### שימוש בתרופה ומזון

אין ליטול את התרופה עם הארוחה או מיד לאחר הארוחה. פעילות התרופה מהירה יותר אם נלקחת על קיבה ריקה.

#### שימוש בתרופה וצריכת אלכוהול

אין לשתות יינות או משקאות חריפים בתקופת הטיפול עם התרופה.

#### הריון, הנקה ופוריות

אם הנך בהריון, מתכננת הריון, מניקה או מתכננת הנקה יש להיוועץ ברופא לפני השימוש בתרופה.

אם הנך בהריון או מתכננת הריון דברי עם הרופא שלך על הסיכון לעובר אם תשתמשי ב**זודורם**.

שימוש ב**זודורם** בטרימסטר האחרון של ההריון עלול לגרום לקשיי נשימה או לישנוניות יתר ביילוד. יש לעקוב אחר סימנים של ישנוניות (מרובה מהרגיל), בעיות נשימה או ריפיון ביילוד, אם **זודורם** נלקח במהלך סוף ההריון.

אם הנך מניקה או מתכננת להניק, **זודורם** עשוי לעבור לחלב אם. היוועצי ברופא לגבי הדרך המיטבית להזין את תינוקך במהלך השימוש שלך ב**זודורם**.

## נהיגה ושימוש במכונות

השימוש בתרופה עלול לפגום בערנות ועל כן מחייב זהירות בנהיגה ברכב, ובהפעלת מכונות מסוכנות ובכל פעילות המחייבת ערנות.

הנך עלול להרגיש סחרחורת, גם ביום שלמחרת נטילת **זודורם**.

הסיכון של פגיעה פסיכומוטורית, כולל פגיעה ביכולת הנהיגה, עולה אם נוטלים את התרופה לפני שינה ללא אפשרות שינה של 7-8 שעות, אם נוטלים מינון גבוה מהמומלץ על ידי הרופא, אם נוטלים בשילוב עם תרופות אחרות המדכאות את מערכת העצבים המרכזית, **או אלכוהול**, או אם נוטלים בשילוב עם תרופות אחרות שעשויות להעלות את רמות הזולפידם בדם.

התרופה עלולה להשפיע על כושר הריכוז שלך ביום שלמחרת גם אם אתה מרגיש ערני לגמרי. **מטופל שנוהג ברכב ומטופל שמפעיל מכונות צריך לדעת שבנטילת תרופות היפנוטיות (תרופות לשינה) עלול להיות סיכון אפשרי לתופעות לוואי הכוללות נמנום, זמן תגובה מוארך, סחרחורת, ישנוניות, ראייה מטושטשת/כפולה, עירנות מופחתת ונהיגה לקויה בבוקר שלאחר נטילת התרופה. על מנת להפחית את הסיכון מומלצת שינה של לילה שלם (7-8 שעות).**

## מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

התרופה מכילה **לקטוז**. היוועץ ברופאך לפני תחילת השימוש בתרופה אם הנך סובל מאי סבילות לסוכרים מסוימים.

### 3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר. המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד. **אין לעבור על המנה המומלצת ע"י הרופא המטפל.** יש ליטול **זודורם** פעם אחת בלילה מיד לפני שינה. אין לעבור על מינון של 10 מ"ג פעם ביום, מיד לפני השינה. יש לוודא שתוכל לישון לפחות 7-8 שעות לאחר נטילת התרופה. המינון ההתחלתי המקובל בדרך כלל הוא : לנשים- 5 מ"ג (טבליה של זודורם 5 או חצי טבליה של זודורם 10), פעם ביום. לגברים- 5-10 מ"ג, פעם ביום בקשישים ובמטופלים עם בעיות בתפקוד הכבד המינון הינו 5 מ"ג פעם ביום. אין להשתמש אם מאובחנת אי ספיקת כבד חמורה. משך הטיפול הרגיל בתרופה הוא יומיים עד ארבעה שבועות. בחלק מהמטופלים, הרמות הגבוהות יותר של התרופה בדם בבוקר, לאחר לקיחה של 10 מ"ג לפני השינה, מגבירות את הסיכון לפגיעה בערנות, ביכולת הנהיגה וביכולת להתרכז. הטבליות אינן מיועדות לילדים ולמתבגרים מתחת לגיל 18 שנים. במידה ולא חל שיפור או שחלה החמרה לאחר 10-7 ימי טיפול בזודורם, יש לפנות לרופא. יש לבלוע את הטבלייה בשלמותה, אלא אם הרופא הורה לך לקחת חצי טבליה של זודורם 10 (5 מ"ג). במידת הצורך ניתן לחצות את הטבלייה לשימוש מיידי. אין מידע לגבי כתישה או לעיסה של הטבלייה.

### אין לעבור על המנה המומלצת

**אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר** או אם בטעות בלע ילד מן התרופה פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא אריזת התרופה אתך.

### אם שכחת ליטול את התרופה :

יש ליטול את התרופה מיד לפני השינה ורק אם תוכל לישון אחר כך לפחות 7-8 שעות. אם שכחת ליטול את התרופה לפני השינה אין ליטול מנה בזמן אחר כלשהו כי ייתכן ותרגיש נמנום, סחרחר ומבולבל במשך היום. אין ליטול מנה כפולה כפיצוי על המנה שנשכחה. קח את המנה הבאה בזמן הרגיל והיוועץ ברופא. יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא. גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק הטיפול **בזודורם** ללא התייעצות עם הרופא או הרוקח וגם אז רק באופן הדרגתי.

## אם אתה מפסיק את נטילת התרופה:

ביום או יומיים שלאחר הפסקת נטילת התרופה ייתכן ותופענה התגובות הבאות: בעיות בשינה, בחילה, הסמקה, סחרחורת, בכי בלתי נשלט, הקאה, התכווצויות בבטן, התקף חרדה, עצבנות וכאב באזור הקיבה.

**אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהנך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הנך זקוק להם.**

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היועץ ברופא או ברוקח.

## 4. תופעות לוואי:

כמו לכל תרופה, השימוש בזודורם עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן ולא תסבול מאף אחת מהן. תופעות לוואי חמורות כוללות:

- יציאה מהמיטה בזמן שאינך ער לגמרי וביצוע פעולות שאינך מודע לביצוען (ראה סעיף 2 "אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה").
- מחשבות והתנהגות לא רגילות התסמינים כוללים חברתית או אגרסיבית יותר מהרגיל, בלבול, אי-שקט, **סערת נפש**, הזיות, החמרה של דיכאון ומחשבות או פעולות אובדניות.
- איבוד זיכרון
- חרדה
- תגובות אלרגיות חמורות כגון: נפיחות הלשון או הגרון ובעיות נשימה. פנה לקבלת טיפול רפואי אם מופיעים אצלך התסמינים האלה לאחר נטילת **זודורם**.
- **נפילות אשר עלולות להוביל לפציעות חמורות.**

יש ליצור קשר עם הרופא במידה והופיעה כל אחת מתופעות הלוואי המתוארות מעלה או תופעות לוואי אחרות שמדאיגות אותך בזמן השימוש בזודורם.

תופעות לוואי **שכיחות** (משפיעות יותר מ-1/100 מהמטופלים): יובש בפה, חולשה, הליכה בלתי יציבה (Ataxia), בלבול, נמנום, תחושת ערפול **או תחושה שהנך תחת השפעת סם**, אופוריה, נדודי שינה, עייפות, סחרחורת, ורטיגו, שלשול, בעיות עיכול, שיהוקים, בחילה, סינוסיטיס, הפרעות בראיה, זיהומים בדרכי השתן, **כאב פרקים, כאב שרירים, זיהום בדרכי הנשימה העליונות, זיהום בדרכי הנשימה התחתונות.**

תופעות לוואי **לא שכיחות** (משפיעות על בין 1/100 ל- 1/1000 מהמטופלים): הזעה מוגברת, חיוורון, ירידה בלחץ הדם במעבר לעמידה, עילפון, כאבים בחזה, בצקת, נפילות (העלולות לגרום לפגיעות חמורות), **תשישות**, חום, הרגשה כללית רעה, **טראומה**, הפרעות בכלי הדם המוחיים, יתר לחץ דם, דופק מהיר, **סערת נפש, חרדה**, ירידה בתפקוד המוחי, תחושת ניתוק, קשיי ריכוז, ליקוי בדיבור, חוסר יציבות רגשית, הזיות, ירידה בתחושה, אשליות, התכווצויות שרירים ברגלים, מיגרנה, עצבנות, בעיה בתחושה שינה (לאחר נטילת התרופה ביום), קהות חושים, רעד, אנורקסיה, עצירות, ליקוי בבליעה, נפיחות (גזים), דלקת במערכת העיכול, **הקאות**, זיהום, ליקוי בתפקוד הכבד ועליה ברמת האנזימים, היפרגליקמיה, צמא, דלקת פרקים, אי סדירות במחזור החודשי, דלקת בנרתיק, ברונכיטיס, שיעול, **קוצר נשימה, דלקת אף (ריניטיס)**, גרד, גירוי בעין, כאב בעין, דלקת בעין, שינוי בטעם, צלצולים באזנים, דלקת בשלפוחית השתן, חוסר שליטה במתן שתן.

תופעות לוואי **נדירות** (משפיעות על פחות מ 1/1000 מהמטופלים): הפרעות בראיה, שינויים ברוק, הסמקה, גלאוקומה, ירידה בלחץ דם, אין אונות, **הפרשה מוגברת של רוק**, תחושת שווא בצורך לעשיית צרכים, תגובה אלרגית, החמרה באלרגיה, שוק אנפילקטי, בצקת בפנים, גלי חום, שקיעת דם מוחשת, כאב, תסמונת הרגל העצבנית, התקשות שרירים, עליה בסבילות לתרופה, ירידה במשקל, תעוקת לב, אי סדירות בקצב הלב, דלקת בעורקים, בעיות במחזור הדם, **פעימת יתר בלב**, החמרה בלחץ דם גבוה, התקף לב, דלקת ורידים, דליות, תסחיף ריאתי, בצקת ריאות, **טכיקרדיה חדרית**, הפרעות בהליכה, מחשבות לא רגילות, תגובה תוקפנית, אדישות, עלייה בתיאבון, ירידה בחשק מיני, מחשבות שווא, דמנציה (שיטיון), הפרעות בדיבור, שינוי בתפיסת ה"עצמי", הרגשה מוזרה, הפרעות תנועה, טונוס שרירים נמוך, היסטריה, תחושת שכרות, תגובה מאנית, **כאב עצבי, דלקת עצבים, נזירופתיה (מחלת מערכת העצבים ההקפית)**, **הפרעה נזירוטית**, התקפות פאניקה, **שיתוק חלקי**, הפרעות אישיות, סהרורות (הליכה מתוך שינה), ניסיונות התאבדות, כיווץ שרירים חמור, פיהוקים, דלקת מעיים, גיהוקים, התכווצות בושט, דלקת בקיבה, טחורים, חסימת מעיים, דימום מפי הטבעת, עששת, אנמיה, רמות המוגלובין גבוהות, ירידה בספירת דם לבנה, הגדלת בלוטת לימפה, אנמיה מקרוציטית, ארגמנת (פריחה בצורת כתמים), פקקת (תרומבוזיס), מורסה

(אבצס), הרפס, שלבקת חוגרת, דלקת באוזן התיכונה או החיצונית, עליית ברמות בילירובין, עלייה באנזימי כבד, שיגדון, רמות גבוהות של כולסטרול או שומנים בדם, הפרעות בתפקודי כליה, בצקת סביב העיניים, כאבי מפרקים, חולשת שרירים, הקרנת כאב לרגל, דלקת בגיד, גידולים בשדיים, כאבים בשדיים, כיווץ סימפונות, דיכוי נשימתי, דימום מהאף, ירידה בחמצן בדם, דלקת גרון, דלקת ראות, אקנה, פריחה שלפוחיתית, דלקת עורית, פריחה מוגלתית, רגישות לאור, אורטיקריה, דלקת הלחמית, כיב בקרנית העין, הפרעות בהפרשת הדמעות, הפרעה בזיהוי ריחות, הבזקי אור, כשל כלייתי חמור, כאב או תכיפות בהטלת שתן, השתנת לילה, עלייה בכמות השתן, דלקת כליות, כאבי כליות, אצירת שתן.

תופעות לוואי **בשכיחות בלתי ידועה**:  
פגיעה חמורה בכבד עם או ללא צהבת.

תופעות לוואי עם הפסקת נטילת התרופה- ראה פירוט בסעיף 3.

**אם מופיעה תופעת לוואי אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה, או נמשכת יותר ממספר ימים או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא הוזכרה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.**

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי. או ע"י כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

בנוסף, ניתן לדווח לחברת "אוניפארם בע"מ".

#### 5. איך לאחסן את התרופה?

מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.

אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

**תנאי אחסון:** יש לאחסן מתחת ל-25°C ובמקום מוגן מאור.

#### 6. מידע נוסף:

נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם:

Lactose (anhydrous), microcrystalline cellulose, sodium starch glycolate, colloidal silicon dioxide, magnesium stearate, coating blend white.

כל טבליה של זודורם 10 מכילה 90 מ"ג לקטוז .

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:

**זודורם** ארוז בתוך מגשיות (בליסטר) אשר מוכנסות לתוך אריזת קרטון.

בכל אריזה של **זודורם** יש 2,6,10,15,20 או 30 טבליות. ייתכן ולא כל גדלי האריזה משווקים.

טבליות זודורם 10 הינן עגולות, קמורות משני צידיהן, עם קו חציה מצד אחד וצבען לבן.

שם בעל הרישום: אוניפארם בע"מ, ת.ד. 21429 ת"א.

שם היצרן וכתובתו: אוניפארם בע"מ, פארק תעשייה " מבוא כרמל".

מספר הרישום של התרופה בפנקס התרופות הממלכתי של משרד הבריאות:

זודורם 10: 123 62 30320 01

נערך במאי 2021

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לשני המינים.

**העלון לצרכן מפורסם במאגר התרופות שבאתר האינטרנט של משרד הבריאות**

**<http://www.health.gov.il> וניתן לקבלו מודפס ע"י פניה לבעל הרישום.**

**נבקש כי תיידע את המטופלים והלקוחות שלך אשר נוטלים את התרופה בשינויים שנעשו בעלון.**