

• حبوب منع الحمل (يجب استشارة الطبيب بالنسبة لوسائل منع الحمل الأخرى).
يحتاج الجسم إلى فترة معينة من أجل التخلص من سيلجين بشكل تام، قبل استعمال أنوية معينة أخرى. يجب استشارة الطبيب إذا كنت تتوى اليد بعاج دوائي آخر.

• استعمال الدواء والطعام
يمكن تناول سيلجين مع الطعام والشراب.
قد يوصي الطبيب بالامتناع عن تناول أطعمة معينة تحتوي على تيرامين مثل:

الجبن، القول، مرق اللحم، خلاصة الخميرة أو منتجات المسويا المختمرة.

• استعمال الدواء واستهلاك الكحول

يجب الامتناع عن استهلاك الكحول خلال فترة العلاج سيلجين.

• العمل، الارضاع والخصوبة

لا يجوز استعمال سيلجين إذا كنت حاملاً، تظفين أنك قد تكونين حاملاً أو تحضرين للحمل.

لا يجوز استعمال سيلجين إذا كنت مرضعاً.

يجب استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل استعمال الدواء.

لا تتوفر معلومات بخصوص الآثار الجانبية على الخصوبة.

• المساعدة وأستعمال الماكولات

يجب الامتناع عن المساعدة أو تشغيل الماكولات الخطرة خلال فترة استعمال الدواء، إذا كنت تعاني من دوار، ديل إلى النوم وأو انتاظر في الحفاظ.
قد يسبب سيلجين شعوراً بالدوار أو بالميل إلى الشعور، لا يجوز المساعدة خلال فترة استعمال الدواء قبل أن تعلم كيف يؤثر الدواء عليك.

• معلومات هامة عن بعض مضادات الدواء

يحتوي سيلجين على الالكترون، إذا أخربك الطبيب بأن لديك عدم تحمل لسلكيات معينة،

فالشئر الطبيب قبل استعمال الدواء.

• كيف يستعمل سيلجين؟

يجب استعمال سيلجين دواماً بموجب تعليمات الطبيب. عليك استشارة الطبيب أو

الصيدلي إذا لم تكن متancockاً من الجرعة الدوائية ومن جهة العلاج بالمستحضر.

الجرعة الدوائية وكيفية العلاج سيحددهما الطبيب فقط. يمنعتجاوز الجرعة الموصى بها.

• للبالغين والأولاد الذين سنهن فوق الـ 12 - قرص واحد في الصباح وقرص واحد في

الظهيرة أو قرصان في الصباح.

يمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.

هذا الدواء عادةً غير مخصوص للأطفال لأنهم لا يتم فحصه لدى الأولاد.

• كيفية التناول:

يجب إنبعاث الدواء من القليل من الماء.

• التهوية/الضغط:

يمكن هرس الفرس اذا دعت الحاجة إلى ذلك.

إذا تناولت خطأ جرعة دوائية أكبر من المزم أو إذا قام ولد أو شخص آخر بطلع الدواء خطأ، فرجو فرزه فرزًا إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى واصطحب معك عينة الدواء.

• اعراض فرط الجرعة تشمل العصبية، التقليل، الإرهاق، الصداع الشديد، الارتعاش،

تضغط الدم المرتفع أو المنخفض، صعوبات في التنفس، ضيق التنفس، الهالوس، البوار،

النفاس السريع وغير المنتظم، آلام في الصدر، تقلصات خطيرة في العضلات، الحمى،

فرط التعرق، فقدان الوعي والدوران.

إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المحدد فيجب عليك تناول الجرعة حال تذكرك.

إذا تذكرت فقط في الساعات المتأخرة من بعد الطفيرة أو في المساء فيجب أن تتضمن الجرعة التي نسيتها لا يجوز تناول درعين معاً بحال من الأحوال.

يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب. حتى لو طرأ تحسن على حالتك الصحية، فلا يجوز التوقف عن العلاج بالياء دون استشارة الطبيب.

لا يجوز تناول الأدوية في العتمة! راجع الملخص وتقدير من الجرعة في كل مرة تتناول فيها الدواء، ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.

إذا توفرت لديك أسلنة إضافية حول استعمال الدواء، فاستشر الطبيب أو الصيدلي.

• استعمال سيلجين مع ليغودوبا
لا يجوز استعمال سيلجين بالتزامن مع ليغودوبا، إذا كنت تعاني من إحدى الحالات التالية:

• مشكل في القلب أو في الأوعية الدموية (مرض قلبي وعائي).

• فرط ضغط الدم.

• دقات قلبية سريعة أو غير منتظمة (مثل: تسرب القلب أو اضطرابات في نظم القلب).

• فرط نشاط الغدة الدرقية.

• زرق (جلوكوما) مفتقد الرؤية.

• ورم في الغدة الكظرية (pheochromocytoma) أو ورم البروستاتا (ورم غدة البروستاتا).

• مشكل نفسيّة خطيرة (مثل: القسماء أو الخرف في حالة متقدمة).

• تغيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء

قبل العلاج سيلجين، أخيه الطبيب إذا:

• كنت تعاني من فرط ضغط الدم غير الخاضع للسيطرة، النبحة الصدرية، دقات القلب

القوية، اضطرابات نظم القلب.

• كنت تعاني من مشكل في الكليتين أو في الكبد.

• كنت تعاني من مرض نفس، قلق أو مشكل في التوتر.

• كان لديك أعراض من قرحة المعدة.

• كنت تستعمل دواء يسمى ليغودوبا قد يسبب الهياج والحرمات الباراديمية، قد تحتاج إلى متابعة طبية متواترة، وقد يعزز لك الطبيب جرعة سيلجين الواقية.

• كنت ستخضع لعملية جراحية. قد يتعرض سيلجين مع بعض المواد المستعملة للتهدير العام.

• كان لديك أي من الأعراض أو السلوكيات الباراديمية (مثل: القمار، السلوكي الجنسي الغير طبيعي) (انظر البند 4 - الأعراض الجانبية).

قد يؤدي استعمال المستحضر بويبرينوفرين بالتزامن مع سيلجين إلى نشوء متلازمة

السيروتونين، وهي حالة قد تتشكل خطراً على الحياة (انظر البند "التفاعلات بين الأدوية").

• الأدوية والمرادفات

يحتوي كل قرص على: سيلجين 500 وكاربود 5 ملجم

Selegiline Hydrochloride 5 mg

والمواد غير المحتلة ومبنيات الحساسية (انظر البند 6)

سيلجين 5 ملجم أقراص: يحتوي هذه النشرة على معلومات ملخصة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسلنة إضافية، فراجع الطبيب أو الصيدلي.

لقد وصف هذا الدواء من أجل علاجك. لا تعطه للأخرين. قد يضرهم الدواء حتى لو بدا لك أن تناوله طبيعية مشابهة.

• لا يغّرض مخصوص هذا الدواء؟

علاج مرض الرعاش (باركينسون) أو لعلاج أعراض هذا المرض.

الفصيلة العاجية: مثبطات موتون أمين أو كسيدياز من النوع B.

2. قبل استعمال الدواء [إذا:]

لا يجوز استعمال الدواء [إذا:]

كنت حساساً (أرجيًّا) لل المادة الفعالة أو لأيٍ واحد من المركبات الأخرى التي

يحتوي عليه الدواء (القائمة المركبات غير المغذية، انظر البند 6).

كنت تستعمل بيشين أو أي مسكن ألم آخر من فصيلة الأفيونيات مثل كورفين،

ترامدول أو بويبرينوفرين.

كنت تستعمل أدوية مضادة للأكتينات (انظر التفاعلات بين الأدوية). يجب إيقاف

استعمال الأدوية المضادة للأكتينات قبل استعمال سيلجين بضعة أيام.

كنت تستعمل مثباتات موتون أمين أو كسيدياز مثل المضاد الحيوي لينزوليد.

كنت تستعمل أدوية لعلاج المرضيرينا مثل سوماتريبيان، زاتريبيان، ريزاتريبيان،

زولميتربييان، ريزاتريبيان.

كنت تستعمل الأدوية المحاكية مثل الأدوية لعلاج الربو أو لخفيف احتقان الأنف.

كنت تعاني من قرحة المعدة أو من قرحة الأمعاء.

كنت تعاني من اضطراب في الحركة أو في العضل لا يمت بصلة لمرض

الباركينسون.



الخطوة الثانية، اضف الأعماض

ثـ: مـرـضـيـةـ تمثل أي دواء، قد يؤدي استعمال سيلجين إلى نشوء أعراض جانبية عند بعض المرضى.

أعراض جانبية شائعة جداً (very common) - تؤثر على أكثر من متلقي 1

١٥- الملاجع من بين: ألم في الفم وانتفاخ اللثة (التهاب الفم)

اعراض جانبیه شانعه (common) - تواتر على 1 إلى 10 متفاوتين للعلاج من بين :100

- دقات قلبية قوية (خفقان)، نظم قلبي غير منتظم، غير ثابت، ألم في الصدر، انتفاخ الكاحلين وضيق التنفس
 - غثيان، دوار، تعبور عن الأعفاء، جفاف الفم، انعدام الشهية، مشاكل في التبول
 - انخفاض ضغط الدم ما قد يسبّب شعوراً بالدوار أو الإغماء خاصّة عند الانتقال المفاجئ إلى وضعية الوقوف
 - فرط الرغبة الجنسية (تغير السلوك والنشاط الجنسيين)، مما قد يسبّب قلقاً ملحوظاً للمرأة أو للغير
 - انخفاض في حكملاً الدم البيضاء (leukocytopenia) وصفائح الدم (قلة المصفيفات) مما قد يزيد من خطر التعرّض للتّزيف الدموي، التكّتم أو الإصابة بالثنيات ومشاكل الكبد الموقّفة
 - سداد، رود فعل جلديّة، ساقط الشعر
 - تزبول هذه الأعراض أداة ضد تقليل جرعة فيغوديا الدوائية. إذا شعرت بأحد الأعراض التالية، أوقفي تناول طبلوك بخصوص تأخير تخفيف الجرعة الدوائية.
 - إذا ظهرت أعراض جانبية، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية، أو إذا كنت تعاني من عرض جانبية لم يذكر في النشرة، فعليك استئناف الطبيب.
 - بالإمكان اكتشاف عن اعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الشنط على الرابط "التبليغ عن عرض جانبية عقب العلاج الموصى به" الموجود في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة www.health.gov.il، والذي يوجه إلى الاستمارة المنسّقة للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق الدخول إلى الرابط:

٥. كيف يجب تخزين الدواء؟

امتنع التسمم! هذا النوع، وأي دواء آخر، يجب حفظه في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي الأطفال وأو الأشخاص الرضيع ومتلازمة رؤيتهم، وبذلك ستحمي التسمم. لا تسبب التقيّف

لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (EXP) المدون على العبوة. يشير بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

ظروف التخزين: يحب التخزين في درجة حرارة أقل من 25 درجة مئوية، حيث تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

6. معلومات إضافية

بالإضافة إلى المركب الفعال، يحتوي الدواء أيضاً على:

.lactose, maize starch, crospovidone, povidone,
hydrogenated vegetable oil, colloidal silicone dioxide.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة؟
كان قرص من سلاسلن مستحسن ولم نه أنه أيض ضارب إلى الصفة بتحته، كان عليه على

قد لا يتحقق ذلك، لكنه في الواقع ممكن. في الواقع، يمكن أن تصل إلى 100 لوحة على 10 أفراد.

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة: 069272827800
قد لا يتوافق جميع الأحجام المغلوظات.

الجهة المصنعة وصاحب الامتياز: ك ص ط للصناعات الكيميائية م.ض، كريات ملاخي، ص.ب. 385.

تم تحرير هذه النشرة في أيار/مايو 2021 وفقاً لإرشادات وزارة الصحة.
من أجل التبسيط ولتسهيل القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكرة. على الرغم

من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.

• الانفصال المفاجئ إلى وضعية الوقف

• ردود فعل جاذبية
أعراض جانبية مدى شيوعها غير معروف (لا يمكن تقدير مدى شيوعها وفقاً

للمعطيات المتوفرة، لكن يمكن اعتبار شيوخ هذه الاعراض الجاتبية نادراً جداً: ٠ فرط الرغبة الجنسية (تغير السلوك والنشاط الجنسيين، مما قد يسبب قلقاً ملحوظاً

• دوافع غير عادية وأو تصرفات غير عادية (مثل القمار المفرط أو تصرفات أخرى) للمرضى أو الغير

- ٠ عدم القرة على التبول أو صعوبة في التبول
- اعراض جانبية تظهر عند دمغ سلاحف مع لقاح دبابة:

قد يزيد دمج سيلجين مع ليقودوبا من نشوء اعراض ليقودوبا الجانبية، على سبيل

- حركات لابرادية مفرطة بعد تناول دوائك

• ارباك، هلوسة، مسائل في التوم، عصبية، نململ