

سيرتينيكان 0.25 ملг أقراص

كل قرص يحتوي على:
إيفوروليموس 0.25 ملغ
Everolimus 0.25 mg

سيرتينيكان 0.5 ملغ أقراص

كل قرص يحتوي على:
إيفوروليموس 0.5 ملغ
Everolimus 0.5 mg

سيرتينيكان 0.75 ملغ أقراص

كل قرص يحتوي على:
إيفوروليموس 0.75 ملغ
Everolimus 0.75 mg

2) قبل إستعمال الدواء

لا يجوز إستعمال الدواء:
إذا كنت حساساً (اليرجي) لـ إيفوروليموس، أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء. انظر الفقرة 6 «معلومات إضافية».
إذا كنت حساساً (اليرجي) لـ سيروليموس.

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء:

- قبل إستعمال سيرتيكان احث للطبيب إذا:
الدواء الذي تنشط فيه المركبات المنشطة على محاكاة التلوثات.
يوصى باستشارة الطبيب أو مرکز زرع الأعضاء إذا كنت تعاني من سخونة أو شعور عام غير جيد أو إذا كنت تشعر بأعراض مثل سعال أو الشعور بحرقة عند النبول التي تكون خطيرة أو استمر لعدة أيام.
يستشر الطبيب أو مرکز زرع الأعضاء فوراً إذا كنت تشعر بارتعاك، مشاكل في النطق، فقدان الذاكرة، صداع، عدم سلامه الرؤية أو نوبات، لأن تلك يمكن أن تكون أعراض لحالة نادرة لكنها خطيرة تسمى progressive multiple (PML) leukoencephalopathy.
- إنترت مؤخراً عملية جراحية كبيرة، أو إذا ما زال لديك جرح جراء عملية جراحية والذي لم يشفى بعد. قد يزيد سيرتيكان من خطورة حدوث مشاكل في شفاء الجرح.
- ترتفع الأدوية المنشطة لجهاز المناعة مثل سيرتيكان من خطورة تطور أورام سرطانية، خاصة في الجلد وفي الجهاز الليمفاوي. لذا عليك الحذر من نادر يحدث حالة لدى الفتنة السكتانية في سن الكهولة.
- إيمانتينيب، دواء يستعمل لتنشيط نمو خلايا غير سليمة.
هيبريليكوم، پيرفروتاتوم (St. John's wort) – دواء نباتي المنشأ يستعمل لعلاج الاكتئاب.
- في حال توجب عليك تلقى لقاح، راجع الطبيب قبل تلقيه.

التدخلات/التفاعلات بين الأدوية:

- إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخراً، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وأضافات غذائية احث للطبيب أو الصيدلي عن ذلك، بالأشخاص إذا كنت تتناول:
- أدوية مبظطة لجهاز المناعة، عدا سيكلاوسبيورين ضمن مستحلب دقيق، تاكروليموس أو كورتيكosterوبيديات.
- مضادات حيوية مثل ريفامبيسين، ريفابوتين، كلارترومبيسين، إبريترومبيسين أو إيتيليترومبيسين.
- أدوية مضادة للفيروسات مثل بريتونافير، إيفافيرينز، نيفيرابين، نيليفافير، إيندينافير، أمبرينافير، المستعملة لعلاج ثلث HIV.
- أدوية لعلاج التلوثات الفطرية، مثل فُوكونازول، فلوكونازول، كيتوكونازول.
- أدوية تستعمل لعلاج الصرع مثل فينتوتين، فينيوبيريتال أو كارباراميزبين.
- أدوية تستعمل لعلاج ارتفاع ضغط الدم أو مشاكل في القلب مثل فيرباميل، نيكارابيبين أو ديليتازام.
- درونيدارون، دواء يستعمل لتنظيم نظم القلب.
- أدوية تستعمل لخفض نسبة الكولستيرون في الدم مثل أتورفالستاتين، برافالستاتين أو فيبرات.
- أدوية تستعمل لعلاج الاختلالات الحادة أو تستعمل للتهيئة قبل وخال عملية جراحية أو إجراءات طبية أخرى، مثل ميدازولام.
- أوكتريوتيد، دواء يستعمل لعلاج مرض مضاخمة الأطراف، إضطراب هرموني نادر يحدث عادة لدى الفتنة السكتانية في سن الكهولة.
- إيمانتينيب، دواء يستعمل لتنشيط نمو خلايا غير سليمة.
- هيبريليكوم، پيرفروتاتوم (St. John's wort) – دواء نباتي المنشأ يستعمل لعلاج الاكتئاب.
- في حال توجب عليك تلقى لقاح، راجع الطبيب قبل تلقيه.

استعمال سيرتيكان والطعام

- إن وجود طعام من شأنه أن يؤثر على امتصاص سيرتيكان في الجسم. من أجل الحفاظ على نسب ثابتة من سيرتيكان في الجسم عليك تناول سيرتيكان بشكل متتابع، دائمًا مع الطعام أو دائمًا على معدة خاوية. لا يجوز تناول سيرتيكان معاصرة الطعام. سيرتيكان يعطى في الصباح وفي المساء سوية مع سيكلاوسبيورين ضمن مستحلب دقيق، المقدار الدوائي الأول من سيرتيكان يعطى قريباً قدر الإمكان بعد عملية الزرع.
- في حال زرع كبد: المقدار الدوائي العام الاعتيادي هو 1 ملغ سيرتيكان يوميًا، يؤخذ في اليوم، يؤخذ في الصباح وفي المساء سوية مع سيكلاوسبيورين ضمن مستحلب دقيق، المقدار الدوائي الأول من سيرتيكان يعطى قريباً قدر الإمكان بعد عملية الزرع.
- في حال زرع كبد: المقدار الدوائي العام الاعتيادي هو 1 ملغ سيرتيكان مرتين في اليوم، يؤخذ في الصباح وفي المساء، سوية مع تاكروليموس. المقدار الدوائي الأول من سيرتيكان يعطى أربع مرات يوميًا تقريباً بعد عملية الزرع.
- لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به.

طريقة الاستعمال:
مخصص للتناول عن طريق الفم فقط.
 يجب بلع الأقراص بشكلها الكامل مع كأس من الماء. لا يجوز سحق الأقراص.
فترحة العلاج:
بسمر العلاج لطالما هناك حاجة لتنبيط الجهاز المناعي وذلك من أجل منع فرض العضو المنزوع.

لا يجوز الإرضاع خلال فترة العلاج - سيرتيكان لا يعرف فيما إذا كان سيرتيكان ينتمي إلى حليب الأم.
من الجائز أن يؤثر سيرتيكان على الخصوبة لدى الرجال.
الفترة السكانية البالغة (بعمر 65 وما فوق)
توفر خبرة محدودة حول إعطاء سيرتيكان للمرضى الكبار ما فوق عمر 65 سنة.

الأطفال والمراهقون (دون عمر 18 سنة)
هذا الدواء غير مخصص للأطفال ومارهاقين دون عمر 18 سنة.

السيقة واستعمال الماكولات
لم تجرى أي بحث لشخص ثالث سيرتيكان على السيقة واستعمال الماكولات الخطيرة.

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء
تحتوي سيرتيكان على لكتوز. إذا قيل لك من قبل طبيبك بأن لديك عدم تحمل لسكريات معينة، راجع الطبيب قبل تناول هذا المستحضر. انظر أيضاً الفقرة 6 «معلومات إضافية».

(3) كيفية إستعمال الدواء؟

يجب الاستعمال حسب تعليمات الطبيب دائمًا. يقر الطبيب ما هو المقدار الدوائي الذي يتوجب عليك تناوله ومتى يتوجب عليك تناوله. يجب متابعة تعليمات الطبيب أو الصيدلي.

عليك الاستيقاظ من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن واثقاً.

المقدار الدوائي وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط. المقدار الدوائي الإعتيادي عادة هو:

في حال زرع كلية وقلب: المقدار الدوائي العام الاعتيادي هو 0.75 ملغ سيرتيكان مرتين في اليوم، يؤخذ في اليوم، يؤخذ في الصباح وفي المساء سوية مع سيكلاوسبيورين ضمن مستحلب دقيق، المقدار الدوائي الأول من سيرتيكان يعطى قريباً قدر الإمكان بعد عملية الزرع.

في حال زرع كبد: المقدار الدوائي العام الاعتيادي هو 1 ملغ سيرتيكان مرتين في اليوم، يؤخذ في الصباح وفي المساء، سوية مع تاكروليموس. المقدار الدوائي الأول من سيرتيكان يعطى أربع مرات يوميًا تقريباً بعد عملية الزرع.

لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به.

طريقة الاستعمال:
مخصص للتناول عن طريق الفم فقط.
 يجب بلع الأقراص بشكلها الكامل مع كأس من الماء. لا يجوز سحق الأقراص.

فترحة العلاج:
بسمر العلاج لطالما هناك حاجة لتنبيط الجهاز المناعي وذلك من أجل منع فرض العضو المنزوع.

1) لأي غرض مخصص الدواء؟

يستعمل سيرتيكان لمنع رفض عضو لدى زارعي كلية وقلب ولدى زارعي كبد كبار، يجب تناول سيرتيكان لدى زارعي كلية وقلب بمشاركة سيكلاوسبيورين ضمن مستحلب دقيق، كورتيكosterوبيديات ويجب تناول سيرتيكان بمشاركة تاكروليموس وكورتيكosterوبيديات لدى زارعي كبد.

الفصيلة العلاجية: ينتمي سيرتيكان لفصيلة الأدوية المسماة مثبطات الجهاز المناعي (Immunosuppressants).

الفحوص والمتابعة:

بالم المطلب المقدار الدوائي الذي تتناوله كامرا متعلقة بنسبة سيريتكان في الدم وبحسب استجاعتك للعلاج بجري طببك بمحضات من أجل قياس نسب إيفروليموس وسكالوسورين في دمك. يفحص الطبيب أيضًا الأداء الوظيفي الكلوي، نسب الشحوم والسكر في الدم وكمية البروتينات في البول.

إذا تناولت بالخطأ مقدارًا دواياً أكبر من المطلوب عليك مراجعة الطبيب بشكل فوري.

إذا تناولت مقدارًا دواياً مفرطاً أو إذا لعب طفل أو شخص آخر بالخطأ من الدواء توجه حالاً للطبيب أو لغرفة الطوارئ في المستشفى، وأحضر علىبة الدواء معك.

إذا تناولت هذا الدواء في الوقت المحدد، يجب تناول مقدار دوائي آخر عند تذكرة بذلك، وتناول المقدار الدوائي التالي في موعده. راجع الطبيب للإشتارة. لا يجوز تناول مقدارًا دواياً مفرضاً بهدف التغريّب عن المقدار الدوائي المنسبي يجب المواطنة على العلاج بالدواء بدون إستشارة الطبيب، حتى ولو طرأ تحسن على حالتك الصحية.

إذا توقفت عن تناول سيريتكان فإن هذا الأمر قد يؤدي إلى ارتفاع احتمالية رفض العضو المزروع، لذا، لا يجوز التوقف عن تناول سيريتكان بدون تعليمات من الطبيب.

لانتناول الأدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تتناول فيها دواء، ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسلمة إضافية حول إستعمال الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.

٤) الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال سيريتكان قد يسبب أعراضًا جانبية عند بعض المستعملين، لا تذهب من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز أن تتعاني أي منها.

بما أنك تتناول سيريتكان بمشاركة أدوية أخرى، فلا يمكن دائمًا أن تنسب بشكل مباشر الأعراض الجانبية لـ سيريتكان.

الأعراض الجانبية التالية تتطلب علاجاً طبياً فوريًا:

• تلوّنات: إنتهاج الرئتين
• ردود فعل تحسسية: سخونة وطفحات متكررة؛ كيسات تحنيو سائل لمفاوي؛ شري (urticaria) في نتاج البول
• أو بدون إرهاق غير متخصص، إنتباك، إصفرار الجلد أو العينين، إنخفاض thrombotic microangiopathy, haemolytic (uraemic syndrome

يجب التوقف عن تناول سيريتكان وإبلاغ الطبيب حالاً في الحالات التالية:

• أعراض تتعلق بالرئة/التنفس التي تستمر أو تتفاقم مثل سعال، صعوبات في التنفس أو صفير.

• سخونة، شعور عام غير جيد، آلم في الصدر أو في البطن، قشعريرة، الشعور بحرقة في البطن.

• إنفاس الوجه الشفتين، اللسان أو الحنجرة.

• صعوبات في البلع، حدوث كدمة بشكل تلقائي (Spontaneous) أو نزف بدون سبب واضح.

• طفح.

• آلم، سخونة غير اعتيادية، إنفاس أو إفراز من منطقة العملية الجراحية.

بلغ عن أعراض جانبية إضافية حيث تشمل:

أعراض جانبية شائعة جداً (من شأنها أن تؤثر على أكثر من مصالح ١ في كل ١٠ مالجين):

• تلوّنات/تلوقات فيروسية جرثومية وفطرية؛ تلوّن في الطرق التنفسية السفلية، مثل إنتهاج الرئتين (pneumonia)، تلوّن في الطرق التنفسية العلوية مثل إنتهاج البلعوم، تلوّن في المسالك البولية؛ إنتفاخ الرئتين، طفح شديد مع إنفاس في الجلد، إنخفاض نسب الحديد في الدم.

• راجع الطبيب في أي حالة تتوفر لديك فيها أسللة حول الأعراض الجانبية التي تظهر أعلاه.

بالإضافة، من الجائز حدوث أعراض جانبية أنت لست على علم بها، مثل نتائج شاذة في الفحوصات المخبرية، بما في ذلك فحوصات وظائف الكلية. لذلك قد يقلل من قدرة القلب على ضخ الدم، تراكم سوائل في الرئتين، خطرة القفص الصدري، الذي قد يؤدي في حالات خطيرة إلى ضيق في التنفس، تظهور سكري (رسبي مرتنة من السكري في الدم)، نسب منخفضة من البوتاسيوم

في الدم، قلق، صعوبة الحلول، للنوم (أرق)، صداع، ضغط دم مرتفع، جلطة وربطة (إنسداد وريد رئيسي بخثرة دموية)، سعال، ضيق في التنفس، إسهال، غثيان، تقيء، آلم في البطن، الم عام، سخونة، تراكم سوائل في الأنسجة، شفاء غير سليم للجروح.

أعراض جانبية شائعة (من شأنها أن تؤثر على بين ١ إلى ١٠ مالجين في كل ١٠ مالجين):

• تسمم الدم، تلوّن الجروح؛ أورام سرطانية خبيثة وحميدة؛ سرطان الجلد؛ ضرر كلوي مع سبب منخفضة من الصفائح الدموية وخالياً الدم الحمراء في الدم مع أو بدون طفح، تلف خلابياً دم حمراء، آلم في الفم أو الحنجرة، حب الشباب، تشكيل خثارات دموية في الأوعية الدموية للكليلة التي يمكن أن تؤدي إلى خسارة العضو المزروع خاصة في فترة الـ 30 يوماً الأولى بعد زرع الكلية؛ إضطراب في ت inher الدم، نسبة منخفضة من الصفائح الدموية وخالياً الدم الحمراء في الدم، نبض سريع، رغاف، إنفاس خافت بعد خلابياً دم (الأعراض من شأنها أن تشمل ضعف، كدمات وتلوقات متكررة).

• لا تنسى أن تناول أدوية أخرى، بما في ذلك المضادات الحيوانية، قد يزيد من خطر الإصابة بـ "الجلد الحمراء" (erythema nodosum)، وهو عرض يظهر على شكل بقع حمراء، مع ورود فعل تحسسية إضافية مثل إنفاس الوجه أو الحنجرة (وذمة وعائية). طفح، إنتهاج البنكرياس، تقرحات في الفم؛ آلام في المفاصل؛ آلام في العضلات،

بروتين في البول؛ إضطرابات كلوية؛ عجز جنسي؛ فتق (hernia) في منطقة العملية الجراحية، نتائج غير سليمة لفحوصات الكبد؛ إضطرابات في الدورة الطرفية الشهريّة (بما في ذلك انقطاع الطمث أو دوره شهرية شديدة التزف).

أعراض جانبية غير شائعة (من شأنها أن تؤثر على بين ١ إلى ١٠ مالجين في كل ١,٠٠٠ مالجين):
• ورم سرطاني في النسيج الليمفاوي (lymphoma)؛ نسب منخفضة من التنسوستيرون؛ إنتهاج الرئتين؛ إلتهاب الكبد؛ يرقان؛ كيسات في المبيض.

٦) معلومات إضافية

يحتوي الدواء بالإضافة لمادة الفعالة أيضًا

Lactose anhydrous; Crospovidone; Hypromellose; Lactose monohydrate; Magnesium stearate; Butylated hydroxytoluene.

يحتوي المستحضر على لكتوز.

الكمية المقدرة من اللكتوز في قرص سيريتكان 0.25 ملغ هي 53 ملغ.

الكمية المقدرة من اللكتوز في قرص سيريتكان 0.5 ملغ هي 79 ملغ.

الكمية المقدرة من اللكتوز في قرص سيريتكان 0.75 ملغ هي 118 ملغ.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة؟

يسقّي سيريتكان على شكل أقراص.

أعراض سيريتكان 0.25 ملغ، 0.5 ملغ، 0.75 ملغ هي بيضاء حتى صفراء، مستديرة، مسطحة مع جوانب مائلة.

الطباعة على ظهر الأقراص:

سيريتكان 0.25 ملغ: في جانب واحد «NVR» وفي الجانب الثاني «C».

سيريتكان 0.5 ملغ: في جانب واحد «NVR» وفي الجانب الثاني «CH».

سيريتكان 0.75 ملغ: في جانب واحد «NVR» وفي الجانب الثاني «CL».

مسطح سيريتikan 0.25 ملغ. 0.5 ملغ - 0.75 ملغ بسوق ضمن

علبة ذات 60 قرصاً.

صاحب الامتياز والمستورد وعنوانه: نوفاريس إسرائيل מ. ض.. ص. ب. 7126.

تل - أبيب.

أقام سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة.

سيريتكان 0.25 ملغ أقراص: 31066 60 132

سيريتكان 0.5 ملغ أقراص: 31064 58 132

سيريتكان 0.75 ملغ أقراص: 31065 59 132

تم إعدادها في نيسان 2021 بموجب تعليمات وزارة الصحة.

من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه الشارة بصيغة المذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.

CER APL Apr21 V1

٥) كيفية تخزين الدواء؟

• يجب التسليم، يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن منتاوب أيدي و المجال زوجي الأطفال وأو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسوس.

لا تنسى تقييده بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

• لا يجوز إستعمال الدواء بعد إقصاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العلبة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

CER APL Apr21 V1