

עלון לצריך לפי תקנות הרווקחים (תקנירים) התשמ"ו – 1986

התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

בטראן® SR, טבליות בשחרור מושהה

כל טבלייה מכילה דיקלופנאק סodium (Diclofenac Sodium) במינון 100 מ"ג

חומרים בלתי פעילים ואלרגניים בתרופה – ראה סעיף 6 "מידע נוספים" ובסעיף 2 "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה".

קרא בעיון את העلون עד סופו לפני שימוש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח. תרופה זו נרשמה לטיפול עבורך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

1. למה מיועדת התרופה?

טיפול בדלקת מפרקים שగוניות (osteoarthritis), דלקת מפרקים ניונית (rheumatoid arthritis), דלקת מפרק (periarthritis), דלקת הגיד (tendinitis), דלקת בעלתת הגיד (tenosynovitis), דלקת הכסת (bursitis), נקעים, מתיחות ופריקה, דלקת חוליות מקשחת (ankylosing spondylitis) ושיגdon חריף. לשילטה בכאב ודלקת בניותיים אורטופדיים, דנטליים ומינוריים אחרים.

קבוצה רפואיית: נוגדי דלקות שאינם סטרואידים (NSAIDs). NSAIDs מיועדים לשיכוך כאב ודלקת.

2. לפני השימוש בתרופה אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגש (אלרגי) לחומר הפעיל (דיקלופנאק סodium), אספירין, איבופרופן או לנוגדי דלקת שאינם סטרואידים (NSAIDs) אחרים או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה סעיף 6). סימנים של תגובה רגשית יתר כוללים נפיחות הפנים והפה (אנגיאודמה), בעיות נשימה, כאב חזה, נזלת, פריחה בעור או כל תגובה אלרגית אחרת.
- אתה סובל או סבלת בעבר (שני מקרים או יותר) מכיבב בקיבה או במעי או דימום במערכת העיכול (יכולים לכלול הקאה דמית, דימום בעת ריקון מעיים, צואה דמית או צואה שחורה).
- יש לך עבר של בעיות בקיבה או במעי לאחר נטילת NSAIDs אחרים.
- אתה סובל Mai ספיקת הלב, הכליה או הכבד.
- יש לך מחלת לב או מחלת כלי דם במוח, לדוגמה: אם עברת התקף לב, שbez מוח, מיני-שבץ (TIA) או חסימה של כלי דם לב או מוח או צנתור או ניתוח מעקפים.
- יש לך או היי לך בעיות במחוז הדם (מחלת עורקים היקפית).
- את בהריון יותר מ-6 חודשים.

اذירות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה לפני הטיפול בבטרן, ספר לרופא אם:

- אתה סובל מהפרעות בקיבה או במעי כולל דלקת כבית של המעי הגס או מחלת קרונה.
- יש לך בעיות בכליה או בכבד או אם אתה קשייש.
- אתה סובל ממצב הנקרא פורפיריה.
- אתה סובל מהפרעות בדם או הפרעות דימום כלשהן. אם כן, יתכן שהרופא יפנה אותך לבדיקות תקופתיות בזמן השימוש בתרופה.
- אי פעם סבלת מסתמה, דלקת אף אלרגית עונתית, נפיחות של רירית האף (פוליפים באף), מחלות ריאת כרוניות או זיהומים בדרכי הנשימה.

- את מניקה
- אתה סובל מתעוקת חזה, קרישי דם, לחץ דם גבוה, רמות גבוחות של כולסטרול או טריגליקידים.
- יש לך בעיות לב או אם סבלת בעבר משכץ מוחי או אם אתה חושב שאתה עלול להיות בסיכון למכבים אלו (לדוגמה, אם יש לך לחץ דם גבוה, סוכרת או כולסטרול גבוה או אם אתה מעשן).

יש לך סוכרת
אתה מעשן

- אתה סובל מזאתבת אדמנטית מערכת SLE (מחלה אוטואימונית דלקטיבית הגורמת לתסמינים כגון כאבי פרקים, דלקת פרקים, פריחות עוריות, חום) או מצב דומה.

ספר לרופא אם עברת לאחרונה או שאתה עומד לעבור ניתוח בקיבה או במעי לפני נטילת בטן, מכיוון שבطن יכול לפעמים להחמיר את ריפוי הפצעים במעיים שלך לאחר הניתוח.

אם אחד או יותר מהמצבים המפורטים מעלה נסוך לגבייך, היועץ ברופא אחר שייתכן כי בטן אינו מתאים עבורך.

ازהרות מיוחדות נוספת

- אתה צריך לקחת את המנה הנמוכה היעילה ביותר של דיקלופנאק סודים בזמן הקוצר ביותר האפשרי במילוי אם אתה סובל מטה משקל או קשייש.
- יש עליה קטנה בסיכון להתקף לב או שycz כאשר אתה לוקח תרופה כמו דיקלופנאק סודים. הסיכון גבוה יותר, אם אתה לוקח מינון גבוה במשך זמן רב. תמיד עקוב אחר הוראות הרופא לגבי המינון ומשך נטילת התרופה.
- אם בכל עת בזמן נטילת בטן אתה חווה סימנים או תסמינים של בעיותقلب או כלי הדם כגון כאב חזה, קוצר נשימה, חולשה או קושי בדיבור, פנה מייד לרופא.
- בתקופת הטיפול בתרופות מסווג זה, הרופא שלך עשוי להפנות אותך לבדיקות תקופתיות.
- אם יש לך היסטוריה של בעיות בקיבה בזמן נטילת NSAIDs, במיוחד אם אתה קשיש, עליך לספר לרופא מייד אם אתה מבחין בתסמינים בלתי רגילים.
- מאחר שזו תרופה נוגדת דלקת, טבליות דיקלופנאק סודים עשויות להפחית את התסמינים של דיזומ, למשל, כאב ראש וחום גבוה. אם איןך חש בטוב וצריך לפנות לרופא, זכר לספר לו שאתה לוקח טבליות דיקלופנאק סודים.
- תיתכן עליה באזיממי כבד המחייבת הפסקת הטיפול לאחר התיעיצות עם הרופא, لكن טיפול ממושך בתרופה יש לערוך בבדיקות לתפקודו כבד (ראה סעיף 4 "תופעות לוואי").

ילדים

בטן אינו מיועד לשימוש ילדים.

תגובהות בין תרופתיות

אם אתה לוקח, או אם לך תרופה לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופה ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. חלק מהתרופות יכולות להשפיע על טיפולך. ספר לרופא או לרוקח במיוחד אם אתה לוקח:

- תרופות לטיפול בסוכרת.
- נוגדי קריישה (לדילול דם כגון אראפרין)
- משתנים
- ליתיום (טיפול בעקבות נפשיות מסוימות)
- מתוטרקסט (טיפול במחלות דלקטיביות מסוימות ולסוגים מסוימים של מחלת הסרטן)
- ציקלוספורין, טקרולימוס (טיפול במחלות דלקטיביות מסוימות ולאחר השתלים)
- טרימטופרים (תרופה המשמשת למניעה או לטיפול בziehomim בדרכי השתן)
- אנטיביוטיקות משפחת ה-quinolones (טיפול בziehomim)
- תרופות אחרות משפחת NSAIDs או מעכבי-2-COX (ציקלו-אוקסיגנАЗ-2), לדוגמה אספירין או איבופרופן.

- מיפריסון (תרופה המשמשת להפסקת הירין)
- גליקוזידים של הלב (לדוגמה דיגוקסין), לטיפול בעיות לב
- תרופות משפחת-hSAs (מעכבים סלקטיביים של ספיגה חזרת של סרוטוני) (טיפול בדיכאון)
- סטרואידים במתן דרך הפה (תרופות נוגדות דלקת).
- תרופות לטיפול בעיות לב או לחץ דם גבוה, לדוגמה חוסמי בטא או מעכבי אנזים מהפרק אנגiotנסין (ACE).
- ווריקונאזהול (תרופה לטיפול בziehomim פטרייתים)
- פניטואין (טיפול בפרכויסים)
- כולסטיפול/כולסטיראמין (להורדת כולסטרול)

שימוש בתרופה ומדzon
יש ליטול את התרפיה עם או לאחר הארוחה.

הירין, הנקה ופוריות

- למרות שאין זה נפוץ, היי דיווחים על מומים בתינוקות אשר אימוהותיהם נטולו NSAIDs במהלך ההירין. אין ליטול בטן אם את בשלושת חדש ההירין האחרונים, לאחר שתיתacen השפעה על מחזור הדם של התינוק.
- יש להיוועץ ברופא או ברוקח אם את חושבת שאת עשויה להיות בהירין או אם את ב-6 חודשים ההירין הראשונים.
- לתכשיר זה קיימת תופעת לוואי אפשרית של פגיעה קליתית בעובר ומיעוט מי שפיר החיל בשבוע 20 להירין. מומלץ להימנע שימוש בתכשירים משפחת ה-NSAIDs החל בשבוע 20 להירין ולהיוועץ באיש צוות רפואי במידת הצורך.
- נטילת בטן עלולה להקשות עליך להיכנס להירין. היועצי ברופא אם את מתכוננת להיכנס להירין, או אם יש לך בעיות להיכנס להירין.
- יש להימנע מנטילת בטן במהלך ההנקה.

נהיגה ושימוש במכוונות

לעתים, אנשים דיווחו שטבליות דיקלופנאק סודיום גרמו להם להרגיש סחרחות, עיפות או ישנות. בעיות בריאות גם דוחו. אם אתה חש בתופעות אלה, אין לנוהג או להפעיל מכונות.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרפיה
בטן מכיל סוכרוז. אם נאמר לך בעבר על ידי רופא שיש לך סבלות לסוכרים מסוימים, היועץ ברופא לפני נטילת תרפיה זו.
תרופה זו מכילה פחתות מ-1 מילימול (23 מ"ג) נתן לטבלייה, כלומר היא למעשה "נטולת נתן".

3. כיצד תשתמש בתרפיה?

יש להשתמש בתרפיה תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אין בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתרפיה.
המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד. המינון המקביל בדרך כלל הוא: טבלייה אחת ביום. התרפופה אינה מיועדת לילדים.

אין לעבר על המנה המומלצת.

יש לבлев את הטבלייה בשלהמota עם כוס מים, עם או לאחר הארוחה.
אסור לכתוש/לחצות/ללעוס את הטבליות, לאחר שמדובר על טבליות בשחרור מושהה.

יתכן שהרופא יורה לך ליטול בטן בו זמןิต עם תרפיה נוספת אשר מגינה על הקיבה, במיוחד אם סבלת בעבר מבעיות בקיבה או אם אתה קשייש או נוטל תרופות מסוימות אחרות.

אם נטלת בעיות מינון גבוהה יותר

תסמנים של מין יתר יכולם לכלול: כאב ראש, בחילה, הקאה, כאב בטן, דימום בקיבה או במעי, שלשול (לעיטים נדירות), חוסר התמצאות, עירור, תרדמת, נמנום, סחרחות, צלצולים באוזניים, עילפון או לעיתים עוויות (פרוכוסים, התקפים בלתי נשכחים).
אם נטלה מנת יתר או אם בטעות בעלILD מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך.

אם שכחת ליטול את התרופה
חשוב מאוד לא לפספס אף منها. אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן המיעוד, יש ליטולמנה מיד כשנזכרת. אם כמעט הגיע זמן המנה הבאה, דלג על המנה שנשכח וקח את המנה הבאה.
אין ליטול מנה כפולה על מנת לפחות על המנה שנשכח.
אם יש לך בעיה לזכור ליטול את התרופה, ספר על כך לרופא או ברוקח.
יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.
גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם הרופא.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית ומהנה בכל פעע שאתה נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם אתה זוקק להם.
אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, הייעוץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בבטן עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשותת תופעות הלואוי. יתכן שלא תסבול אפילו אחת מהן.

- תופעות לוואי מסויימות עלולות להיות חמורות**
יש להפסיק את השימוש בתרופה ולפנות מיד לרופא בהופעת:
- כאב פתאומי וחזק בחזה (סימנים של אוטם שריר הלב או התקף לב).
 - קוצר נשימה, קשי נשימה בשכיבה, נפיחות الرجالים או כפות الرجالים (סימנים של אי ספיקת לב).
 - הופעה פתאומית של חולשה או חוסר תחושה בפנים, בזרוע או ברגל במיוחד בצד אחד של הגוף;
 - הופעה פתאומית של איבוד ראייה או הפרעה בראייה; קושי פתאומי בדיבור או ביכולת להבini דיבור;
 - כאבי ראש פתאומיים דמיוניים מיגרנה שקרים בפעם הראשונה, עם או בלי הפרעה בראייה. תסמנים אלה יכולים להיות סימן מוקדם של שbez מוח;
 - כאב בטן, קשי עיכול, צרבת, גזם, בחילה או הקאה
 - כל סימן לדימום בקיבה או במעי לדוגמה: בעת ריקון המעיים, הקאה דמית או צואה שחורה צפתת
 - תגבות אלרגיות שיכילות לכלול פריחה בעור, גרד, שטפי דם, אזרורים אדומים כואבים, קילוף או שלפוחיות
 - צפצופים או קוצר נשימה (ברונכוספאזם)
 - נפיחות הפנים, השפטים, הידיים או האצבעות
 - סימנים של הפרעות בתפקודו הכביד (עליה באנדמי כבד – ראה סעיף "ازהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה") כולל אי ספיקת הכביד או סימנים לדלקת בכבד כגון: פריחה או גירוד, כאב או רגשות בטנית, שלשול, שタン כהה, בחילה, עיפות, תסמנים דמיוניים שפעת, או צהבת (הצהבת העור או החלק הלבן בעיניים)
 - כאב גרון מתמשך או חום גבוה
 - שינוי לא צפוי בכמות או בחום גובה
 - התכווצויות מתונות בטן ורגשות בטנית, המופיעות זמן קצר לאחר התחלת הטיפול בבטן, לאחר מכון מופיע דם מפי הטרעת או שלשל דמי, בדרך כלל במשך 24 שעות מהופעת כאב הבطن
 - תסמנת סטיבנס-ג'ונסון (מחלה חמורה עם שלפוחיות בעור, בפה, בעיניים ובאיברי המין)

ספר לרופא מיד אם אתה מבחין בהופעת:
בהתדריות גבואה.

ספר לרופא מיד אם אתה מבחין בהופעת:

- כאב חזה, שיכול להיות סימן של תגובה אלרגית חמורה, הנקראת תסמנונת קונייס

תופעות לוואי גוספות

תופעות לוואי שכיחות (תופעות שufigיות ב-10-1 משתמשים מתוך 100):

- כאב בטן, צרבת, חילה, הקאה, שלשול, קשיי עיכול, גזם, איבוד תיאבון
- כאב ראש, סחרחות, ורטיגו
- פריחה או כתמים בעור
- רמות גבוהות של אנזימי כבד בدم

תופעות לוואי שאין שכיחות (תופעות שufigיות ב-1-10 משתמשים מתוך 1,000):

- דופק מהיר או לא סדר (פלפיטזיות), כאב חזה, הפרעותقلب, כולל התקף לב או קוצר נשימה, קשיי נשימה בשכיבה או נפיחות הרגליים או כפות הרגליים (סימנים של אי ספיקת לב), במיוחד בネットילת מינון גבוהה יותר (150 מ"ג ליום) לזמן ארוך יותר

תופעות לוואי נדירות (תופעות שufigיות ב-1-10 משתמשים מתוך 10,000):

- כיבים או דימום בקיבה (היי דיווחים על מקרים נדירים מאוד שהסתתרו ב轟, במיוחד בקשישים)
- אסטריטיס (דלקת, גירוי או נפיחות של רירית הקיבה)
- הקאה דמית
- שלשול עם דם או דימום מפני הטעבת
- צואה שחורה צפפת
- נמנום, עייפות
- פריחה וגירד בעור
- בצקת (אצירת נזלים), התס敏ינים כוללים נפיחות קרוטוליטים.
- הפרעות בתפקוד כבד, כולל הפטיטיס (דלקת כבד) וצחבת.
- אסתמה (התס敏ינים עשויים לכלול צפצופים בנשימה, קוצר נשימה, שיעול ולחץ בחזה).

תופעות לוואי נדירות מאוד (תופעות שufigיות בפחות מ-10,000):

השפעות על מערכת העצבים:
דלקת קרום המוח (מנינגיטיס), עקצוץ או חוסר תחושה באכזבות, רעד, הפרעות בראשיה כגון טשטוש ראייה או ראייה כפולה, שינויים בטעם, אובדן שמיהה או פגיעה בשמיעת, טינטונג (צלצלים באוזניים), נדודי שינה, סיוטים, שינויים במצב הרוח, דיכאון, חרדה, רגונות, הפרעות נפשיות, חוסר התמצאות, אובדן זיכרון, פרכוים, כאבי ראש יחד עם אי סבלות לאורות בהירים, חום וצואר נוקשה.

השפעות על הקיבה ועל מערכת העיכול:

עיצירות, דלקת בלשון, כיבים בפה, דלקת מצד הפנימי של הפה או בשפתיים, הפרעות במעי הגס (כולל דלקת במעי הגס או החמרה של דלקת בית של המעי הגס או של מחלת קrhoהן).

השפעות על החזה או הדם:

לחץ דם גבוה, לחץ דם נמוך (התס敏ינים יכולים לכלול עילפון, סחרחות), דלקת כלי דם (ויסקווליטיס), דלקת ריאות, הפרעות בדם (כולל אנמיה).

השפעות על הכבד או הכלויות:

הפרעות בכליות או הפרעות חמורות בכבד, כולל אי ספיקת כבד, נוכחות דם או חלבון בשתן.

השפעות על העור או השיער:

נפיחות הפנים, פריחות חמורות בעור כולל תסמנונת סטיבנס-ג'ונסון, טוקסיק אפידרמל נקרוליזיס ופריחות עוריות אחרות שיכולות להחמיר בחשיפה לאור השמש; נשירת שיער.

השפעות על מערכת הרבייה:

אין אוננות.

תופעות לוואי שכיחותן אינה ידועה (תופעות שכיחותן טרם נקבעה): הפרעות בגרון, בלבול, הדיזות, תחושת חולץ (תחושה כללית של אי נוחות), דלקת של העצבים בעין, הפרעות תחשתיות.

תרופות כמו דיקלופנאק עשויות להיות קשורות בעלייה קטנה בסיכון להתקף לב או שbez מוחי.

אם הופעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחייבת או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צינה בעליון, עליך להתייעץ עם הרופא.

ניתן לדוח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דוח על תופעות לוואי עקב טיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופוף המופיע לדוח על תופעות לוואי, או על ידי כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>.

5. איך לאחסן את התרופה?

- מניע הרעללה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמר במקומות סגור מחוץ להישג ידם וטוווח ראייתם של ילדים / או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעללה. אל תגרום להקהה ללא הוראה מפורשת מהרופא. אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה המופיע על גביה האריזה. תאריך התפוגה מתיחס ליום האחרון של אותו חדש.
- **תנאי אחסון:** אחסון מתחת ל- -25°C .
- אין להשליך תרופות לביב או לפח אשפה ביתי. שאל את הרוקח איך להשליך תרופות שאין בשימוש עוד. אמצעים אלו יסייעו להגן על הסביבה.

6. מידע נוסף

נוסך על המרכיב הפעיל, התרופה מכילה גם:

Compressible sugar, cetostearyl alcohol, talc, povidone, silica colloidal anhydrous, hypromellose, magnesium stearate, titanium dioxide (E171), sucrose, macrogol 400, copovidone, gum acacia, carnauba wax, iron oxide red (E172).

כיצד נראה התרופה ומה תוכן האריזה:

טבלייה ורודה, עגולת, קמורה שני הצדדים עם הרטבעה "DICAL100" בצד אחד.
גודלי אരיזות מאושרים: 10, 20, 30 טבליות. יתכן שלא כל גודלי האריזות משווים.

נערך ביוני 2021 בהתאם להנחיות משרד הבריאות

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 00-24619-73-015

שם הפטוטות ולהקלת הקיראה, עליו זה נوشט בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

يُصرن وבעל ريشوم: دكسل بع"م، رח' دكسل 1، أور عקיבاء 3060000، إسرائيل