

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدالة (مستحضرات) - 1986
يسوق الدواء وفق وصفة طبيب فقط.

كلوبيكسول 25 ملغ أقراص	كلوبيكسول 10 ملغ أقراص	كلوبيكسول 2 ملغ أقراص	كلوبيكسول قطرات
التركيب (المادة الفعالة):	التركيب (المادة الفعالة):	التركيب (المادة الفعالة):	التركيب (المادة الفعالة):
Zuclopenthixol (as dihydrochloride) mg 25	Zuclopenthixol (as dihydrochloride) 10mg	Zuclopenthixol (as dihydrochloride)) 2mg	Zuclopenthixol (as dihydrochloride) mg/ml 20 (drop=1 mg 1)
زوكلوپينتيكسول (كهيدروكلوريد) 25 ملغ	زوكلوپينتيكسول (كهيدروكلوريد) 10 ملغ	زوكلوپينتيكسول (كهيدروكلوريد) 2 ملغ	زوكلوپينتيكسول (كهيدروكلوريد) 20 ملغ/مل (1 قطرة=1 ملغ)

مركبات غير فعالة: أنظر البند 6.

- اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها وذلك قبل البدء باستعمال الدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا كانت لديك أسئلة إضافية، فتوجه إلى الطبيب أو إلى الصيدلي.
- هذا الدواء وصف لعلاج مرضك. لا تعطه للآخرين. لأنه قد يضر بهم، حتى لو بدا لك تشابه بين مرضك ومرضهم.
- الدواء غير مخصص للأطفال.

1. لم أعد الدواء؟

الدواء كلوبيكسول مخصص لعلاج الفصام الوخيم ونوبات ذهانية وخيمة أخرى. المجموعة العلاجية: دواء مضاد للذهان، مشتقة ثيوكسنتان.

يحتوي الدواء كلوبيكسول على المادة الفعالة zuclopenthixol. ينتمي الدواء إلى مجموعة أدوية مضادة للذهان (تسمى كذلك neuroleptics). تعمل هذه الأدوية على مسارات عصبية معينة في الدماغ وتساعد في تصحيح حالات معينة من قلة التوازن الكيميائي في الدماغ، ما يؤدي لأعراض مرضك.

2. قبل استعمال الدواء

يُمنع استعمال الدواء إذا:

- وجدت لديك حساسية للمادة الفعالة (Zuclopenthixol) أو لأحد المركبات الأخرى التي يحتويها كلوبيكسول الموجودة في البند 6.
- كنت تحت تأثير الكحول، أدوية قوية ضد الألم (مورفين)، أو أدوية لعلاج الصرع (فينوباربيتال).
- كنت تعاني من انخفاض وخيم في ضغط الدم أو فشل قلبي.
- انتبه: يمنع إعطاء كلوبيكسول لمتعاليين فاقدين للوعي

تحذيرات خاصة متعلقة باستعمال الدواء

قبل بدء العلاج بـ كلوبيكسول، أخبر الطبيب إذا:

- كنت تعاني من مرض كبد:
- كنت تعاني أو كان لديك سابقة من تشنجات أو اختلاجات.
- كان لديك سكري (قد تحتاج لملائمة لجرعة الأنسولين و/أو الأدوية الأخرى لعلاج السكري).
- كنت تعاني من إصابة في الدماغ عقب تسمم كحول أو استعمال مذيبيات عضوية.
- كنت تستهلك كميات كبيرة من الكحول أو أدوية قوية ضد الألم (مورفين وأدوية تشبه المورفين).
- كنت تعاني أو عانيت في الماضي من اعتلال في أداء القلب.
- فرد من عائلتك يعاني من مرض قلب، وتيرة قلب منخفضة أو تغيرات في مخطط كهربية القلب (اطالة مقطع QT).
- كنت تتناول دواء آخر مضاد للذهان (مثلاً: ليثيوم، هالوبيريدول أو برفنزين).
- كنت تعاني من تأخر في التطور.

- كان لديك أو لدى أحد أفراد عائلتك سابقة من ظهور خثرات في الدم، لأنه تبين وجود علاقة بين الأدوية من هذا النوع وتكون خثرات في الدم.

تحذيرات إضافية:

- بعض المرضى (مثلا البالغين، أو من يعانون من هذيان، خرف) كانوا في خطر زائد للتعرض لسكتة دماغية. استشر الطبيب.
- يجب الاتصال بالطبيب على الفور إذا تطورت لديك حمى مع تصلب العضلات والحركة، تعرق زائد وانخفاض في الوعي (علامات لمتلازمة خبيثة مضادة للذهان - malignant neuroleptic syndrome). هذه الحالة قد تشكل خطراً على الحياة وقد تتطلب تدخلاً طبياً فوراً.
- قطرات كلوبيكسول تضر الأشخاص الذين يعانون من إدمان الكحول. حيث ان قطرات كلوبيكسول تحتوي على الإيثانول، على النساء الحوامل والمرضعات، ومرضى الصرع الذين يعانون من أمراض كبد تناول قطرات كلوبيكسول فقط بعد استشارة الطبيب.
- يجب تبليغ الطاقم الطبي بأنك تتلقى العلاج بهذا الدواء عندما تخضع لفحوصات دم وبول. قد يؤثر الدواء على نتائج الفحوصات.

تفاعلات/ ردود فعل بين الأدوية:

إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخراً، أدوية أخرى بما في ذلك الأدوية بدون وصفة طبية والمكملات الغذائية، فأخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك.

وبشكل خاص، يجب إبلاغ الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تتناول:

- أدوية لعلاج اضطرابات في النظم (مثل أميودرون، سوتالول)
- علاج اضطرابات نفسية (مثل ليثيوم، هالوبيريدول، برنزين)
- مضادات الاكتئاب من عائلة التريسيكلينات (مثل أميتريبتالين، إيميبرامين)
- علاج القلق، قلة الهدوء والأرق (مثل ديازيبام، فلونيترازيبام)
- علاج الصرع (باربيتورات مثل فينوباربيتال)
- علاج الباركنسون (مثل بيفريدن، ليفودوبا)
- خفض ضغط الدم (مثل: جوانتيدين)
- علاج التلوثات (أدوية مثل أريثرومايسين، موكسيفلوكساسين)
- علاج أمراض في جهاز الهضم (مثل متوكلوبراميد)
- أدوية أدرينية الصفة، مثلاً لعلاج الربو (مثل سالبوتامول، تربوتالين)
- أدوية ضد التحسس (مضادات هستامين معينة) - استشر الطبيب
- وكذلك أدوية مدرة للبول (مثل بندروفلوماتازيد، فوراسميد)

قطرات كلوبيكسول تحتوي على الإيثانول. يمنع تناول قطرات كلوبيكسول إذا كنت تتلقى العلاج بديزولفيرام (disulfiram)، دواء يستعمل لعلاج الإدمان على الكحول) أو ميترونيدازول (لعلاج التلوث). استشر الطبيب.

قد يكون لكلوبيكسول تفاعلات بين الأدوية مع أدوية معينة، وقد يؤثر كلوبيكسول أيضاً على طريقة عمل الأدوية الأخرى. عادة لا يكون لهذا أهمية عملية. استشر الطبيب أو الصيدلي بخصوص معلومات إضافية.

استعمال الدواء والغذاء

يمكن تناول كلوبيكسول مع أو بدون طعام.

قطرات كلوبيكسول: يمكن تناول القطرات مع ماء، عصير برتقال أو عصير تفاح.

استعمال الدواء واستهلاك الكحول

قد يزيد كلوبيكسول من تأثير الكحول وقد يجعلك تشعر بالنعاس. لذلك يمنع شرب الكحول خلال العلاج بكلوبيكسول.

الحمل، الإرضاع والخصوبة

إذا كنت حاملاً أو مرضعة، تظنين بأنك حامل أو تتوين الدخول في حمل، يجب استشارة الطبيب قبل استعمال هذا الدواء.

الحمل

إذا كنت حاملاً يمنع تناول هذا الدواء إلا إذا أشار الطبيب عليك بالقيام بذلك بشكل واضح.

قطرات كلوبيكسول تحتوي على الكحول. يجب تناول قطرات كلوبيكسول فقط حسب تعليمات الطبيب.

الأعراض التالية قد تظهر في المواليد، الذين ولدوا لأمهات تناولن كلوبيكسول خلال الثلث الأخير من الحمل (الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل): رجفان، تصلب العضلات و/أو وهن عضلات، نعاس، قلة الراحة، صعوبات تنفس وصعوبات في الإطعام. إذا تطور أي من هذه الأعراض لدى طفلك، عليك التوجه إلى الطبيب.

الإرضاع

إذا كنت مرضعة، يجب استشارة الطبيب قبل استعمال الدواء.

الخصوبة

بينت دراسات على الحيوانات بأن كلوبيكسول يؤثر على الخصوبة. يجب استشارة الطبيب.

السياقة واستعمال الماكينات

قد يسبب كلوبيكسول النعاس بدرجة معينة (أكثر أو أقل). يجب أخذ ذلك بعين الاعتبار عند القيادة أو تشغيل ماكينات.

معلومات مهمة عن بعض مركبات الدواء

قطرات كلوبيكسول يحتوي 120 ملغ كحول (إيثانول 96%) في كل مليلتر، وهذه تعادل نحو 14.2%. كمية الكحول في 1 مليلتر من هذا الدواء هي أقل من الكمية في 3 مليلتر من الجعة أو 2 مليلتر من النبيذ.

لن يكون هناك تأثير ملحوظ لكمية قليلة من الكحول الموجودة في هذا الدواء. قطرات كلوبيكسول مضرّة للمدمنين على الكحول.

إذا كنت تستهلك كمية كبيرة من الكحول، تعاني من الصرع أو أمراض كبد، أو إذا كنت حاملاً أو مرضعة يجب التحدث مع الطبيب وتناول الدواء فقط حسب تعليماته.

يمنع تناول **قطرات كلوبيكسول** إذا كنت تتلقى العلاج بـ **ديزولفيرام (disulfiram)**، دواء يستعمل لعلاج الإدمان على الكحول) أو **ميثرونيدازول (لعلاج التلوث)**. استشر الطبيب.

أقراص كلوبيكسول تحتوي على اللاكتوز. إذا قيل لك من قبل طبيبك بأنك تعاني من قلة تحمل لسكريات معينة، استشر الطبيب قبل استعمال أقراص كلوبيكسول.

تحتوي أقراص كلوبيكسول على **Hydrogenated Castor Oil**، وهذا قد يسبب آلام بطن وإسهال.

3. كيف تستعمل الدواء؟

يجب دوماً الاستعمال بموجب تعليمات الطبيب.

عليك أن تفحص مع الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا.

تحدد الجرعة وطريقة تناول من قبل الطبيب فقط. قد تتباين الجرعة وتتعلق بشدة المرض.

الجرعة المتبعة عادة هي:

بالغون

فصام، هوس-مانيا وحالات ذهانية أخرى

جرعة أولية تتراوح بين 10 ملغ و 50 ملغ لليوم (في مستحضر كلوبيكسول قطرات: 10-50 قطرة لليوم). يمكن زيادة الجرعة بشكل تدريجي حتى 75 ملغ لليوم (في مستحضر كلوبيكسول قطرات: 75 قطرة لليوم).

في حالات معينة سوف تكون هناك حاجة لجرعة أعلى بكثير. الجرعة القصوى للجرعة هو 40 ملغ والجرعة القصوى اليومية هي 150 ملغ لليوم (في مستحضر كلوبيكسول قطرات: 150 قطرة لليوم).

جرعة المداومة هي عادة 20-40 ملغ لليوم (في مستحضر كلوبيكسول قطرات: 20-40 قطرة لليوم).

متعالجون لديهم اختطار خاص: للمسنين والمتعالجين الذين يعانون من مشاكل كبد، سوف تعطى عادة الجرعة الأقل في نطاق الجرعات.

الاستعمال في الأطفال

كلوبيكسول غير مخصص للاستعمال في الأطفال.

لا يجوز تجاوز الجرعة الموصى بها

إذا شعرت بأن تأثير الدواء أقوى أو أضعف من اللازم، استشر الطبيب أو الصيدلي.

طريقة الاستعمال:

أقراص: يمنع المضغ! يجب بلع الدواء مع قليل من الماء.

قطرات: يجب أن تعد عدد القطرات المطلوب لداخل المشروب (ماء، عصير برتقال أو عصير تفاح)، وتخلطها وتشرب كل السائل.

في بداية العلاج، عادة يتم تناول كلوبيكسول ب- 2-3 جرعات منفصلة خلال اليوم.

في مرحلة الصيانة من العلاج، يمكن تناول كلوبيكسول بجرعة مرة واحدة في اليوم.

مدة العلاج

كما في الأدوية الأخرى لعلاج الذهان، يمكن أن تنقضي فترة نحو أسبوعين حتى تشعر بتحسن في شعورك. تحدد مدة العلاج من قبل طبيبك. يجب المواظبة على العلاج كما أوصى طبيبك. حتى لو طرأ تحسن في حالتك الصحية يمنع وقف العلاج بالدواء من دون استشارة الطبيب أو الصيدلي، لأن أعراض مرضك قد تعود. لا يجوز تغيير جرعة الدواء من دون استشارة الطبيب.

طريقة الإعطاء

قم ببرم القنبينة وهي مقلوبة رأساً على عقب. في حال لم تخرج أي قطرة منها، أنقر بلطف على القنين ليبدأ الجريان.



إذا تلقيت بالخطأ جرعة أعلى من اللازم

إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا قام طفل بابتلاع كمية من الدواء عن طريق الخطأ، فتوجّه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى، وأحضِر علبه الدواء معك. قم بذلك أيضاً إذا شعرت بسوء أو أعراض جرعة مفرطة.

أعراض ممكنة للجرعة المفرطة:

- نعاس
- قلة الإدراك والتي تتطور إلى غيبوبة
- تقلص العضل، حركات لا إرادية
- حركات عضلات أو تصلب العضلات
- اختلاجات
- ضغط دم منخفض، نبض ضعيف، شحوب، قلة الهدوء
- حرارة جسم منخفضة أو مرتفعة
- تغيرات في وتيرة القلب، يشمل وتيرة قلب غير منتظمة أو وتيرة قلب بطيئة (حدث عندما أعطي أعطى كلوبيكسول بجرعة زائدة سوية مع أدوية تعرف بأنها تؤثر على وتيرة القلب).

إذا نسيت تناول الدواء

إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المطلوب، لا يجوز تناول جرعة مزدوجة. تناول الجرعة التالية في الوقت المعتاد واستشر الطبيب.

إذا توقفت عن تناول الدواء

حتى لو طرأ تحسن في حالتك الصحية لا يجوز التوقف عن العلاج بالدواء من دون استشارة الطبيب. يمكن أن يقرر طبيبك متى وكيف يجب وقف العلاج، لتجنب أعراض غير لطيفة التي قد تظهر في حال وقف تناول الدواء بشكل فجائي (مثلاً، غثيان، تقيؤ، إسهال، رفض الطعام، جريان الأنف، تعرق، ألم عضل، نخز/وخز في الجلد، أرق، قلة الراحة، قلق، عصبية، رجفان، دوخة وشعور بالحر أو البرد).

يمنع تناول الدواء في الظلام! افحص المصق والجرعة بكل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات إذا كنت بحاجة لها.

إذا كان لديك أسئلة إضافية بخصوص استعمال الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

كما في أي دواء، استعمال كلوبيكسول قد يسبب أعراضاً جانبية في بعض المستعملين. لا تفزع من قائمة الأعراض الجانبية. قد لا تعاني من أي منها.

يجب التوجه فوراً إلى الطبيب أو المستشفى إذا شعرت بواحد من الأعراض التالية:

أعراض جانبية وخيمة

أعراض جانبية شائعة (تظهر في 10-1 متعالج من بين 100)

- وتيرة قلب سريعة. توجه للطبيب أو غرفة الطوارئ.

أعراض جانبية غير شائعة (تظهر في 10-1 متعالج من بين 1,000):

- اختلاجات. توجه فوراً للطبيب أو غرفة الطوارئ.

أعراض جانبية نادرة (تظهر في 10-1 متعالج من بين 10,000):

- اضطرابات وخيمة في نشاط القلب يشمل وتيرة قلب سريعة ويحتمل كذلك أن تكون غير منتظمة، ما قد يؤدي لسكتة قلبية. يجب التوجه إلى الطبيب أو غرفة الطوارئ على الفور.
- رد فعل فرط تحسس فجائي مثل الطفح، صعوبات التنفس وغماء (رد فعل تأقي). يجب التوجه فوراً للعلاج الطبي. قد تشكل هذه الحالة خطراً على الحياة.
- نزيف من الجلد والأنسجة المخاطية وكدمات بسبب تغيرات في الدم (تعداد صفائح منخفض). توجه فوراً للحصول على علاج طبي.
- وهن عام، ميل للالتهابات (أنزفة)، خاصة التهاب اللوزتين وحمى بسبب تغيرات في الدم (نقص وخيم في خلايا الدم البيضاء). توجه للحصول على علاج طبي فوري.

أعراض جانبية نادرة جداً (تظهر في أقل من متعالم واحد من بين 10,000):

- حمى عالية، تصلب العضلات بشكل غير معتاد وتغير في حالة الإدراك، تعرق مفرط وخفقان القلب. يجب التوجه فوراً للعلاج الطبي. قد تشكل هذه الحالة خطراً على الحياة.
- التهاب الكبد، اصفرار الجلد وبياض العينين (يرقان). توجه للطبيب أو غرفة الطوارئ.

أعراض جانبية غير وخيمة

أعراض جانبية شائعة جداً، تظهر في أكثر من متعالم واحد من بين عشرة

- حركات لا إرادية، بطيئة أو سريعة أو تصلب أو قلة القدرة على الجلوس براحة أو الوقوف من دون حركة.
- نعاس.
- جفاف في الفم، ما قد يؤدي لارتفاع في خطر التسوس.

أعراض جانبية شائعة، تظهر في 10-1 متعالم من بين 100:

- اكتئاب. في بعض المتعالمين، قد يتطور الاكتئاب ليصبح عارض جانبي وخيم. استشر الطبيب.
- اضطرابات في التبول، يحتمل كذلك احتباس البول. في بعض المتعالمين، قد يتطور الأمر ليصبح عارض جانبي وخيم. استشر الطبيب.
- خفقان قلب سريع.
- رجفان، زيادة تؤثر العضل، دوار.
- صداع، انخفاض في قدرة التركيز، فقدان الذاكرة.
- شعور بالنعز أو وخز أو انخفاض في الشعور بالجلد.
- طريقة مشي غير عادية.
- تشوش الرؤية أو اضطرابات في الرؤية.
- احتقان الأنف، ضيق التنفس.
- زيادة إنتاج اللعاب، امساك، تقيؤ، شعور بمضايقة في البطن، إسهال.
- اضطرابات في التبول، مثلاً الحاح في التبول على فترات متقاربة، تبول لا إرادي.
- تعرق زائد، حكة.
- ألم في العضل.
- زيادة في الشهية، ارتفاع في الوزن.
- وهن، تعب، مضايقة جسدية.
- أرق، قلق، عصبية، أحلام غريبة، قلة الهدوء، انخفاض في الرغبة الجنسية.

أعراض جانبية غير شائعة، تظهر في 10-1 متعالم من بين 1,000:

- حركات بطيئة، غير ارادية، تصلب العضلات
- رجفان اليدين والرأس، تصلب في الحركات وتعابير الوجه، حركات اهتزاز وتلوي، خاصة في الرجلين، انخفاض القوة في العضل.
- اغماء، حركات غير آمنة، اضطراب في النطق، صداع الشقيقة.
- حركات دوران في العينين، توسع الحدقتين.
- ارتفاع في الحساسية للضوضاء، أزيز في الأذنين (طنين).
- آلام بطن، غثيان، انتفاخ في جهاز الهضم.
- طفح، حساسية زائدة في الجلد للشمس، تغيرات في التصبغ، جلد دهني للغاية.
- أكزيما أو تهيج جلدي، نزيف خفيف في الجلد والأنسجة المخاطية.
- إغلاق الفك بسبب تؤثر العضلات في المضغ، وضعية غير طبيعية للرأس.
- انخفاض الشهية، انخفاض الوزن، ظمأ زائد.
- نوبات سخونة، حرارة جسم أقل من المعتاد، حرارة مرتفعة.
- العنة وغياب قذف المنى.
- غياب الذروة الجنسية لدى النساء، جفاف المهبل.
- عدم اكتراث، كوابيس، زيادة الرغبة الجنسية، ارتباك.

أعراض جانبية نادرة، تظهر في 10-1 متعالج من بين 10,000:

- وتيرة قلب سريعة، بطيئة و/أو غير منتظمة. يمكن أن يكون هذا العرض وخيمًا. توجه للطبيب.
- وهن عام، ميل للالتهاب (تلوث) خاصة التهاب اللوزتين وحمل بسبب تغيرات في الدم (انخفاض في تعداد الصفائح). قد تتفاقم هذه الحالة. إذا كنت تطور حمى عليك الاتصال بالطبيب على الفور.
- نبول متواتر، ظمأ، تعب عقب ارتفاع مستوى السكر في الدم (جلوكوز في الدم). في بعض المتعالجين، قد يتطور الأمر لعراض جانبي وخيم. استشر طبيبك.
- ارتفاع في اختطار تصلب الشرايين بسبب ارتفاع الكوليسترول في الدم.
- فرط تحسس.
- تضخم الثديين في الرجال، انتصاب متواصل ومؤلم.
- إفراز الحليب، غياب الدورة الشهرية في النساء.

قد يسبب كلوبيكسول أعراض جانبية إضافية، لن تلاحظها عادة. تشمل هذه تغيرات في نتائج فحوصات مختبر معينة بسبب تأثيرها على الدم، مخطط كهربية القلب والكبد. سوف تعود نتائج الفحوصات للقيم الطبيعية مع وقف العلاج بالدواء.

بلغ عن تكون خثرات دم في الأوردة، خاصة في الرجلين (يتجسد ذلك بانفخاخ، ألم واحمرار في الرجل). قد تنتقل خثرات الدم من مكان لآخر وتنتقل عبر الدم إلى الرئتين وتسبب الألم في الصدر وصعوبات التنفس. إذا ظهر لديك أحد هذه الأعراض، توجه فوراً إلى الطبيب.

في مرضى مسنين يعانون من الزهايمر (الخرف)، بلغ عن ارتفاع بسيط في حالات الوفاة في متعالجين تناولوا أدوية مضادة للذهان بالمقارنة مع من لم يتناولوا أدوية مضادة للذهان.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية أو إذا عانيت من أعراض جانبية غير مذكورة في النشرة، فعليك استشارة الطبيب.

التبليغ عن الأعراض الجانبية:

من الممكن تبليغ وزارة الصحة عن أعراض جانبية من خلال الضغط على الرابط "التبليغ عن أعراض جانبية" نتيجة لعلاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية في موقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يحولك إلى استمارة عبر الإنترنت للتبليغ عن الأعراض الجانبية، أو عبر دخول الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il/>

5. كيف يُخزن الدواء؟

- **تجنب التسمم!** يجب حفظ هذا الدواء، وكل دواء آخر، في مكان مغلق، بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأولاد و/أو الأطفال، وهكذا تتجنب التسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب. يُمنع تناول الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) الظاهر على ملصق القنينة وعبوة الكرتون. تاريخ انتهاء الصلاحية ينسب إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

شروط التخزين:

قطرات: تخزن في الثلاجة (2°C-8°C). يجب حماية القنينة في داخل العبوة لحمايتها من الضوء. بعد الفتح لأول مرة، يجب استعمال القطرات خلال 6 أسابيع وهي مخزنة دون درجة حرارة 25°C.

أقراص 10 ملغ، 25 ملغ: تخزن بدرجة حرارة أقل من 25°C.

أقراص 2 ملغ: تخزن بدرجة حرارة أقل من 25°C بالعبوة الأصلية لحمايتها من الضوء.

يُمنع القاء الأدوية في المراحيض أو في سلة المهملات في البيت. قم باستشارة الصيدلي بالنسبة إلى كيفية التخلص من الأدوية التي لم تعد تستعملها. لتساعد في الحفاظ على البيئة.

6. معلومات إضافية

بالإضافة إلى المادة الفعالة، يحتوي الدواء أيضاً على:

أقراص:

Potato Starch, Lactose monohydrate, Cellulose microcrystalline, Talc, Copovidone, Glycerol Hypromellose (5mPa.s), Castor oil hydrogenated, Magnesium stearate, Red iron Oxide ,85% (E172), Macrogol 6000 NF, Titanium dioxide (E171)

كل قرص كلوبيكسول 2 ملغ يحتوي على 17.4 ملغ لاكتوز مونوهيدرات.
كل قرص كلوبيكسول 10 ملغ يحتوي على 21.6 ملغ لاكتوز مونوهيدرات.
كل قرص كلوبيكسول 25 ملغ يحتوي على 22 ملغ لاكتوز مونوهيدرات.

قطرات: (Purified water, ethanol (96%)). تحتوي القطرات على 14.2% كحول (120 ملغ لكل مل).

كيف يبدو الدواء وماذا تحوي العبوة:

أقراص كلوبيكسول 2 ملغ: قرص مطلي مدور، محدب من الطرفين، بلون أحمر فاتح.
أقراص كلوبيكسول 10 ملغ: قرص مطلي مدور، محدب من الطرفين، بلون أحمر بني فاتح.
أقراص كلوبيكسول 52 ملغ: قرص مطلي مدور، محدب من الطرفين، بلون أحمر بني.
كلوبيكسول قطرات: محلول عديم اللون إلى مائل للأصفر، عديم الرائحة وذو مذاق مائل للمرارة.

تقدم أقراص كلوبيكسول بعبوات تحتوي على 50 أو 100 قرص في علب HDPE.
تقدم 20 مل كلوبيكسول قطرات بعبوة زجاجية ذات قطارة.

صاحب التسجيل وعنوانه:

لوندباك إسرائيل م.ض, چلچالي هيلادا 11، ص.ب 13105، هرتسليا 4672211

اسم المنتج وعنوانه :

H.Lundbeck A/S
Ottiliavej 9
DK-Valby 2500
Denmark

تم تحرير النشرة في حزيران 2021 وفق تعليمات وزارة الصحة.

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة:

أقراص 2 ملغ: 047-84-25485

أقراص 10 ملغ: 047-86-25486

أقراص 25 ملغ: 047-85-25487

قطرات: 047-87-25488

لتبسيط قراءة هذه النشرة وتسهيلها ورد النص بصيغة المذكّر. مع هذا فالدواء معدّ لكلا الجنسين.