نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة (مستحضرات) - 1986
يسوّق الدواء بموجب وصفة طبيب فقط

ستيلنوكس 10 ملغ أقراص

SANOFI

المادة الفعالة وكميتها:
يحتوي كل قرص على: زولپيديم تارترات 10 ملغ Zolpidem Tartrate 10 mg
المواد غير الفعالة ومولدات الحساسية في المستحضر ـ أنظر الفقرة 2 "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء" والفقرة 6 "معلومات إضافية".
إقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.
وُصف هذا الدواء للعلاج من أجلك. لا تعطيه للآخرين. فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن حالتهم الطبية مشابهة لحالتك.
هذا الدواء غير مخصّص للأطفال والمراهقين دون عمر 18 سنة.

1) لأي غرض مخصص الدواء؟
لعلاج قلة النوم.
الفصيلة العلاجية: مواد منومة ومهدئة.

2) قبل إستعمال الدواء
لا يجوز إستعمال الدواء إذا:

- قاسيت ذات مرة من سلوك خارج عن الوعي خلال النوم (مثل سياقة المركبة، تحضير وتناول الطعام، التحدث عبر الهاتف أو ممارسة علاقات جنسية في الوقت الذي لا تكون فيه يقظاً بشكل تام) بعد تناول ستيلنوكس.
- كنت حساساً (أليرجي) للمادة الفعالة (زولپيديم) أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (أنظر الفقرة 6).
- عانيت في الماضي من رد فعل تحسسي لأدوية تحتوي على زولپيديم. أعراض لرد فعل تحسسي خطير لـ زولپيديم يمكن أن تشمل: إنتفاخ الوجه، الشفتين والحنجرة لديك الذي قد يؤدي إلى صعوبة في التنفس أو في البلع.
- كنت تعاني من قصور كبدي خطير.
- شربت الكحول في المساء أو قبل النوم.
- تناولت دواء آخر مخصص لمساعدتك على النوم.
- لم يكن بإمكانك النوم بشكل كامل خلال الليل بعد تناول الدواء (7-8 ساعات) قبل أن يتوجب عليك العودة للنشاط ثانية.

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء:
- **لا يجوز تناول أكثر مما وصف لك من ستيلنوكس.**
- يجب تناول ستيلنوكس مباشرة قبل النوم، ليس أبكر من ذلك.
- لا يجوز إستعمال الدواء لأكثر من أربعة أسابيع متواصلة! إستعمال متواصل يمكن أن يؤدي إلى التعلّق.
- لا يجوز زيادة المقدار الدوائي، حتى لو قل تأثير الدواء بسبب إعادة الإستعمال.
- بالمشابه لمستحضرات أخرى للنوم، إن التوقف عن العلاج غير المراقب قد يترافق في أحيان نادرة بأعراض فطام، مثل: تقلّص العضلات، إرتجاف، عودة الأرق، آلام في البطن، تقيؤات، غثيان، تعرق، إختلاجات.
- **قد يؤدي ستيلنوكس إلى أعراض جانبية خطيرة التي تشمل:**
تصرفات غير واعية خلال النوم، التي أدت إلى إصابة خطيرة ووفاة. بعد تناول ستيلنوكس، قد تنهض من السرير بينما لا تكون يقظا تماما وتمارس نشاطاً لا تعلم بأنك تقوم به (تصرفات غير واعية خلال النوم). في صباح اليوم التالي قد لا تتذكر بأن فعلت شيئاً خلال الليل. هذه الأفعال يمكن أن تحدث مع ستيلنوكس سواء كنت تشرب أو لا تشرب الكحول أو تتناول أدوية أخرى تسبب لك الميل للنوم.
أعراض بُلّغ عنها تشمل:
  - قيادة المركبة ("القيادة خلال النوم")
  - تحضير وتناول الطعام
  - التحدث عبر الهاتف
  - ممارسة علاقات جنسية
  - السير خلال النوم

يجب التوقف عن تناول ستيلنوكس والتوجّه فوراً إلى طبيبك إذا تبيّن لك بأنك قمت بإحدى الأفعال الموصوفة أعلاه بعد تناولك ستيلنوكس.
- إحفظ ستيلنوكس في مكان آمن لتجنب الإستعمال غير الصحيح أو إساءة الإستعمال. إحك لطبيبك إذا أسأت في الماضي إستعمال أو طورت تعلق بالكحول، أدوية تصرف بوصفة طبيب أو مخدرات.
- إذا تطوّر رد فعل تحسسي شديد للدواء الذي يتجلى على شكل وذمة وعائية [وذمة في اللسان، وذمة في المزمار (فتحة الرغامى)، وذمة في الحنجرة (حجرة الصوت)]، فلا يجوز إستعمال هذا الدواء ثانية.
- لدى المسنين ـ يجب إستعمال البنزوديازيبينات وأدوية مشابهة بحذر، وذلك بسبب وجود خطورة للميل للنوم و/أو إرتخاء عضلات الذي من الممكن أن يؤدي للسقوطات، في أوقات متقاربة مع أبعاد جدية على هذه الفئة.
- يفضل إستعمال مقداراً دوائياً مخفّضاً (5 ملغ) لدى المسنين، النساء والمتعالجين الذين لديهم مشاكل في الأداء الوظيفي الكبدي، أنظر الفقرة 3.
- إن إستعمال ستيلنوكس سوية مع أدوية أخرى ذات تأثير مهدئ (مثل، أدوية من فصيلة البنزوديازيبينات، الأفيونات، مضادات إكتئاب معينة، الكحول) يزيد الخطورة لتثبيط الجهاز العصبي المركزي. إذا تم تناول ستيلنوكس سوية مع تلك الأدوية، فعلى الطبيب المعالج أن يدرس ملاءمة المقدار الدوائي لتلك الأدوية. لا يجوز تناول ستيلنوكس سوية مع أدوية ذات تأثير منوم مهدئ (بما في ذلك أدوية أخرى تحوي زولپيديم) قبل النوم أو في الليل، إلا إذا أوصى طبيبك بذلك.
- إن الخطورة لحدوث ضرر نفسي حركي في صباح اليوم التالي لتناول ستيلنوكس، بما في ذلك تضرر القدرة على السياقة، تزداد في حال تناول الدواء قبل النوم بدون إمكانية النوم لمدة 7-8 ساعات، في حال تناول مقداراً دوائياً أكبر مما أوصى به الطبيب، في حال تناوله بمشاركة أدوية أخرى تثبط الجهاز العصبي المركزي أو الكحول، أو في حال تناوله بمشاركة أدوية أخرى يمكنها أن ترفع نسب زولپيديم في الدم. في هذه الحالات على المتعالجين توخّي الحذر بالنسبة للسياقة أو أي فعالية أخرى التي تتطلب أداء دماغي ويقظة تامة.
- قد يؤدي ستيلنوكس لتشوش ولتدني مستوى اليقظة، حيث قد تسبب السقوطات، ونتيجة لذلك حصول إصابات خطيرة أيضاً. بُلّغ عن حدوث إصابات خطيرة مثل كسور في الفخذ ونزف داخل الجمجمة.

قبل العلاج بالدواء إحك للطبيب إذا:
- لديك سابقة لإكتئاب، أمراض نفسية أو أفكار إنتحارية.
- لديك سابقة لإساءة إستعمال الكحول أو الإدمان عليه.
- كنت تعاني من مرض في الكلية أو من مرض كبدي.
- كنت تعاني من مرض رئوي أو من مشاكل في التنفس.
- كنت في فترة الحمل، تخططين للحمل، ترضعين أو تخططين للإرضاع.

الأطفال والمراهقون:
لا يوصى بإستعمال الأقراص لعلاج الأطفال والمراهقين دون عمر 18 سنة لأنه لم تثبت نجاعة وسلامة إستعمال الدواء لدى هذه الفئة العمرية.

التداخلات/التفاعلات بين الأدوية
إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخراً أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إحك للطبيب أو الصيدلي عن ذلك. يجب إبلاغ الطبيب أو الصيدلي بالأخص إذا كنت تتناول:
أدوية مثبطة للجهاز العصبي المركزي، مثل أدوية من فصيلة البنزوديازيبينات، المستحضرات الأفيونية، مضادات الإكتئاب ثلاثية الحلقة والكحول ـ أنظر فقرة "تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء".
سيرترالين، فلوأوكسيتين، فلوڤوكسامين ـ مضادات إكتئاب.
كلورپرومازين، هالوپيريدول ـ لعلاج الأمراض النفسية.
St. John's wort (هيپريكوم).
ريفامپين، سيپروفلوكساسين ـ لمعالجة التلوثات.
كيتوكونازول ـ لمعالجة الفطريات.
قد تؤثر الأدوية على عمل الواحد على الآخر وأحياناً إلى حدوث أعراض جانبية خطيرة.
لا تتناول ستيلنوكس مع أدوية أخرى التي قد تسبب لك الميل للنوم إلّا إذا تلقيت توجيه بذلك من طبيبك.
تعرف على الأدوية التي تتناولها. إحفظ قائمة بالأدوية الخاصة بك لتريها لطبيبك وللصيدلي في كل مرة تتلقى فيها دواء جديد.

إستعمال الدواء والطعام
لا يجوز تناول الدواء مع وجبة الطعام أو مباشرة بعد وجبة الطعام. إن فعالية الدواء تكون أسرع إذا تم تناوله على معدة خاوية.

إستعمال الدواء وإستهلاك الكحول
لا يجوز شرب النبيذ أو المشروبات الروحية خلال فترة العلاج بالدواء.

الحمل، الإرضاع والخصوبة
إذا كنت في فترة الحمل أو تخططين للحمل، مرضعة أو تخططين للإرضاع، يجب إستشارة الطبيب قبل إستعمال الدواء.
إذا كنت في فترة الحمل، تخططين للحمل، تحدثي مع طبيبك عن الخطورة للجنين إذا إستعملت ستيلنوكس.
إن إستعمال ستيلنوكس في الثلث الأخير من الحمل قد يؤدي إلى صعوبات في التنفس أو إلى ميل زائد للنوم لدى المولود. يجب متابعة علامات الميل للنوم (أكثر من المعتاد)، مشاكل في التنفس أو إرتخاء لدى حديث الولادة، وذلك إذا تم تناول ستيلنوكس خلال فترة نهاية الحمل.
إذا كنت مرضعة أو تخططين للإرضاع، فإن ستيلنوكس ينتقل إلى حليب الأم. إستشيري الطبيب بخصوص الطريقة الأفضل لإطعام رضيعك خلال فترة إستعمالك لـ ستيلنوكس.

السياقة وإستعمال الماكنات
إن إستعمال الدواء قد يضر باليقظة لذا يلزم الحذر أثناء سياقة المركبات، تشغيل ماكنات خطرة وبأي نشاط يتطلب اليقظة.
من المحتمل أن تشعر بدوار، حتى في اليوم التالي لتناول ستيلنوكس.
إن الخطورة لحدوث ضرر نفسي حركي، بما في ذلك تضرر القدرة على السياقة، تزداد في حال تناول الدواء قبل النوم بدون إمكانية النوم لمدة 7-8 ساعات، في حال تناول مقداراً دوائياً أكبر مما أوصى به الطبيب، في حال تناوله بمشاركة أدوية أخرى تثبط الجهاز العصبي المركزي أو الكحول، أو في حال تناوله بمشاركة أدوية أخرى يمكنها أن ترفع نسب زولپيديم في الدم.
قد يؤثر الدواء على قدرتك على التركيز في اليوم التالي حتى لو شعرت بأنك مستيقظاً تماماً.
من يقود مركبة ومن يشغل ماكنات عليه أن يعلم بأنه بالمشابه للأدوية المنومة الأخرى (أدوية للنوم)، قد تكون هنالك خطورة محتملة لأعراض جانبية تشمل نعاس، إستطالة زمن الإستجابة، دوار، ميل للنوم، تشوش/إزدواجية الرؤية، ضعف اليقظة وخلل في السياقة في صباح اليوم الذي يلي تناول العلاج. من أجل تقليل الخطورة يوصى بالنوم لليلة كاملة (7-8 ساعات).

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء
يحتوي الدواء على **لكتوز.** إستشر طبيبك قبل بدء إستعمال الدواء إذا كنت تعاني من عدم تحمل لسكريات معينة.

3) كيفية إستعمال الدواء؟
يجب إستعمال المستحضر دائماً حسب تعليمات الطبيب.
عليك الإستيضاح من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقاً بخصوص المقدار الدوائي وطريقة العلاج بالمستحضر.
المقدار الدوائي وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط.
المقدار الدوائي الإعتيادي عادة هو:
عند الحاجة، بالإمكان تناول قرص واحد فقط من ستيلنوكس في الليل، مباشرة قبل النوم.

المقدار الدوائي الإبتدائي الإعتيادي عادة هو: للنساء ـ 5 ملغ (نصف قرص) مرة في اليوم. للرجال 5-10 ملغ مرة في اليوم.
لدى المسنين ومتعالجين لديهم مشاكل بوظيفة الكبد، فإن المقدار الدوائي هو 5 ملغ (نصف قرص) مرة في اليوم. لا يجوز الإستعمال إذا تم تشخيص قصور شديد في الكبد.
لا يجوز تجاوز مقدار دوائي قدره 10 ملغ مرة في اليوم، مباشرة قبل النوم.
يجب التأكد من أنه بإمكانك النوم 7-8 ساعات بعد تناول الدواء.
لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به من قِبل الطبيب المعالِج.
لا تتناول ستيلنوكس إذا شربت الكحول في نفس المساء أو قبل النوم.
لا يجوز تناول ستيلنوكس مع وجبة الطعام أو مباشرة بعدها. بإمكان ستيلنوكس أن يساعدك على النوم بشكل أسرع وذلك إذا قمت بتناوله على معدة خاوية.
فترة العلاج
فترة العلاج العادية بالدواء هي يومين حتى أربعة أسابيع.
توجه لطبيبك إذا تفاقمت أو لم تتحسن حالة الأرق لديك خلال 7-10 أيام. قد يدل هذا الأمر بأن هنالك حالة طبية أخرى تسبب مشاكل النوم. لدى بعض المتعالجين، إن النسب الأعلى للدواء في الدم في الصباح، بعد تناول 10 ملغ قبل النوم، تزيد الخطورة لتضرر اليقظة، وتضرر القدرة على السياقة والقدرة على التركيز.
الأقراص غير مخصّصة للأطفال والمراهقين دون عمر 18 سنة.
طريقة التناول
يجب بلع القرص بشكله الكامل، إلّا إذا أمرك الطبيب بتناول 5 ملغ (نصف قرص).
بالإمكان شطر القرص.
لا تتوفر معلومات حول السحق/المضغ.
إذا تناولت بالخطأ مقداراً دوائياً أكبر أو إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء توجه حالاً إلى الطبيب أو لغرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر علبة الدواء معك.
إذا نسيت تناول الدواء:
يجب تناول الدواء مباشرة قبل النوم وفقط إذا كنت تستطيع النوم بعد ذلك 7-8 ساعات على الأقل. إذا نسيت تناول الدواء قبل النوم، فلا يجوز تناول مقداراً دوائياً بأي وقت آخر لأنه من الجائز أن تشعر بنعاس، بدوار وإرتباك خلال اليوم.
لا يجوز تناول مقداراً دوائياً مضاعفاً كتعويض عن المقدار الدوائي المنسي. تناول المقدار الدوائي التالي في الموعد الإعتيادي وإستشر الطبيب.
يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب.
لا يجوز التوقف عن العلاج بـ ستيلنوكس بدون إستشارة الطبيب وعندها فقط بشكل تدريجي، حتى ولو طرأ تحسّن على حالتك الصحية.
إذا توقفت عن تناول الدواء:
في اليوم أو اليومين اللذيْن يليان التوقف عن تناول الدواء للنوم من الجائز أن تظهر ردود الفعل التالية: مشاكل في النوم، غثيان، تورد، دوار، بكاء خارج عن السيطرة، تقيؤ، تقلصات بطنية، نوبة من القلق، عصبية وألم بمنطقة المعدة.
لا يجوز تناول الأدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.
إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.

4) الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال ستيلنوكس قد يسبب أعراضاً جانبية عند بعض المستعملين. لا تندهش من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني أياً منها.
أعراض جانبية خطيرة تشمل:
- الخروج من الفراش بالوقت الذي لا تكون فيه يقظاً تماماً وتنفيذ أعمال لست مدركا لإنجازها (أنظر فقرة "تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء").
- أفكار وتصرفات غير عادية. الأعراض تشمل تصرف إجتماعي أو عدواني أكثر من المعتاد، إرتباك، هيجان، هلوسة، تفاقم الإكتئاب وأفكار أو أعمال إنتحارية.
- فقدان الذاكرة.
- قلق.
- ردود فعل تحسسية شديدة. الأعراض تشمل إنتفاخ اللسان أو الحنجرة ومشاكل في التنفس. توجّه لتلقي علاج طبي طارئ إذا ظهرت لديك تلك الأعراض بعد تناول ستيلنوكس.
- سقوطات التي قد تؤدي إلى إصابات خطيرة.

يجب الإتصال مباشرة بالطبيب إذا ظهر أي عرض جانبي من الأعراض الجانبية الموصوفة أعلاه أو أعراض جانبية أخرى تثير قلقك خلال فترة إستعمال ستيلنوكس.
أعراض جانبية **شائعة** (تؤثر على أكثر من 1/100 من المتعالجين):
جفاف في الفم، ضعف، السير بطريقة غير مستقرة (ataxia)، إرتباك، نعاس، الشعور بضبابية أو الشعور بأنك تحت تأثير مادة مخدرة، نشوة، صداع، أرق، دوار، ڤيرتيغو، إسهال، مشاكل هضمية، حازوقة، غثيان، إلتهاب الجيوب الأنفية، إضطرابات في الرؤية، تلوثات في المسالك البولية، ألم مفصلي، ألم عضلي، تلوث بمسالك التنفس العليا، تلوث بمسالك التنفس السفلى.
أعراض جانبية **غير شائعة** (تؤثر على بين 1/100 إلى 1/1000 من المتعالجين):
تعرق زائد، شحوب، إنخفاض ضغط الدم عند الإنتقال إلى وضعية الوقوف، إغماء، آلام في الصدر، وذمة، سقوطات (التي قد تؤدي إلى إصابات خطيرة)، إرهاق، سخونة، شعور عام سيء، صدمة، إضطرابات في الأوعية الدموية الدماغية، فرط ضغط الدم، نبض سريع، هيجان، قلق، تدني الأداء الوظيفي الدماغي، الشعور بإنفصال، صعوبات في التركيز، خلل في النطق، عدم إستقرار عاطفي، هلوسة، نقص الحس، أوهام، تقلصات عضلية في الرجلين، شقيقة، عصبية، مشكلة في الشعور، النوم (بعد تناول الدواء خلال النهار)، فتور الحواس، إرتجاف، قلة الشهية للطعام، إمساك، خلل في البلع، نفخة (غازات)، إلتهاب في الجهاز الهضمي، تقيؤات، تلوث، خلل في وظيفة الكبد وإرتفاع نسب الخمائر، فرط سكر الدم، عطش، إلتهاب المفاصل، عدم إنتظام الدورة الشهرية، إلتهاب المهبل، إلتهاب القصبات الهوائية، سعال، ضيق التنفس، إلتهاب الأنف (rhinitis)، حكة، تهيج في العين، ألم في العين، إلتهاب في العين، تغير في المذاق، طنين في الأذنين، إلتهاب في المثانة البولية، قلة السيطرة على التبول.
أعراض جانبية **نادرة** (تؤثر على أقل من 1/1000 من المتعالجين):
إضطرابات في الرؤية، تغيرات في اللعاب، تورّد، چلوكوما، إنخفاض ضغط الدم، عجز جنسي، إفراز زائد للعاب، شعور كاذب بالحاجة للتغوط، رد فعل تحسسي، تفاقم الحساسية، صدمة إستهدافية، وذمة في الوجه، هبات من الحر، سرعة تثفل كريات الدم الحمراء، ألم، متلازمة تململ الساقين، تصلب العضلات، زيادة التحمل للدواء، إنخفاض الوزن، ذبحة قلبية، عدم إنتظام نظم القلب، إلتهاب في الشرايين، مشاكل في الدورة الدموية، فرط نبض القلب، تفاقم في إرتفاع ضغط الدم، نوبة قلبية، إلتهاب الأوردة، دوالي، إنصمام رئوي، وذمة في الرئتين، تسرّع القلب البطيّني، إضطرابات في المشي، أفكار غير عادية، رد فعل عدواني، لا مبالاة، زيادة الشهية للطعام، تناقص الرغبة الجنسية، أفكار باطلة، خرف (dementia)، إضطرابات في النطق، إنعدام الشخصية، شعور غريب، إضطرابات في الحركة، نقص التوتر في العضلات، هستيريا، الشعور بالثمل، رد فعل هوسي، ألم عصبي، إلتهاب أعصاب، إعتلال عصبي (مرض الجملة العصبية المحيطية)، إضطرابات في الأعصاب، نوبات هلع، شلل جزئي، إضطرابات في الشخصية، المشي خلال النوم، محاولات للإنتحار، تقلص خطير للعضلات، تثاؤب، إلتهاب الأمعاء، تجشؤ، تقلصات في المريء، إلتهاب في المعدة، بواسير، إنسداد الأمعاء، نزف من الشرج، تسوس في الأسنان، فقر الدم، نسب مرتفعة من الهيموغلوبين، إنخفاض في تعداد خلايا الدم البيضاء، تضخم الغدة الليمفاوية، فقر الدم الكبير الكريات، طفح على شكل بقع، خثار (thrombosis)، خراج (abscess)، هرپس، حلأ نطاقي، إلتهاب الأذن الوسطى أو الخارجية، إرتفاع نسبة البيليروبين، إرتفاع في خمائر الكبد، نقرس، نسب مرتفعة من الكولسترول أو الشحوم في الدم، إضطرابات في الأداء الوظيفي للكلى، وذمة حول العينين، مرض في المفاصل، ضعف عضلي، ألم يمتد للرجل، إلتهاب الوتر، أورام في الثديين، آلام في الثديين، تشنج القصبات الهوائية، تثبيط التنفس، رعاف، تناقص الأكسجين في الدم، إلتهاب الحنجرة، إلتهاب الرئتين، حب الشباب، طفح حويصلي، إلتهاب الجلد، طفح متقيح، حساسية للضوء، شرى، إلتهاب الملتحمة، تقرح في قرنية العين، إضطرابات في إفراز الدمع، إضطراب في تشخيص الروائح، وميض من الضوء، فشل كلوي خطير، ألم أو تكرر التبول، بوال ليلي، زيادة كمية البول، إلتهاب الكلى، آلام في الكلى، إحتباس البول.
أعراض جانبية **بشيوع غير معروف:**
تضرر شديد في الكبد مع أو بدون يرقان.
أعراض جانبية عند التوقف عن تناول الدواء ـ أنظر التفاصيل في الفقرة 3.
إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية، أو إذا إستمرت لأكثر من عدة أيام أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك إستشارة الطبيب.
بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك للنموذج المباشر للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط:
/https://sideeffects.health.gov.il

5) كيفية تخزين الدواء؟

تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأطفال و/أو الرضع وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنقضاء تاريخ الصلاحية (exp. Date) الذي يظهر على ظهر العلبة.
يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
شروط التخزين: يجب التخزين بدرجة حرارة دون 25 درجة مئوية.

6) معلومات إضافية

يحتوي الدواء بالإضافة للمادة الفعالة أيضاً:
Lactose monohydrate, microcrystalline cellulose, hypromellose, sodium starch glycolate (type A), titanium dioxide suspension, magnesium stearate and macrogol 400.
يحتوي كل قرص على 90.4 ملغ لاكتوز مونوهيدرات.
كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة: قرص مطلي بلون أبيض/كريم. تتوفر علب ذات 20 قرص.
لا تجتوي هذه النشرة على كافة المعلومات عن المستحضر. إذا توفر لديك أي سؤال أو إذا لم تكن واثقاً من أمر ما، الرجاء توجه للطبيب.
صاحب الإمتياز والمستورد وعنوانه: سانوفي ـ أڤنتيس إسرائيل م.ض.، ص.ب. 8090 نتانيا 4250499.
تم إعدادها في أيار 2021 بموجب تعليمات وزارة الصحة.
رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: 1045127587
من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.