

نيسوق الدواء بموجب وصفة طبية فقط

دولوكس تيفع 30 ملغ
كيسولات مضادة للحموضة
في المعدة

المادة الفعالة:
تحتوي كل كيسولة على:
دولوكستين (على شكل
هيدروكلوريد) 30 ملغ

Duloxetine (as hydrochloride) 60 mg
Duloxetine (as hydrochloride) 30 mg
لعماد فيع والفعالة والمثيرة للحساسية في المستحضر أنظر الفصل 6 -
معلومات إضافية" والفصل 2 "معلومات مهمة عن قسم من مركبات الدواء".
اقرأ النشرة بعناية حتى يفهمها وذلك قبل البدء باستخدام الدواء.
تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا كنت تريد
أسئلة إضافية، توجه إلى الطبيب أو الصيدلي. وصف هذا الدواء لعلاج
مرضك، لا تعالجه لأخرين؛ لأنه قد يضرهم، حتى لو بدا لك تشابه بين
مرضك ومرضهم.

تزيد الأدوية المضادة للاكتئاب والقلق من سرعة حدوث شلوك أفكار
وتفكيرية لدى الأطفال، والمراهقين، والبالغين الصغار حتى جيل 24 عاماً.
بعد العلاج بالقلق، على المعالجين من كل الأعمار وأقاربهم، متابعة
الاعراض السلوكية مثل: تقاطع الأفكار، أفكار انتحارية، عداوية، وغير
ذلك. إذا طرأت تغييرات كهذه، يجب التوجه إلى الطبيب فوراً.

1. لم أعد هذا الدواء؟
يستخدم دولوكس تيفع لعلاج البالغين الذين يعانون من:
• الاكتئاب • اضطراب القلق العام (تشمع مزمن بالقلق أو بالحصية)
• ألم الاعتلال العصبي المرتبط بالاكتئاب العصبي الشدي الميكانيكي
• الألم الاعتلاقي اللففي (Fibromyalgia) • ألم العضلات الهيكلية
الزمن من حال لا يمكن إعطاء علاج آخر أو في حال فشل علاج سابق
المجموعة العلاجية:
ينتمي دولوكس تيفع إلى عائلة أدوية الـ SNRI، وهو يؤدي إلى ارتفاع
مستويات السيروتونين (serotonin) والنورادرينالين (noradrenaline).

2. قبل استعمال الدواء

يمنع استعمال الدواء إذا:

- كنت حساساً (لذاتية حساسية) للمادة الفعالة أو لأحد المركبات الأخرى التي يحتوي عليها الدواء (أنظر الفصل 6 "معلومات إضافية").
- كنت تعاني من مرض في الكبد.
- كنت تعاني من مرض في القولون.
- كنت تتناول أو تناولت خلال الـ 14 يوماً الأخيرة دواء آخراً مشابهاً لـ Monamine Oxidase (MAOI - Monoamine Oxidase Inhibitor)، بما في ذلك مثيلين بلو عبر الوريد، والمضاد الحيوي لينزوليد؛ لا يجوز البدء بالعلاج بأدوية من نوع مثبطات مومامين أو أكسيداز، إلا بعد الـ 5 أيام على الأقل منذ التوقف عن العلاج بدولوكس تيفع؛ انظر "التفاعلات بين الأدوية".
- كنت تتناول ليوريزادين.

تحذيرات خاصة متعلقة باستخدام الدواء
الزرق ضيق الزاوية (Angle Closure Glaucoma) – إن توسع الزاوية، يؤدي يحدث أحياناً بسبب استعمال الأدوية المضادة للاكتئاب مثل دولوكس تيفع، لدى معالجي ذوي مبنى ضيق في زاوية العين، والذين لم يخضعوا لعملية جراحية لاستئصال الزرقحة، قد يؤدي إلى حدوث حالة زرق من نوع ضيق الزاوية.

قبل العلاج بدولوكس تيفع، أخبر الطبيب إذا كنت:

- مرضية
- حاملاً أو تحابليين أو تصبغي حاملاً أثناء تناول دولوكس تيفع
- تعاني من مرض في الكلى
- تعاني أو عانيت في الماضي من اختلاجات (نوبات)
- تعاني من الاكتئاب (Mania) أو من الهوس (Manic depression)
- تعاني من مشاكل في العينين، مثل أنواع معينة من الزرق (ضغط مرتفع داخل العين)

تعالج أو عانيت في الماضي من خلل في وظيفة الكبد أو إذا كنت متشككة كيميائياً كبيرة من الكحول – من شأن استهلاك كيميائيات كبيرة من الكحول بالترتيب مع تناول دولوكس تيفع (أو يلحق ضرراً بالكبد)
• تعاني من عاتيت في الماضي من نزفة عبر طبيعته (مثل تضيق رايكات)
• تعاني من مستويات صوديوم منخفضة أو إذا كنت معرضاً لخطر انخفاض مستويات الصوديوم (مثلاً إذا كنت تتناول أدوية مژمة للبول، لا سيما إذا كنت مسنناً)
• تعاني من مشاكل في القلب أو ضغط دم مرتفع وإذا كنت تتناول أدوية لخفض ضغط الدم

• تعاني من السكري (قد يلحق العلاج بدولوكس تيفع ضرراً في توازن مستويات السكر لدى بعض المرضى)
• تعاني من بطء في وتيرة إفراج المعدة
• ذو ماضٍ من سوء استعمال الأدوية

أفكار انتحارية وتفكيرية للاكتئاب أو اضطراب القلق
من المعروف أن الاكتئاب والاضطراب ابات النفسية الحادة الأخرى تشكل عوامل الخطورة الأعلى والبالغين الانتحار. رغم ذلك، شوهدت لدى قسم من الأولاد، المراهقين، والبالغين الصغار الذين تناولوا أدوية مضادة للاكتئاب، زيادة في الأفكار والاعمال الانتحارية، بالأخص عند بدء العلاج، أو عند تغيير الجرعة. إذا كنت تعاني من الاكتئاب و/أو من اضطراب القلق، من الممكن أن تزداد أحياناً أفكاراً لإلحاق الأذى بنفسك أو الانتحار. قد تظهر هذه الأفكار بوتيرة أعلى عند البدء بتناول أدوية مضادة للاكتئاب، وتحدث عادة في الأشهر الأولى من العلاج، أو عند تغيير الجرعة الدوائية.

يُحتمل أن يزداد الميل لديك للتفكير بمثل هذه الأفكار إذا:
• كنت لديك في الماضي أفكار انتحارية أو أفكار لإلحاق الضرر بنفسك.
• كنت بالغاً شاباً. قد أظهرت معلومات جُعبت من تجارب سريرية خطأً مزمياً يدلون التفكير لدى البالغين الذين اعاملهم أقل من 24 عاماً، الذين يعانون من حالات نفسية، وقد عولجوا بتدوية مضادة للاكتئاب.
• كنت تعاني (أو لديك ماضٍ عائلي) من اضطراب ثنائي القطب (Manic depression).

• **التأثير على التغيير بطرق علاج المزاج، السلوك، الاعمال، الأفكار أو المشاعر، وبالأخص على التغييرات المفاجئة.** إذا كانت لديك أي وقت أفكار لإلحاق الضرر بنفسك أو أفكار انتحارية، اتصل بالطبيب أو توجه فوراً إلى المستشفى، اطلب بشكل خاص إلى هذه التغييرات في بداية العلاج، وبعد تغيير الجرعة الدوائية.

قد تم الإبلاغ عن الأعراض التالية لدى البالغين، الأولاد، والمراهقين الذين عولجوا بأدوية مضادة للاكتئاب: قلق، تامل، نوبات هلع، أرق، عصبية عداوية، عداوية، نفاخ، تامل حركي (نقص الارتياح النفسي-الحركي)، هوس شغيف، وهوس. لم تُثبت العلاقة بين ظهور هذه الأعراض وبين تقاطع الاكتئاب و/أو ظهور محفزات انتحارية، لكن تبين أنها تشكل علامات أولية لسوء التفكري.

قد يكون من الصعب أن تحبّر أحد أفراد العائلة أو صديق مقرب أنك تعاني من الاكتئاب أو من اضطراب القلق، وأن تطلب منهم قراءة هذه النشرة. يمكنك أن تطلب منهم إخبارك فيما إذا كانوا يعتقدون أن الاكتئاب أو القلق لديك أذيان في التقاطع، أو فيما إذا كانوا قلقين بشأن تغييرات تطرأ على سلوكك إضافة إلى ذلك، عليك الحرص على حضور كل اللقاءات مع الطبيب المتعالج.

يوصى بأن يراقب المتعالجون وأفراد أسرهم التغييرات التي تطرأ على المزاج والسلوك، مثلاً: زيادة القلق، نوبات الهلع، التامل وعدم الهنوء، الهوس أو الهوس العنيف، والدوائية أو اضطراب في النوم، بالأخص عند بدء العلاج وعند تغيير الجرعة الدوائية. في حال حدوث تغييرات كهذه، يجب التوجه إلى الطبيب فوراً. يجب الحرص على العمل بشكل خاص وفق هذه النصيحة لدى المعالجين الصغار الذين اعاملهم 18-24 سنة.

الاستعمال لدى الأولاد والمراهقين دون سن 18 عاماً
دولوكس تيفع ليس معاداً لعلاج الأولاد والمراهقين دون سن 18 عاماً.

التفاعلات بين الأدوية
إذا كنت تتناول أو تتناول موزعاً، أدوية أخرى بما فيها أدوية الـ **وصفة طبية ومكملات غذائية**، أخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك. يمكن إبلاغ الطبيب أو الصيدلي بشكل خاص إذا كنت تتناول:

- مستحضرات أخرى تحتوي على دولوكستين مثل ينتريف (Yentreve).
- يجب الانتباه عن استعمالها بالترتيب مع هذا الدواء. استشر الطبيب لمعرفة إذا كنت تتناول أدوية أخرى تحتوي على دولوكستين.
- مثبطات مومامين أو أكسيداز (MAOIs - Monoamine Oxidase Inhibitors) - تجنب تناول دولوكس تيفع إذا كنت تتناول أو تتناول موزعاً (في الـ 14 يوماً الأخيرة)، دواءً من نوع مثبط مومامين أو أكسيداز (MAOI) - إن تناول مثبط مومامين أو أكسيداز (مثل مثيلين بلو داخل الوريد أو لينزوليد) سوياً مع أدوية كثيرة تصروف بوصفة طبية، بما في ذلك دولوكس تيفع، من شأنه أن يؤدي إلى أعراض جانبية جادة قد تشكل خطراً على الحياة. عليك الانتظار لمدة 14 يوماً على الأقل بعد التوقف عن تناول مثبط مومامين أو أكسيداز قبل أن تستطيع تناول دولوكس تيفع. كما عليك الانتظار لمدة 5 أيام على الأقل بعد أن تتوقف عن تناول دولوكس تيفع وقبل أن تستطيع تناول مثبط مومامين أو أكسيداز.

- أدوية التي ترفع مستوى السيروتونين - تزيد هذه الأدوية من خطر حدوث متلازمة السيروتونين (أنظر الفصل 4 "الأعراض الجانبية")
- مسكّنات الألم قوية مثل ترامادول (tramadol) وفينتانيل
- تريبتانات (المرحاح العصبي) (triptans) لعلاج الصداع النصفي)
- تريپتوفان (tryptophan) - مصدر أميني متوفر في الأغذية، في محاليل الترسيب للكتئاب، وفي المكملات الغذائية
- مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات
- العرن المتقوب (هيريكوم - St. John's Wort)
- أدوية مضادة للاكتئاب من مجموعة الـ SSRI و SNRI
- بوسبيرون (buspirone)
- أمفيتامينات

• ليثيوم

إذا اختيرت أي عارض استثنائي خلال تناول دواء أي كان من بين هذه الأدوية سوياً مع دولوكس تيفع، عليك أن تتوجه إلى الطبيب.

أدوية التي تؤثر على تختار الدم وتكون تختار مثل:
• وارفارين (Coumadin) - يجب متابعة المعالجين الذين يتناولون وارفارين في بداية وفي نهاية العلاج بدولوكس تيفع
• أدوية مضادة للتهاب لا ستيررويدية (NSAIDs) مثل: إيفريفين، نابروكسين أو أسبرين. قد تزيد هذه الأدوية خطر حدوث نزيف
• أدوية التي تؤثر على الجهاز العصبي المركزي
• مدرات البول
• الأدوية التي تخفض مستوى الكوليسترول على يد مثببات تحريز (نوبات)
• أدوية التي تخفض ضغط الدم

• يؤثر دولوكس تيفع على تركيز أدوية أخرى في الدم:
• ثيوفيلين (علاج الربو)
• مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات مثل: ديسبيرامين، نورتريپيلين، أميتريپيلين، وإميرامين
• فينوثيازينات (phenothiazines)
• أدوية لعلاج اضطرابات نظم القلب: فليكايد (flecainide)، بروپرفينون (propafenone)، ثيوريدازين (thioridazine)، وقد يؤدي الدمج إلى مشاكل معينة في وتيرة نظم القلب أو إلى الموت المفاجئ

• تؤثر الأدوية التالية على تركيز دولوكس تيفع في الدم:
• كوينيدين (quinidine) لعلاج اضطرابات نظم القلب
• فلوكسيتين (fluoxetine)، فلوروكسامين (flvoxamine)، پاروكسيتين (paroxetine)
• سيميدين (cimetidine)
• أدوية مضادة للمكروبات من عائلة الكوينولونات مثل: سبيروفلوكساسين (ciprofloxacin) أو إكسوسامين (enoxacin)

يجب على الطبيب أن يقرر فيما إذا كان يمكنك تناول دولوكس تيفع مع الأدوية الأخرى. لا تبدأ ولا تتوقف عن تناول أي دواء، بما في ذلك الأدوية التي تم شراؤها دون وصفة طبية والأعشاب الطبية، قبل أن تستشير الطبيب.

استعمال الدواء والغذاء
يمكن تناول دولوكس تيفع مع أو من دون طعام.

استعمال الدواء وأسلاك الكحول
لا يجوز استهلاك كميات كبيرة من الكحول بالترتيب مع تناول دولوكس تيفع لأن هذه الحالة قد تلحق ضرراً بالكبد.

الحمل والإرضاع

استشيري الطبيب أو الصيدلي قبل أن تتناولي أي دواء.
أصبحت طبيبة فوراً إذا أصبحت حاملاً أو إذا كنت تعتقدين أنك أصبحت حاملاً أثناء تناول دولوكس تيفع. قد يلحق دولوكس تيفع ضرراً جنينك. عليك أن تستعلمي دولوكس تيفع فقط بعد أن تتحدثي مع الطبيب حول الفوائد المحتملة والأضرار التي تلحق بالجنين.
• تأكدي من أن القابلة و/أو الطبيب يعلمان أنك تتعاطين دولوكس تيفع. قد تتناول أدوية من نوع SSRI و SNRI، أو بما في ذلك دولوكس تيفع، خلال نهاية الثلث الثالث من الحمل، قد يزداد خطر حدوث مضاعفات تتطلب مكوث المولود في المستشفى لفترة طويلة، مساعته في التنفس، وتغذيته عبر الأنبوب في حالة حدوث هذه المضاعفات عند الولادة مباشرة، وقد تستقر مضاعفة تنفسية، هزراق الشرة، انقطاع التنفس، تشنجات، أو انخفاض درجة حرارة الجسم، بصوت، في الأكل، تقوسات، نقص السكر في الدم، ارتفاع الصلوات، تصلب الصلوات، متفوقات فرطية، غثمة، عصبية، تملأ وركاء متوصلاً
• إذا طرأ أي من هذه الأعراض لدى طفلك بعد الولادة، أو إذا شعرت بالقلق على صحة الطفل، استشيري القابلة أو الطبيب.

أخبري الطبيب إذا كنت مرضعة أو تحظطين للرضاعة. ينتقل دولوكس تيفع عبر حليب الأم، وقد يلحق ضرراً بالطفل.
لا يوصى باستخدام دولوكس تيفع أثناء الرضاعة. استشيري الطبيب حول الطريقة الأمثل لإطعام طفلك أثناء تناول دولوكس تيفع.

السياقة واستخدام الآليات
قد يؤدي استعمال هذا الدواء إلى الغماص أو قد يؤثر في قدرتك على اتخاذ القرارات، أو في التفكير السليم أو على رد الفعل السريع. إذا يجب توخي الحذر أثناء سياة المركبة، تشغيل ماكينات خطيرة، وممارسة أي نشاط يتطلب اليقظة. لا تقدي سيارة ولا تستعمل أجهزة أو ماكينات قبل أن تتعرف كيف يؤثر دولوكس تيفع عليك.

معلومات مهمة عن قسم من مكثبات الدواء
يحتوي دولوكس تيفع على مسكوز. إذا أخذت طبيبك أن لديك عدم قدرة على حمل أنواع معينة من السكر، استشر الطبيب قبل تناول هذا الدواء.

3. كيف تستعمل الدواء؟
يجب استعمال الدواء دائماً حسب تعليمات الطبيب. عليك الحصص مع الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكداً فيما يتعلق بالجرعة وطريقة العلاج بأدواء.
الجرعة وطريقة العلاج يحددهما الطبيب، فقط يُحتمل أن يحتاج الطبيب إلى تغيير الجرعة حتى العزور على الجرعة اللامنة لك. الجرعة المعادة هي:
• **تكملة <**

- **لأم الاعتلال العصبي الناتج عن السمكي:** الجراحة العيادية من دولوكس تيفع في 60 ملغ مرة في اليوم. سيحدد طبيبك الجرعة المناسبة لك.
- **لأم العضلات الهيكلية المزمن واضطراب القلق العام:** سيحصل معظم المعالجين على 60 ملغ مرة في اليوم، وسيحدد طبيبك الجرعة المناسبة لك. يحتاج بعض المعالجين إلى جرعة ابتدائية من دولوكس تيفع 30 ملغ مرة في اليوم لمدة أسبوع، وبعد ذلك يتم تناول جرعة اعتيادية مقدارها 60 ملغ مرة في اليوم.
- **لانتفاخ:** سيحصل معظم المعالجين على 60 ملغ مرة في اليوم. يحتاج بعض المعالجين إلى جرعة ابتدائية من دولوكس تيفع 30 ملغ مرة في اليوم لمدة أسبوع، وبعد ذلك يتم تناول جرعة اعتيادية مقدارها 60 ملغ مرة في اليوم.
- **الآلام العضلي اليفي (Fibromyalgia):** الجرعة الابتدائية من دولوكس تيفع في 30 ملغ مرة في اليوم لمدة أسبوع، وبعد ذلك يتم تناول جرعة اعتيادية مقدارها 60 ملغ مرة في اليوم.
- يظهر تأثير العلاج الدوائي دولوكس تيفع غالباً بعد 2-4 أسابيع من العلاج.

طريقة تناول الجرعة الموصى بها.

دولوكس تيفع يجب أن تتناول للمو. عليك اتباع التعليمات كاملة مع الماء. يحتوي دولوكس تيفع على خبيبات مغلقة مغنا تفككها في المعدة، لذلك، يمنع صنع أو سحق محتوى الكبسولة، ولا يجوز فتح كبسولتها ورش محتواها على الطعام أو الشراب. وذلك لمنع تآكل المعام أو الشراب على غلاف الخبيبات. كذلك، الدواء ليس معداً للتناول عن طريق أنبوب آتفي معدي لأن مكنوك الكبسولة قد يسد الأنبوب.

تحدث مع الطبيب حول المدة التي يتعين عليها متابعة تناول دولوكس تيفع، لا تتوقف عن تناول دولوكس تيفع دون أن تتحدث مع طبيبك أو لا.

إذا تناولت عن طريق الخطأ، جرعة أعلى، اتصل فوراً بالطبيب أو الصيدلي، يمكن أن تستعمل أعراض الجرعة المفرطة على نصاب، نبات، متلازمة السيروتونين (رد فعل قد يسبب هلوسات، عصبية، نبات، وتيرة زخمين قلبى سريع، عدم استقرار ضغط الدم، دوار، تعرق، احمرار الوجه، طفح سرع، رعشة، غثبات العضلات، انقباض العضلات، متضخكات متزايدة، نقص التناسق، غثيان، تقيؤ وإسهال)، اختلاجات، إغماء، ضغط دم منخفض، ضغط دم مرتفع، تقيؤات، وقيض سرع.

إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا ابتلع الحول خطأ من هذا الدواء، توخّأ حالاً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ التابعة للمستشفى، مصطحباً معك عبوة الدواء.

إذا نسيت تناول الدواء، يرجى أن تتناول الجرعة التي نسيتها حال تذكرك إذا تذكرت في وقت قريب من موعد تناول الجرعة التالية، تخط الجرعة التي نسيتها وتناول الجرعة التالية فقط. لا تتناول جرعة مضاعفة من دولوكس تيفع.

عليك الدوامية على العلاج تبعاً لتوصية الطبيب، حتى إذا طرأ تحسن على حالتك الصحية، لا يجوز لك التوقف عن استعمال الدواء من دون استشارة الطبيب أو الصيدلي.

إذا توقفت عن تناول الدواء: إذا اعتقد الطبيب أنك لم تعد بحاجة إلى دولوكس تيفع، سيوصي لك بخفض الجرعة التي تتناولها تدريجياً وذلك لكي تتوقف عن تناول الدواء نهائيًا. لا يجوز لك التوقف عن تناول هذا الدواء فجأة دون استشارة الطبيب. عندما تتوقف عن تناول الدواء بسرعة كبيرة أو عندما تتنكث من تناول دواء مضاد للانتفاخ بسرعة كبيرة، قد تشعر بالأعراض الحادة التالية: دوار، صداع، غثيان، إسهال، احمرار بالخرن (لسعات وخزجات)، وتلمل، وعصبية، تقيؤات، آرق، قلق، ارتباك، إحساس بعدم الاستقرار العاطفي، ظهور هوس خفيف، طفح (سماح رنين) والآن دون وجود أي صرت خارجي)، تشنجات، غثبات مفرط طوق وانهاك.

يجب تناول الأدوية في الظلام تحقق من المصلى على عبوة الدواء ومن الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها. إذا كانت لديك أسئلة أخرى تتعلق باستعمال الدواء، استشير الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية
جميع الأدوية، يمكن أن يسبب استعمال دولوكس تيفع أعراضاً جانبية لدى بعض المستخدمين. لا تفرغ عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية. فقم بالتوقف عن العلاج من أي منها.

يجب التحقق من التعاى والتوخّأ فوراً إلى الطبيب في حال تطورت ردود الفعل التالية:

- علامات تشير إلى ضرر في الكبد: كحة، لون بول داكن، ألم في جدار العلوي الأيمن من البطن، اصفرار الجلد أو الجزء الأبيض في العينين (يرقان)، ارتفاع حاد في أنزيمات الكبد. المرضى الذين أصيبوا باليرقان أو بأي عرض آخر يشير إلى قصور كبدى - لديهم التوقف عن العلاج بعد دولوكس تيفع.
- رد فعل تحسسى حاد أي يودي إلى قيوصلات، طفح مع تقشّر الجلد، وتقرحات في الفم، شرى أو علامات أخرى تشير إلى حساسية مفرطة - يجب التوقف عن العلاج بعد دولوكس تيفع فوراً عند ظهور هذه الأعراض، خوفاً من متلازمة ستيفن جونسون (Stevens Johnsons).

(Syndrome)

يجب التوجه إلى الطبيب فوراً إذا شعرت بأحد الأعراض التالية، بالأخص إذا كانت أعراضاً جديدة، متفاضة أو إذا كانت تتكثف:

- محارلات انتحارية أو أذى خطيرة • عدوانية، غضب، أفكار عن الانتحار أو الموت • ظهور اكتئاب أو تفاقم الاكتئاب • ظهور قلق أو تفاقم القلق • نوبات أو شعور قوي من انهيار، التملل • ظهور عصبية أو تفاقم العصبية • مشاكل في النوم • طرأ ارتفاع مزاج أو النشاط أو الكلام (هوس) • تغييرات أخرى في السلوك أو المزاج
- متلازمة السيروتونين - حالة قد تشكل خطراً على الحياة؛ قد تشمل الأعراض على: رد فعل ذى سبب الشعور بتغييرات في الحالة النفسية (مثل: عصبية، هلوسات، نبات)، عدم استقرار ذاتي بصحة سرع، ضغط دم مرتفع، دوار، تعرق مفرط، حمرة الوجه، ارتفاع حرارة الجسيم، مشاكل عصبية عضلية (رعشة، تصلب، تشنجات في العضلات، متضخكات متزايدة، نقص التناسق)، نوبات، تشنجات، وآو أعراض في الجهاز الهضمي (مثل: غثيان، تقيؤ وإسهال)
- نريف شاد - الأدوية من فئة SSRI و SNRI بما في ذلك دولوكس تيفع، ممكن أن تزيد من احتمال حدوث حالات نريف مثل: انزفة تحت الجلد (التي قد تظهر أيضاً على شكل نقاط حمراء على الجلد)، زيادة في الأنف ونزح حتى حالات نزح تشكل خطراً على الحياة، بالأخص إذا كنت تتناول أيضاً مضطحصر لتسيب الدم مثل والفرارين، أو أدوية مضادة للالتهاب غير الستيرويدية (NSAIDs) أو أسبرين. يحتتمل أيضاً حدوث نريف وتيرة أعلى بعد الورداد • مستويات منخفضة من الصوديوم في الدم (لا تشمل لدى المسنين أو المعالجين الذين يتناولون أدوية مدرّة للبول) - قد تشمل الأعراض على الشعور بصداع، صعوبات في التركيز، مشاكل في الذاكرة، ارتباك، ضعف، نقص الاستقرار الذي قد يودي إلى حالات سقوط الأعراض الحادة أكثر في هلوسات، فقدان الوعي، اختلاجات، نبات، توقفت التناسق والوقاة • انخفاض ضغط الدم عند الانتقال من وضعية الاستلقاء إلى وضعية الوقوف الذي يودي إلى دوار، حالات سقوط أو إغماء، بالأخص بعد بده العلاج أو بعد رفع الجرعة
- حالات سقوط والاختفاض في ضغط الدم وكذلك بين عوامل إضافية

أعراض جانبية تظهر في أحيان قريبة جداً

- صداع، غثاس • غثيان، جفاف في الفم
- **أعراض جانبية تظهر في أحيان قريبة**
- قلة الشهية • اضطرابات في النوم، آرق، تملل، قلق، عصبية
- ألم عند القدرة على طول عضة الجماع، آلام غريبة، دوخة، تقصيرية، تمليل (وخزات) أو لسعات على الجلد) • متلازمة "تململ المسكين"، شعور بضربات القلب في الصدر (Palpitations) • ارتفاع ضغط الدم • موجات حمرارة • مثل متزايد للتلل • إسهال، غثبات، إسهال، ألم في البطن، عدم ارتياح في البطن، حساسية في البطن، تقيؤات، اضطراب في الجهاز الهضمي • تعرق مفرط طغ (سبب الكحة)
- ألم في العضلات، تقصص العضلات، ألم في الظهر • تواتر التبول
- إنهاك • هبوط أو ارتفاع الوزن • ألم في البلوم • تغييرات في حاسة الطعم • إحساس بالدوخة أو "الدوار" (Vertigo) • عدم الارتياح • كحة • انخفاض تنفق البول

أعراض جانبية تظهر في أحيان بعيدة

- التهاب في الحنجور الذي يسبب الكحة • شعور بالاختناق في الحنجرة
- أفكار انتحارية، صدك الأنسان، شعور بالارتباك، لا مبالاة، فقدان الإحساس بالزمن والمكان • حركات خبيرة لا إرادية، إحساس بالتململ أو عدم القدرة على الجلوس أو الوقوف بدون حركة، عصبية، سوية في التركيز، نقص التناسق، متلازمة "تململ المسكين"، نوم سيء، تغييرات في المزاج، محارلة انتحار • صعوبات في الوردية، جفاف في العينين، رؤية مزاجية، توسع البؤبؤ (Mydriasis) • ألم في الأذنين، طفنين (سماح رنين في الأذن أيضاً لا يوجد صوت خارجي) • قيض سرع أو غير سرع، إغماء، شعور بالإنعاع أو إغماء عند الوقوف، بوردة أصابع اليدين وآو القدمين • التهابات في الجهاز الهضمي، نريف في الجهاز الهضمي • شعور قليل طغ، التهاب الحنجرت، احمرار، تعرق بارد، حساسية لزق العظم، مثل متزايد للتلل • متضخكات، تشنجات، تشنج العضلات، تشنج العضلات • عصبية أو عدم قدرة على التبول، ألم أثناء التبول، إلحاح في التبول، إلحاحية إلى التبول أكثر من المعتاد، رائحة بول غير طبيعية، رؤية ليلي • الإم في الخصبين • صعوبات في الأداء الجنسي، انخفاض الرغبة الجنسية • انخفاض حاد في ضغط الدم
- الانتقال من وضعية الاستلقاء إلى وضعية الجلوس أو من وضعية الجلوس إلى وضعية الوقوف (بالأخص في بداية العلاج أو بعد زيادة الجرعة الدوائية) • ارتفاع خطر التعرض للسقوط (بالأخص لدى المسنين)، شعور بالمرض، عطش، رعشة، شعور بالحرارة أو البرد • انظوترا • التهاب في المسلك التنفسي العلوي، سعال • اضطرابات في الانتلاخ • قد يودي دولوكس تيفع إلى أعراض لا تعرفها، مثل ارتفاع مستويات الدهن في الدم (Hyperlipidemia) أو الكولسترول • انخفاض نشاط الغدة الدرقية
- جفاف • راحة كبريه من الفم، التهاب الفم • أعراض سن انفتاح الطمط
- احتشاء عضلة القلب • احمرار الوجهين • متلازمة القلب المكسور (Takotsubo cardiomyopathy)

أعراض جانبية تظهر في أحيان نادرة

- قرحة عضلية (Peptic Ulcer) • اضطرابات في الدورة الشهرية
- ارتفاع أو انخفاض مستويات الدهن في الدم (Dyslipidemia)
- اضطرابات في الكلام، حالات نريف تحت الجلد (يمكن أن تظهر أيضاً على شكل نقاط حمراء على الجلد) • اضطرابات في السير

التحذار

أعراض جانبية وتيرة شيوعها غير معروفة (أعراض لم يحدد شيوعها بعد)

- التهاب حاد في البنكرياس • رد فعل تألي • عدوانية وغضب (بالأخص في مراحل بداية العلاج أو بعد إيقافه) • وندمة وعائية - رد فعل تحسسى حاد قد يودي إلى تورم الوجه أو الحنجرة • اضطراب خارج البرمي
- إفراز الحليب من الثدي (Galactorrhea) • مستويات مرتفعة من البرولاكتين • ارتفاع ضغط الدم (تورم زرق صديق الزاوية) • ألم في العينين، تغيير في الرؤية، تورم أو احمرار حول/داخل العين • التهاب الأوعية الدموية الجذبية (أحياناً مع تشنج عضلي) • نريف في الجهاز التناسلي الأنثوي • هلوسات • مستويات عالية من السكر في الدم (Hyperglycemia) • فرط التحسس • أزمة فرط ضغط الدم • التهاب في الأمعاء الغليظة (microscopic or unspecified colitis) • انقباض العضلات • اختلاجات عند إيقاف العلاج • تغيير في وتيرة تلمط القلب • Arrhythmia • طفنين عند إيقاف العلاج • تشنجات في عضلات الفك • شرى • رعشة • تقيؤ • التهاب في البلوم الأنفي • قد يودي دولوكس تيفع إلى أعراض لا تعرفها، مثل ارتفاع مستويات أنزيمات الكبد، البيركروتات، السكر، وكذلك ارتفاع أو انخفاض مستويات الويتامين في الدم.
- إذا ظهر أعراض جانبية، إذا تفاقم أي من الأعراض الجانبية، أو إذا عانيت من أعراض جانبية لم يُذكر في النشرة، عليك استشارة الطبيب.

التعليق عن الأعراض الجانبية

يمكن إبلاغ وزارة الصحة بالأعراض الجانبية عبر الضغط على رابط "الإبلاغ عن الأعراض الجانبية بسبب العلاج الدوائي"، الموجود في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.au) الذي يوجهك إلى استماره على الإنترنت الإبلاغ عن الأعراض الجانبية، أو بملزمة الدخول إلى الرابط: <https://sideeffects.health.gov.au>

5. كيف يخزن الدواء؟

تجنب التسمّم يجب حفظ هذا الدواء، وكلّ دواء آخر، في مكان مغلق، بعيداً عن متناول أيدي الأطفال ومجال رؤية الأولاد وآو الأطفال، وهكذا تتجنّب التسمّم. لا تسبب التقيؤ دون تعليمات صريحة من الطبيب.

- لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) الظاهر على العبوة. تاريخ انتهاء الصلاحية هو اليوم الأخير من نفس الشهر.

6. معلومات إضافية

بالإضافة إلى المادة الفعالة، يحتوي الدواء، أيضاً على مواد غير الفعالة التالية:

- محتوي الكسولة:
- **دولوكس تيفع 30 ملغ:** Sugar spheres, xypromellose, phtalate, xypromellose, triethyl citrate, hydroxypropylcellulose, talc, titanium dioxide, black iron oxide (E172), brilliant Blue FCF – FD&C blue 1 (E133), imprinting ink black.

دولوكس تيفع 60 ملغ:

Sugar spheres, xypromellose, phtalate, xypromellose, triethyl citrate, hydroxypropylcellulose, talc, titanium dioxide, black iron oxide (E172), imprinting ink black.

كيف يبيغ الدواء ومادّا تحوي

دولوكس تيفع هو كبسولة مقاومة للحموضة في المعدة. تحتوي كل كبسولة من دولوكس تيفع على خبيبات دولوكسينتين هيدروكلوريد مغلقة بغلاف مغوي يحميها من حموضة المعدة ويمنع تفككها في المعدة.

دولوكس تيفع 30 ملغ:

كبسولة ذات رأس أبيض ووجسم بلون رمادي. مطبوع عليها **DLX 30**.

دولوكس تيفع 60 ملغ:

كبسولات دولوكس تيفع 60 ملغ ودولوكس تيفع 60 ملغ مسوقة في عبوات بليستر (شرائط) التي تحتوي على 7، 10، 14، 28، 30، 56 أو 100 كبسولة. قد لا تشوّق كل أحجام العبوات.

اسم المنتج وعنوانه: تيفع صناعات أدوية م.ض.، ص.ب. 3190، بيتاح تكفا.

اسم صاحب التسجيل وعنوانه: أيبك للتسويق ك.م.ض.، ص.ب. 8077، تانليا (من مجموعة تيفع)

تم تحرير النشرة في آذار 2021 وفق تعليمات وزارة الصحة
رقم تسجيل الدواء في سجل الأنواع الرسمي في وزارة الصحة:
دولوكس تيفع 30 ملغ: 35976
دولوكس تيفع 60 ملغ: 36004