

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيادلة (مستحضرات) - 1986

يسوق الدواء بموجب وصفة طبيب فقط

ليسودرين أقراص 500 ملخ

المادة الفعالة وكميتها:

كل قرص يحتوي على 500 ملخ ميتوتان - mitotane 500 mg.

المواد الحساسية في المستحضر — انظر الفقرة 6 "معلومات إضافية".

اقرأ النشرة بتمتن حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.

وُصف هذا الدواء لعلاج مرضك. لا تعطه للأخرين. فهو قد يضرهم حتى لو بدا لك أن مرضهم مشابه لمرضك.

1. لأي غرض مخصص الدواء؟

الدواء مخصص لعلاج أعراض سرطان الغدة الكظرية المتقدم (غير قابل لعملية جراحية، التناقي أو المترkers).
الفحص العلاجي: مستحضرات مضادة للأورام.

2. قبل استعمال الدواء

☒ لا يجوز استعمال الدواء إذا:

- كنت حساساً (اليرجي) لـ ميتوتان أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحويها الدواء (انظر الفقرة 6).
- كنت مرضعة، لا يجوز الإرضاع أثناء العلاج بـ ليسودرين.
- كنت تعالج بأدوية تحتوي على سپيرونولاكتون (انظر "التدخلات/ التفاعلات بين الأدوية").

1. تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء

قبل العلاج بالدواء أحكام للطبيب إذا:

- لديك اصابة (صدمة، صدمة حادة، ثلوث أو مرض أثناء تناول ليسودرين. أخبر طبيبك على الفور، والذي قد يقرر إيقاف العلاج مؤقتاً).

- وجدت لديك مشاكل في الكبد: أخبر الطبيب إذا ظهرت لديك أي من العلامات والأعراض التالية التي تدل على وجود مشاكل في الكبد أثناء العلاج بـ ليسودرين: حكة، اضطراب العينين أو الجلد، بول داكن، ألم أو ازعاج في المنطقة اليميني العلوية من البطن. سيحتاج طبيبك إلى إجراء فحوصات الدم لفحص وظائف الكبد لديك قبل وأثناء العلاج بـ ليسودرين، وفقاً لاحتياجك الطبية.

- وجدت لديك مشاكل وخيمة في الكلى.

- كنت تستعمل أحد الأدوية المذكورة أدناه (انظر "التدخلات/ التفاعلات بين الأدوية").

- كنت تعاني من مشاكل في الجهاز التناسلي مثل النزف و/or ألم في الحوض.
لا يجوز لأي شخص لمس هذا الدواء ما عدا المتعامل و/or معالجه، وخاصة النساء الحوامل لا يجوز لهن لمس الدواء، يجب على المعالجين ارتداء قفازات لمرة واحدة عند لمس الأقراص.

قد يصف لك الطبيب علاجاً هورمونياً (ستيروئيدات) أثناء تناولك ليسودرين.

الأطفال والمرأهقون

الخبرة في المتعالجين في هذه الفئة العمرية محدودة جداً.

1. التدخلات/ التفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تستعمل أو استعملت مؤخرأً، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية أحكام للطبيب أو للصيدلي عن ذلك.

لا يجوز استعمال ليسودرين مع الأدوية التي تحتوي على سپيرونولاكتون، والتي تستعمل غالباً كمدرات للبول لعلاج أمراض القلب، الكبد أو الكلى.

قد يشوش ليسودرين على عمل عدة أدوية. لذلك، يجب أن تخبر الطبيب إذا كنت تتناول أدوية تحتوي على أي من المواد الفعالة التالية:

- وارفارين أو مضادات التخثر الأخرى (مميعات الدم)، وتستعمل لمنع تخثر الدم. قد تكون حاجة إلى تغيير المقدار الدوائي لمضاد التخثر الخاص بك.

- أدوية مضادة للصرع
- ريفابوتين أو ريفاميبسيين، المستعملة لعلاج السل

- چريزوڤولفين، المستعمل لعلاج تلوثات فطرية

- مستحضرات نباتية تحتوي على St. John's wort (هيبيريكوم پيرفوراتوم)

- سوينتنيبي، إيتويوسيد: لعلاج السرطان

! استعمال الدواء مع الطعام والمشروبات

من المفضل تناول ليسودرين أثناء وجبات الطعام التي تحتوي على أطعمة غنية بالدهون، مثل: الحليب، الشوكولاتة، الزيت.

! الحمل، الإرضاع والخصوبة

ليسودرين قد يلحق الضرر بالجنين. بلغى طبيبك إذا كنت حاملاً أو تخططين للحمل. إذا كانت احتمالية الحمل، يجب عليك استعمال وسيلة ناجعة لمنع الحمل أثناء العلاج بـ ليسودرين وحتى بعد التوقف عن العلاج. يجب استشارة الطبيب.

يمنع الإرضاع أثناء تناول ليسودرين وحتى بعد التوقف عن العلاج. يجب استشارة الطبيب.

! السياقة واستعمال الماكينات

يؤثر ليسودرين بشكل ملحوظ في القدرة على السياقة وتشغيل الماكينات. لا يجوز قيادة السيارة أو تشغيل ماكينات أثناء العلاج أو بعده طالما أنك تعاني من أعراض جانبية قد تؤثر على قدرتك على القيادة أو تشغيل الماكينات مثل أضطرابات الحركة والتنسيق، ارتباك، إرهاق، دوار، أو دوخة.

3. كيفية استعمال الدواء؟

يجب استعمال المستحضر دائمأ حسب تعليمات الطبيب.

عليك الاستيقاظ من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن واثقاً بخصوص المقدار الدوائي وطريقة العلاج بالمستحضر.

المقدار الدوائي وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط.

المقدار الدوائي الاعتيادي هو عادة:

المقدار الدوائي الاعتيادي بالنسبة للكبار هو 2 حتى 3 غرام (4 حتى 6 أقراص) في اليوم. من شأن الطبيب أن يبدأ العلاج بمقادير دوائية مرتفعة أكثر، مثل 4 حتى 6 غرام (8 حتى 12 قرصاً). من أجل الوصول إلى المقدار الدوائي الأمثل من أجلك، يقوم الطبيب بمراقبة نسب ليسودرين في دمك بانتظام. قد يقرر الطبيب إيقاف تناول ليسودرين مؤقتاً أو تقليل المقدار الدوائي إذا كان لديك بعض الأعراض الجانبية.

الاستعمال لدى الأطفال والمرأهقين

المقدار الدوائي الاعتيادي اليومي من ليسودرين هو 1.5 إلى 3.5 غرام/ لكل متر مربع من مساحة الجسم (يتم حسابها من قبل الطبيب بحسب وزن وحجم الطفل).

لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به.

عليك بلع الأقراص مع كأس من الماء أثناء وجبات الطعام التي تحتوي على طعام غني بالدهون. يمكن شطر الجرعة الدوائية اليومية الإجمالية لجريعتين أو ثلاثة جرعات.

من أجل تسهيل عملية البلع، يمكن شطر القرص للاستعمال الفوري إذا لزم الأمر. يجب بلع شطري القرص مباشرة بعد الشطر.

إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء، توجه حالاً للطبيب أو لغرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر معك علبة الدواء.

إذا نسيت تناول الدواء في الوقت المحدد، لا تتناول جرعة دوائية مضاعفة. تناول الجرعة الدوائية التالية في الوقت الاعتيادي.

يجب المراقبة على العلاج حسب توصية الطبيب.

لا تتناول الأدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والمقدار الدوائي في كل مرة
تناول فيها الدواء. ضع النظارات الطبية إذا احتجت لها.
إذا توفرت لديك أسلحة إضافية حول استعمال الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن استعمال ليسودرين قد يسبب أعراضًا جانبية عند بعض المستعملين. لا تنهش من قائمة الأعراض الجانبية. فمن الممكن أن تتعافى أي منها.

احك للطبيب حالاً إذا لاحظت أحد الأعراض الجانبية التالية:

- قصور الغدة الكظرية: إرهاق، ألم بطن، غثيان، تقيؤ، إسهال، ارتباك
- فقر الدم: شحوب الجلد، تعب العضلات، الشعور بضيق تنفس، دوار (غيرتجو) خاصه عند النهوض للوقوف
- تضرر الكبد: أصفرار الجلد والعينين، حكة، غثيان، إسهال، إرهاق، بول داكن اللون.
- اضطرابات عصبية: اضطرابات الحركة والتتنسيق الحركي، شعور غير طبيعي مثل التنميل (الشعور بوخذ)، فقدان الذاكرة، صعوبة التركيز، صعوبة النطق، دوار

قد تشير هذه الأعراض إلى مضاعفات قد تكون بعض الأدوية مناسبة لها.

الأعراض الجانبية بحسب شيوغها

أعراض جانبية شائعة جداً - أعراض تظهر لدى أكثر من مستعمل واحد من عشرة:

- تقيؤ، غثيان، إسهال، ألم بطن
- فقدان الشهية للطعام
- شعور غير طبيعي مثل تنميل (الشعور بوخذ)
- اضطرابات الحركة والتتنسيق الحركي، دوار، ارتباك
- نعاس، إرهاق، ضعف عضلي (إرهاق عضلي أثناءبذل مجهود)
- التهاب (انتفاخ، سخونة، ألم) في الأعضاء المخاطية، طفح جلدي
- إضطرابات في الدم (ارتفاعه وقله)
- ارتفاع الكوليستيرول والدهون الثلاثية (الشحوم) وإنزيمات الكبد (في فحوص الدم)
- انخفاض في تعداد خلايا الدم البيضاء
- فرط انتفاخ الثديين لدى الرجال
- قصور الغدة الكظرية

أعراض جانبية شائعة - أعراض تظهر لدى 10-1 مستعملين من بين 100:

- دوار، صداع
- اضطرابات الجهاز العصبي المحيطي (تو صلة بالاضطرابات الحسية، ضعف وضمور العضلات، انخفاض انعكسات الأوتار وأعراض حركية وعائية مثل هبات السخونة، التعرق واضطرابات النوم)
- ضرر ذهني (مثل فقدان الذاكرة، صعوبات في التركيز)
- اضطراب حركي
- انخفاض بخلايا الدم الحمراء (فقر الدم، مع أعراض مثل شحوب الجلد والإرهاق)، انخفاض الصفائح الدموية (قد يزيد الميل إلى حدوث كدمات ونزف)
- التهاب الكبد (هيپاتيتس، مرض مناعة ذاتية) (قد تؤدي إلى اصفرار الجلد والعينين، بول بلون داكن)
- صعوبة في التنسيق الحركي للعضلات

أعراض جانبية شيوغها غير معروفة (أعراض لم يحدد شيوغها بعد):

- سخونة
- ألم عام
- تورم، ارتفاع أو انخفاض ضغط الدم، الشعور بدوخة/دوار عند النهوض المفاجئ للوقوف
- زيادة إنتاج اللعاب
- اضطرابات في العينين: تضرر في الرؤية، تشوش الرؤية، ازدواجية الرؤية، تشوه بصري، معاناة من الوهج
- تلوثات فطرية
- إصابة الكبد (قد تؤدي إلى اصفرار الجلد والعينين، بول بلون داكن)
- انخفاض حمض الاليوريك في فحوصات الدم
- التهاب المثانة المصحوب بذرف

- وجود دم في البول، وجود بروتينات في البول
 - اضطراب التوازن
 - تشوه حاسة التذوق
 - تضرر في الهضم
 - تكيسات كبيرة في المبيض (مع أعراض مثل ألم الحوض، نزف)
 - انخفاض الأندروجينات (الطاقي للهرمونات الجنسية) في فحوص الدم لدى النساء
 - انخفاض هرمون التستوستيرون (هرمون الجنس) في فحوص الدم لدى النساء
 - زيادة نسبة الصلوبولين الذي يربط الهرمون الجنسي (بروتين يربط الهرمونات الجنسية) في فحوص الدم
 - انخفاض هرمون التستوستيرون (هرمون الجنس) في فحوص الدم لدى الرجال
 - تضخم الثديين في الرجال (مع علامات مثل ظهور الثديين، انخفاض الرغبة الجنسية، المس بالانتصاب، اضطرابات في الخصوبة)
- للحظ لدى الأطفال والراهقون مشاكل في الغدة الدرقية، مشاكل نفسية عصبية، تأخر في النمو، حالة واحدة من اعتلال الدماغ.
- إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية، أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يدرج في هذه النشرة، عليك استشارة الطبيب.

التبليغ عن الأعراض الجانبية

بإمكانك التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى المنوذج المباشر للتبليل عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. كيفية تخزين الدواء؟

- تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي و المجال رؤية الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- لا يجوز استعمال الدواء بعد انقضاء تاريخ الصلاحية (exp.) الذي يظهر على علبة الكرتون والقنينة.
- لا توجد شروط تخزين خاصة. يوصى بالحفظ في درجة حرارة الغرفة. يجب تخزين في العلبة الأصلية. للإستعمال حتى ستة من اليوم الذي تم فيه الفتح.
- سيم التخلص من أي منتج أو نفايات متباعدة بحسب القوانين المحلية للأدوية السامة للخلايا.
- لا يجوز رمي الأدوية إلى المجاري أو للقمامة المنزلية. استشر الصيدلي عن كيفية التخلص من الأدوية لم تعد قيد الاستعمال. هذه الوسائل تساعد في الحفاظ على البيئة.

6. معلومات إضافية

يحتوي الدواء بالإضافة للمركب الفعال أيضاً على:

microcrystalline cellulose, maize starch, macrogol 3350, silica colloidal anhydrous.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة

ليسودرين هو أقراص بيضاء، محدبة، مستديرة، ذات شق من جانب واحد والجانب الآخر مع ختم BL L1.

ليسودرين متوفّر ضمن قناني بلاستيكية التي تحتوي على 100 قرصاً.

صاحب الامتياز وعنوانه: تكسس.م.ض. شارع هشاراش 4، هود هشارون 45240.

اسم المنتج وعنوانه:

HRA Pharma Rare Diseases, France.
200 avenue de Paris 92320 Chatillon, France

تم تحرير هذه النشرة في تاريخ 05/2021 وفق تعليمات وزارة الصحة.

رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: 00-35626-52-166 من أجل السهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.

