

الصدرية) - لا يجوز إستعمال هذه الأدوية خلال فترة العلاج بـ روپافین.

- سيكلوكسيورين، تاكروليموس، سيروليموس، إيفيروليموس، (أدوية من مجموعة مثبطات الجهاز المناعي)، سيسابردي، أدوية مثبطة لـ الجهاز العصبي المركزي، أدوية من فصيلة ستاتينات مثل سيميفاستاتين (دواء لعلاج ارتفاع الكوليسترول في الدم) أو بيدازوناد (دواء يستعمل للتركين لفترة قصيرة): استشر الطبيب قبل تناول روپافین.

إستعمال الدواء والطعام:

بالإمكان تناول الدواء مع أو بدون طعام.

لا يجوز تناول روپافین بمشاركة عصير الچریپ فروت لأن ذلك من شأنه أن يرفع نسبة الدواء في الجسم.

إستعمال الدواء وإستهلاك الكحول:

روپافین بالقدر الدوائي 10 ملخ لا يزيد من الشعور بالتعاسة الناجم عن الكحول.

الحمل، الإرضاع والخصوبة:

لا يجوز إستعمال الدواء خلال فترة الحمل والإرضاع، إلا إذا توفرت تعليمات صريحة من الطبيب.

يجب استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل إستعمال الدواء.

السيادة واستعمال الماكولات:

لم يكن هناك تأثير لـ روپافین بمقدار دوائي قدره 10 ملخ على القدرة على السيادة أو إستعمال الماكولات في التجربة السريرية التي تمإجراؤها. مع ذلك، يجب تخفيض الجرعة قبل تناول السيادة أو إستعمال الماكولات، حتى يتم تحديد إستجابتك الشخصية لـ روپافين.

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء:

- يحتوي هذا الدواء على سكروز، وبالتالي قد يلحظ الضرر بالأمعاء. إذا شخص لديك أو لدى طفلك عدم تحمل سكريات معينة، فعليك إستشارة الطبيب قبل تناول الدواء.
- يحتوي هذا الدواء على ميتيل پارا-هيدروكسى بنزوات، الذي قد يؤدي إلى رد فعل تحسسي (من الحافظ حدوث رد فعل تحسسي متاخر).

كل ملخ من هذا الدواء يحتوي على 200 ملخ بروپيلين چلیکول. إذا كان طفلك دون الـ 5 سنوات، إستشر الطبيب أو الصيدلي قبل أن تعطيه الدواء، خاصة إذا كان يتناول أدوية أخرى تحتوي على بروپيلين چلیکول أو حکول.

إذا كنت في فترة الحمل أو الرضاعة فلا تستعمل الدواء إلا إذا أوكل الطبيب بذلك. بإمكان الطبيب إجراء خصوص إضافية خلال فترة تناولك الدواء.

إذا كنت تعاني أنت أو طفلك من مرض كلوى أو كبد، فلا يجوز تناول هذا الدواء إلا بمحنة توصية من الطبيب. من شأن طببك أن يجري فحوص إضافية خلال فترة العلاج.

• يحتوي هذا الدواء على أقل من 1 ميليمول صوديوم (23 ملخ لكل 1 ملخ، وهو فعلياً "خل من الصوديوم".

(3) كيفية إستعمال الدواء؟

يجب إستعمال المستحضر دائمًا حسب تعليمات الطبيب. عليك الإستياضاح من الطبيب أن من الصيدلي إذا لم تكن واثقاً بخصوص المقدار الدوائي وطريقة العلاج بالمستحضر.

المقدار الدوائي وطريقة العلاج يحدان من قبل الطبيب فقط.

المقدار الدوائي لدى أطفال زنهم 25 كلغ أو أكثر: 5 ملخ (5 ملخ روپاتادين) روپافين محلول للشرب مرة في اليوم، مع أو بدون طعام.

المقدار الدوائي لدى أطفال وزنهم 10 كلغ أو أكثر وأقل من 25 كلغ: 2.5 ملخ (2.5 ملخ روپاتادين) روپافين محلول للشرب مرة في اليوم، مع أو بدون طعام.

لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به.

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة

مستحضرات - 1986

يسوق الدواء بموجب وصفة طبيب فقط

روپافین محلول للشرب 1 ملخ / مل

المادة الفعالة وكميته:

يحتوي كل ملخ محلول على:

روپاتادين 1 ملخ (ك فومارات)

[Rupatadine 1 mg (as fumarate)]

- المواد غير الفعالة ومولدات الحساسية في المستحضر: أنظر الفقرة 6 في النشرة. أنظر أيضاً الفقرة 2 "تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء".

اقرأ النشرة بتعمق حتى نهايتها قبل إستعمال الدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسلطة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي. وُصف هذا الدواء للعلاج من أجلك. لا تعطيه للأخرين. فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن مرضهم مشابه لمرضك / حالتهم الطبية مشابهة لحالتك.

(1) لأي غرض مخصص الدواء؟

يستخدم روپافين محلول للشرب 1 ملخ / مل للعلاج أعراض: إلتهاب الأنف التحسسي (بما في ذلك إلتهاب الأنف التحسسي المطول) لدى أطفال بأعمار 2-11 سنة.

• شرى (Urticaria) لدى أطفال بأعمار 2-11 سنة.

الفصيلة العلاجية: من مضادات الهيستامين من الجيل الثاني.

(2) قبل إستعمال الدواء

لا يجوز إستعمال الدواء إذا:

- وجدت لديك أو لدى طفلك حساسية (اليرجيا) للمادة الفعالة (روپاتادين) أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (أنظر الفقرة 6 في النشرة).

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء

قبل العلاج بالدواء إحكام للطبيب إذا:

• كنت تعاني أنت أو طفلك من قصور كلوي أو كبد، إستشر الطبيب. لا يوصى في الوقت الحاضر بإستعمال روپافين لدى متاعجين يعانون من مثل هذه الحالات.

• كنت تعاني أنت أو طفلك من نقص شاذ لضفريات القلب (مثل إطالة القلب QTC في التخطيط الكهربائي للقلب، اضطرابات في نظم القلب مثل نظم بطيء للقلب، إيقفار شديد لغضالة القلب) الأمر الذي من شأنه أن يظهر في أمراض قلبية معينة، إستشر الطبيب.

الأطفال والمرأهقون:

هذا الدواء غير مخصص لأطفال دون عمر السنين، أو لأطفال وزنهم أقل من 10 كلغ.

التداخلات / التفاعلات بين الأدوية:

إذا كنت تتناول أنت أو طفلك، أو إذا تناولتما معاً، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طيبة وإضافات غذائية، إحكام للطبيب أو الصيدلي عن ذلك. بالأخص إذا كنت أنت أو طفلك تتناولون:

• أدوية تحتوي على إيتراكونازول، كيتوكونازول، فوريكونازول، بوساكونازول، فلوكونازول (أدوية لعلاج التلوثات المطرية)، كلاريتو-وميسين، إبريترو-وميسين (أدوية لعلاج التلوثات الجرثومية)، مثبطات بروتياز - HIV، ديفازو دون (دواء لعلاج الإكتئاب)، ديليتازيم (دواء لعلاج ارتفاع ضغط الدم والذبحة

مدة العلاج - وفقاً لتعليمات الطبيب.

طريقة التناول: محلول للبلع.

تعليمات الإستعمال:

- لفتح القنبلة إضغط على الغطاء وقم بتدويره عكس إتجاه عقارب الساعة.

- خذ المحقنة، أدخلها إلى السدادة المثقوبة ومن ثم إقلب القنبلة بحيث تكون فوتها نحو الأسفل.

- إملأ المحقنة بالقدر الدوائي وفقاً لتعليمات الطبيب.

- يجب تناول الدواء مباشرة من محقنة المقدار الدوائي.

- إغسل المحقنة بعد الإستعمال.

إذا تناولت أنت أو طفلك بالخطأ مقداراً دوائياً أكبر فعليك التوجه مباشرةً للطبيب أو للصيدلي.

إذا تناولت أنت أو طفلك مقداراً دوائياً مفرطاً، توجه مباشرةً إلى الطبيب أو لغرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر معك علبة الدواء.

إذا نسيت تناول الدواء

إذا نسيت تناول هذا الدواء في الموعد المخصص، فلا يجوز تناول مقدار دوائي مضاعف. تناول المقدار الدوائي التالي في الموعد الإعتيادي وأستشر الطبيب.

يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب.

لا يجوز تناول أدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تتناول فيها دواء.

ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسلطة إضافية حول إستعمال الدواء، واستشر الطبيب أو الصيدلي.

(4) الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال روبيفين قد يسبب أعراضًا جانبية لدى بعض المستعملين. لا تندesh من قائمة الأعراض الجانبية من الجهاز الألما تعاني أي منها.

أعراض جانبية شائعة (أعراض تظهر لدى حتى 1 من بين 10 أشخاص): صداع وheadache وheadache وheadache.

أعراض جانبية غير شائعة (أعراض تظهر لدى حتى 1 من بين 100 شخص): إنفلونزا، إنفلونزا الأنف والبلعوم، إنفلونزا الطرق التنفسية العلوية، كثرة الحموضات، قلة العدلات، دوار، غثيان، إকزيما، تعرقليلي وإرهاق.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمت أحدى الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

التبليغ عن أعراض جانبية

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى النموذج البasher للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il>

بالإضافة لذلك، بالإمكان تبليغ شركة كاما^{م.ض.} بواسطة البريد الإلكتروني:

pharmacovigilance@kamada.com

(5) كيفية تخزين الدواء؟

تجنب التسميم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأطفال و/أو الرضع وذلك لتفادي اصباتهم بالتسميم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العلبة والقنبلة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.