

نشرة المستهلك بموجب أنظمة الصيدلة
(مستحضرات) - 1986

لوتان 12.5، 50، 100 أقراص

التركيب:

يحتوي كل قرص من لوتان 12.5 على:
لوسارتان بوتاسيوم 12.5 ملغ

Losartan potassium 12.5 mg

يحتوي كل قرص من لوتان 50 على:
لوسارتان بوتاسيوم 50 ملغ

Losartan potassium 50 mg

يحتوي كل قرص من لوتان 100 على:
لوسارتان بوتاسيوم 100 ملغ

Losartan potassium 100 mg

لقائمة المواد غير الفعالة ومولدات الحساسية في المستحضر،
الرجاء أنظر الفقرة 6.

إذراً هذه النشرة تحت بنعي نهايتها قبل إستعمال الدواء.
تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن لوتان، إذا تفرقت
لديك أسئلة إضافية، إسأل الطبيب أو الصيدلي الخاص بك.
وصف هذا الدواء للعلاج من ألدك. لا تعطيه للأطفال، فهو قد
يضرهم حتى ولو بدا لك أن حالتهم الطبية مشابهة لحالتك.

1. ما هو لوتان ولأي غرض يُستعمل؟

1.1 ما هو لوتان؟
الفصيلة اللاحية: لوتان عبارة عن حاجب للمستقبل
أنجيوتنسين II.

1.2 لأي غرض يُستعمل لوتان؟
يُستعمل لوتان 12.5 ملغ، 50 ملغ و 100 ملغ لعلاج قصور
القلب.

يُستعمل لوتان 50 و لوتان 100 أيضاً لعلاج ارتفاع ضغط
الدم (ضغط دم مرتفع) وبسماهان في خفض الشحورة لحصول
حوادث قلبية وعائية، مثل سكتة، لدى مرضى لديهم ضغط دم
مرتفع وزيادة في سماكة البطين الأيسر (البطين الرئيسي) للقلب.
لوتان 50 و لوتان 100 يوفران أيضاً حماية للكلية عن طريق
إعاقه تفاقم مرض الكلى لدى مرضى السكري من نوع 2 الذي
يترافق بإفراز بروتين في البول (بيلة بروتينية).

2. كيف تتناول لوتان

2.1 لا تتناول لوتان إذا:

- كنت حساساً (يرجي) لـ لوسارتان أو لكل واحد من المركبات
الأخرى التي يحتويها هذا الدواء (أنظر الفقرة 6)
- كنت حاملاً بما يزيد عن 3 أشهر (يُفضل أيضاً الامتناع عن
تناول لوتان في بداية الحمل - انظري الفقرة 2.5 «الحمل
والإرضاع»)
- وجد لديك خلل شديد في وظيفة الكبد
- لديك سكري أو خلل في الأداء الوظيفي الكلوي وكنت متعالجاً
بiodواء لخفض ضغط الدم يحتوي على اليكسيريين

2.2 تحذيرات خاصة متعلقة باستعمال لوتان:

تحدث مع طبيبك، الصيدلي، أو الممرضة قبل تناول الدواء
من الواجب عليك إخبار طبيبك إذا كنت تعتقدون بأنك حامل
(أو من شأنك أن تصبحين حامل). لا بوصي بتناول لوتان في
بداية الحمل ولا يجوز تناوله إذا كنت حاملاً أكثر من 3 أشهر،
لأنه قد يسبب ضرراً خطيراً لطفلك إذا تم تناوله في هذه المرحلة
(انظري الفقرة 2.5 «الحمل والإرضاع»).

قبل العلاج بـ لوتان من المهم إخبار الطبيب إذا:

- كان لديك سابقة لوزمة وعائية (انفتاح الوجه، الشفتين، الحلق
و/أو اللسان) (أنظر أيضاً الفقرة 4، «الأعراض الجانبية»).
- كنت تعاني من كتلة التقيؤ أو الإسهال اللذين يؤديان إلى فقدان
سوائل و/أو أملاح من جسمك بشكل حاد.
- كنت تتلقى ميوحة بولية (أدوية تزيد من كمية الماء التي تطرحها
عن طريق كبدك) أو تخضع لنظام تغذية محدود الملح، الذي
يؤدي إلى فقدان سوائل وأملاح من جسمك بشكل حاد (أنظر
الفرقة 3 «كيفية استعمال لوتان؟»).

- علمت بأن لديك تضيق أو انسداد في الأوعية الدموية المؤدية
إلى كبدك أو إذا اجتزت عملية زراعة كلية مؤخرًا.
- وجد لديك خلل في وظيفة كبدك (أنظر الفترتين 2.1
«لا تتناول لوتان إذا»، و 3 «كيفية استعمال لوتان؟»).
- كنت تعاني من قصور القلب، أو بدون تضرر الكلى، أو
بمشاكله اضطرابات خطيرة، ومهددة للحياة في نظم القلب.

يجب توخي الحذر خاصة عندما تكون مُتعالجاً في نفس الوقت
بحاجب بيتا (β-blocker).

- وجدت لديك مشاكل في صمامات القلب أو في عضلة القلب.
- كنت تعاني من مرض قلبي إكليلي (الناجم عن نقص تدفق الدم
في الأوعية الدموية للقلب) أو مرض دمائي وعائي (الناجم عن
إنخفاض تدفق الدم في الدماغ).
- كنت تعاني من فرط الألدوستيرونية الأولي (متلازمة ناجمة
عن خلل في الغدة الكظرية وترمبطة بزيادة إفراز هورمون
الألدوستيرون من الغدة).
- كنت تتناول أياً من الأدوية التالية التي تُستعمل لعلاج ارتفاع
ضغط الدم:
- مثبط ACE (مثلاً: إنالابريل، ليزينوبريل، رامبوبريل). خصوصاً
إذا وجدت لديك مشاكل في الكلى لها علاقة بمرض السكري.
- اليكسيريين

- من شأن طبيبك أن يفحص وظائف الكلى لديك، ضغط الدم وكمية
الشوارد الكلوية (البوتاسيوم مثلاً) في دمك بفترات زمنية ثابتة.
أنظر أيضاً معلوماتنا في الفقرة 2.1 «لا تتناول لوتان إذا».

• كنت تتناول أدوية أخرى التي قد ترفع نسب البوتاسيوم
في الدم (أنظر أيضاً معلوماتنا في الفقرة 2.3 «تناول
أدوية أخرى»).

2.3 تناول أدوية أخرى

لا تتناول وتتناول أو تناولت مؤخرًا أدوية أخرى، بما في ذلك
أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، عليك إبلاغ
الطبيب المعالج أو الصيدلي عن ذلك.

إحك لطبيبك إذا كنت تتناول إضافات البوتاسيوم، بدائل الملح
الحايوية على بوتاسيوم، أدويةحافظة للبوتاسيوم مثل مدرات البول
معينة (أمليوريد، تيراميترين، سيبرونولوكتون) أو أدوية أخرى التي
قد ترفع نسبة البوتاسيوم في الدم (مثلاً، ميثان، ميريان، أدوية تحتوي
على تريموثوبريم)، حيث أن مشاركتها مع لوتان غير موصى به.
يجب الحذر خاصة إذا كنت تتناول الأدوية التالية خلال فترة
العلاج بـ لوتان:

- أدوية أخرى لخفض ضغط الدم، لأنها قد تخفض أكثر من ضغط
الدم الخاص بك. قد ينخفض ضغط الدم أيضاً نتيجة لتناول
واحد من الأدوية/مجموعة الأدوية التالية: مضادات الإنكباب من
نوع ثلاثية الحلقة، أدوية مضادة للتلان، مثلاً: أميفوستين.
- مضادات التهاب الستيرويدية - مثل إندوميثاسين، ينمفل
مثبطات COX-2 (أدوية التي تقلل من التهاب والتي يمكن
استعمالها من أجل المساعدة في تخفيف الألم)، لأنها قد تقلل
من تأثير لوسارتان على خفض ضغط الدم.
- من الجائز أن يضطر طبيبك إلى تغيير الجرعة الدوائية و/أو
إختناز وسائل أخرى؛
- إذا كنت تتناول مثبط ACE أو اليكسيريين (أنظر أيضاً معلوماتنا

في الفقرة 2.1 «لا تتناول لوتان إذا»، وفي الفقرة 2.2، «تحذيرات
خاصة متعلقة باستعمال لوتان».

إذا وجد لديك خلل في وظيفة الكلى، فإن الإستعمال المتزامن
لهذه الأدوية قد يؤدي إلى تدهور في الأداء الوظيفي الكلوي.
لا يجوز تناول لوسارتان بأشراكه مع أدوية تحتوي على ليثيوم دون
إشراف طبيبك. وسأل كل من قبل طبيبك. خاصة (على سبيل
المثال إجراء فحوص الدم) مع ذلك تكون محذرة.

2.4 تناول لوتان مع الطعام والشراب:

بالإمكان تناول لوتان مع أو بدون طعام.

2.5 الحمل والإرضاع:

الحمل

أنت ملزمة بإبلاغ طبيبك إذا كنت تعتقدون بأنك حامل (أو من
شأنك أن تصبحي حامل). سيوصيك طبيبك عادة بالتوقف عن
تناول لوتان قبل أن تصبحي حاملاً أو في اللحظة التي علمت
فيها بأنك حامل وسيوصيك بتناول دواء آخر بدلاً من لوتان.
لا بوصي بتناول لوتان في بداية الحمل ولا يجوز تناوله إذا كنت
تأمله أكثر من 3 أشهر، لأنه قد يسبب ضرراً خطيراً لطفلك إذا
تم تناوله بعد الشهر الثالث للحمل.

الإرضاع

أخبري طبيبك إذا كنت مرضعة أو تخططين في البدء بالإرضاع.
لوتان غير موصى به للأمهات المرضعات، ومن شأن طبيبك أن
يختار لك علاجاً آخرًا إذا كنت معينة بالإرضاع. خاصة إذا كان
طفلك مولود للثى، أو ولد قبل الأوان.

يجب استشارة طبيبك أو الصيدلي قبل تناول هذا الدواء.

2.6 السياقة واستعمال الماكنت:

لم يتم إجراء أبحاث بخصوص التأثيرات على القدرة على السياقة
أو تشغيل الماكنت.

من غير المرجح أن يؤثر لوتان على قدرتك على السياقة أو
تشغيل الماكنت، بالرغم من ذلك، وكما هو الحال مع العديد
من الأدوية الأخرى التي تستعمل لعلاج ارتفاع ضغط الدم، فإن
لوسارتان قد يؤدي إلى دوام أو غثاس عند بعض الأشخاص. إذا
كنت تقاسي من دوام أو غثاس، فليكن إستشارة طبيبك قبل أن
تحاول تنفيذ مثل هذه الأنشطة.

2.7 معلومات مهمة بخصوص جزء من مركبات لوتان:

تحتوي أقراص لوتان على لكتوز (المحتوى للكثوز، أنظر الفقرة
6). إذا قيل لك من قبل الطبيب أن لديك عدم تحمل لسكريات
معينة، إتصل بطبيبك قبل تناول هذا الدواء.
أقراص لوتان تحتوي على بوتاسيوم (المحتوى اليوتاسيوم،
أنظر الفقرة 6).

3 كيفية استعمال لوتان؟

دائماً يجب تناول لوتان بالضغط كما قال لك الطبيب. عليك
الإستيضاح من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن واثقاً.
يحدد طبيبك الجرعة الدوائية ومدة العلاج.
يحدد طبيبك الجرعة الدوائية اللازمة من لوتان، مع الأخذ بعين
الإعتبار حالتك وفيما إذا كنت تتناول أدوية أخرى.

من المهم مواصلة تناول لوتان طالما وصفه لك طبيبك، من أجل
الحفاظ على السيطرة على ضغط الدم لديك.
المرضى الكبار الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم
يبدأ العلاج عادة بإستعمال 50 ملغ لوسارتان (قرص واحد من
لوتان 50) مرة في يوم، مع التعمال. من المفترض تحقيق التأثير الأعظمي
لخفض ضغط الدم بعد 3-6 أسابيع من بدء العلاج. لدى بعض
المعالجين قد يتطلب الأمر أحياناً أن يرفع الجرعة الدوائية عن
الدواء بعد ذلك إلى 100 ملغ من لوسارتان (قرص واحد من لوتان
100)، مرة في اليوم، إذا كان لديك إنطباع بأن تأثير لوسارتان
أقوى أو أضعف مما ينبغي، الرجاء تحدث مع طبيبك أو الصيدلي.

المرضى الكبار الذين يعانون من ضغط دم مرتفع، سكري من نوع 2 وبيرويتين في البول
يبدأ العلاج عادة بإستعمال 50 ملغ لوسارتان (قرص واحد من لوتان 50) مرة في اليوم.
لدى مرضى معينين هناك حاجة أحياناً إلى رفع الجرعة الدوائية للدواء إلى 100 ملغ لوسارتان (قرص واحد من لوتان 100)، مرة في اليوم، حسب تأثير الدواء على ضغط الدم.

بالإمكان تناول لوسارتان سوية مع أدوية أخرى لتخفيف ضغط الدم (مثلاً، حديدات اللول، حاجبات قنوات الكالسيوم، حاجبات ألفا أو حاجبات بيتا ومستحضرات ذات فعالية مركزية، وميثاوسون وإسولين وأدوية أخرى التي تستعمل بشكل شائع لتخفيف مستوى الجلوكوز في الدم (مثلاً، سولفونيل أوريا، جليتازون وميثيلازوكبريد).

المرضى الكبار الذين يعانون من قصور القلب يبدأ العلاج عادة بإستعمال 12.5 ملغ لوسارتان (قرص واحد من لوتان 12.5) مرة في اليوم، عادة، ينبغي زيادة الجرعة كل أسبوع، خطوة إلى الأخرى (الموصى به 12.5 ملغ ليوم خلال الأسبوع الأول، 25 ملغ لليوم خلال الأسبوع الثاني، 50 ملغ لليوم خلال الأسبوع الثالث، 100 ملغ لليوم خلال الأسبوع الرابع، 150 ملغ لليوم خلال الأسبوع الخامس) حتى الوصول إلى الجرعة الدوائية الدائمة التي تحدها طبيبها. الجرعة الدوائية العظمى هي 150 ملغ (ثلاثة أقراص من لوتان 50 ملغ)، مرة في اليوم. عند علاج قصور القلب، يعطى لوسارتان غالباً بمشاركة كبد اللول (دواء إيثا زيد من كيمية الماء التي تفرحها عن طريق كليتيك) وأو ديجيتاليس (دواء الإيثا يساعده على تقوية وتحسين نجاعة عمل القلب) و/أو حاجب بيتا.

الجرعة الدوائية لدى فئات خاصة من المرضى.
من شأن الطبيب أن يوصي بجرعة واثية أقل، خاصة عند بدء العلاج لدى مرضى معينين، مثل هؤلاء الذين يتعالجون بجرعات عالية من المدرات البولية، لدى مرضى ضغط الدم الكبد أو لدى مرضى تزيد أعمارهم عن 75 سنة. لا يجوز إستعمال لوسارتان لدى مرضى لديهم خلل خطير في الكبد (أنظر الفقرة 2.1 لا تتناول لوتان إذا)،

لا يجوز تناول الجرعة الكاملة الموصى بها، طريقة الإعطاء
يجب تناول الأقراص بشكلها الكامل مع كأس من الماء. عليك تجنب الية الجرعة الدوائية اليومية الخاصة بك في نفس الوقت تقريباً كل يوم. من المهم مواصلة تناول لوتان حتى يخبرك الطبيب خلاف ذلك.

لوتان 12.5: لا يجوز شطر القرص.
لوتان 50، لوتان 100: عند الحاجة بالإمكان شطر القرص للإستعمال الفوري.
لا تتوفر معلومات بخصوص سحق أو مضغ القرص.

إذا تناولت أكثر مما يتوجب عليك تناوله من لوتان
أعراض فرط الجرعة الدوائية هي: إنخفاض ضغط الدم، تزايد النض، من الجائز حدوث إنخفاض في النض.
إذا تناولت جرعة واثية مفرطة أو إذا بلغ طفل بالخطأ من الدواء، توجه حلالاً إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر معك علبة الدواء.

إذا نسيت تناول لوتان
إذا نسيت تناول الجرعة الدوائية اليومية، فلا يجوز تناول جرعة واثية مضاعفة. تناول الجرعة الدوائية التالية في الموعد الإعتيادي واستشر الطبيب.

يجب المواظبة على العلاج بحسب توصيات الطبيب.
كيف يمكنك المساهمة في نجاح العلاج؟
من المهم مواصلة تناول لوتان طالما يصفه لك طبيبك للحفاظ على السيطرة على ضغط دمك.

لا يجوز تناول أدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تتناول فيها دواء. النظرات الطبية إبداً إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أية أسئلة إضافية حول إستعمال هذا الدواء، إسأل طبيبك أو الصيدلي الخاص بك.

4) الأعراض الجانبية
كما بكل دواء، إن إستعمال لوتان قد يسبب أعراضاً جانبية. بعض المستعملين لا تندمش من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني أي منها.

يجب التوقف عن إستعمال الدواء والتوجه إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ القريبة إذا ظهر:

رد فعل تحسسي خطير (طفح، حكة، إنتفاخ الوجه، الشفتين، الفم أو الحنجرة التي قد تؤدي إلى صعوبات في البلع أو في التنفس). هذا عرض جانبي خطير لكثرة نادر الذي يظهر ببطوع قدره 1-10 متعالجين من بين 10,000. قد تحتاج إلى علاج طبي طارئ أو المبيت في المستشفى.

بلغ عن حدوث الأعراض الجانبية التالية بإستعمال لوتان:

شائعة (قد تؤثر على حتى شخص واحد من بين 10):
دوار؛ ضغط دم منخفض (خاصة بعد حدوث تزايد في فقدان الماء من الجسم من داخل الأوعية الدموية، على سبيل المثال لدى مرضية لديهم قصور قلبي شديد أو يخضعون للعلاج بجرعات دوائية مرتفعة من المدرات البولية)؛ أعراض لضغط دم منخفض المتعلقة بالجرعة الدوائية مثل، إنخفاض ضغط الدم الذي يظهر عند القيام من وضعية الإستلقاء أو الجلوس؛ الإرقاق؛ إنخفاض نسبة السكر في الدم أكثر مما ينبغي (هناها:؛ ارتفاع نسبة اليوسايم أكثر مما ينبغي في الدم (hyperkalemia)؛ تغيرات في وظيفة الكلية، بما في ذلك قصور الكلى؛ إنخفاض في عدد خلايا الدم الحمراء (فقر الدم)؛ ارتفاع اليوريا في الدم، الكرياتينين في العير واليوسايم في المصل؛ لدى مرضى لديهم قصور قلبي؛ غير شائعة (قد تؤثر على حتى شخص واحد من بين 100 شخص): ميل للنوم؛ صداع؛ إضطرابات في النوم؛ شعور بتزايد نظم القلب (خفقان)؛ ألم شديد في الصدر (angina pectoris)؛ ضيق التنفس (dyspnoea)؛ ألم في البطن؛ إسهال؛ غثيان؛ تقيؤ؛ شرى (urticaria)؛ حكة (pruritus)؛ طفح؛ إنتفاخ موضعي (وذمة)؛ سعال.

نادرة (قد تؤثر على شخص واحد من بين 1,000 شخص):
فرط الحساسية؛ وذمة وعائية؛ التهاب الأوعية الدموية (التهاب وعائي، بما في ذلك Henoch-Schönlein purpura)؛ خدر أو الشعور بالخوف؛ إغماء (parasthesia)؛ نبض سريع جدا وغير منتظم (رخاخ أنيبي)؛ سكتة؛ التهاب الكبد (hepatitis)؛ ارتفاع في مستوى الأنتين أمينو ترانسفيراز في الدم (ALT)، الذي يزيل عادة مع التوقف عن العلاج.

غير معروفة (لا يمكن تقدير الشيع من المعلومات المتوفرة):
إنخفاض في عدد صفائح الدم؛ شقيقة؛ إضطرابات في وظيفة الكبد؛ ألم في العضلات والمفاصل؛ أعراض تشبه الإنفلونزا؛ ألم في الظهر والتهاب في المسالك البولية؛ زيادة في الحساسية للشمس (photosensitivity)؛ آلام عضلية مجهولة السبب تتراقق بيول (بلون الشاش)؛ إنخفاض في سكر الدم؛ عجز جنسي؛ التهاب البنكرياس (pancreatitis)؛ إنخفاض مستويات الصوديوم في الدم (hyponatraemia)؛ إكتئاب؛ شعور عام غير جيد؛ نضين؛ آزيرو، ذوي أو طقطقة في الأنتين (طنين)؛ إضطراب في الرؤية. إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمتم إحدى الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

التبليغ عن أعراض جانبية

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط «تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج واثي» الصموج على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.au) الذي يوجهك إلى النموذج العياشر للتبليغ عن أعراض جانبية.

بالإضافة لذلك، بالإمكان التبليغ لشركة «يونيفارم م.ض.».

5) كيفية تخزين لوتان؟

- تجنب التسيما! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- لا يجوز إستعمال لوتان بعد إنقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العلبة. يشير تاريخ إنقضاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- يجب تخزين الدواء بدرجة حرارة دون 25 درجة مئوية وفي مكان محمي من الضوء.
- لا يجوز رمي الأدوية في المجاري أو في القمامة المنزلية. إستشر الصيدلي عن كيفية التخلص من أدوية لم تعد قيد الإستعمال. إن إتخاذ هذه الإجراءات يساعد في الحفاظ على البيئة.

6) معلومات إضافية

يحتوي الدواء بالإضافة للمادة الفعالة أيضاً: Lactose anhydrous; Microcrystalline cellulose; Pregelatinized starch; Magnesium stearate; Opadry white Y-1-7000.

- يحتوي لوتان 12.5 على بوتاسيوم بالكمية التالية: 1.06 (0.027 ميلي- مكافئ).
- يحتوي لوتان 50 على بوتاسيوم بالكمية التالية: 4.24 (0.108 ميلي- مكافئ).
- يحتوي لوتان 100 على بوتاسيوم بالكمية التالية: 8.48 (0.216 ميلي- مكافئ).

يحتوي لوتان 12.5 على لكتوز بالكمية التالية: 25.1 ملغ.
يحتوي لوتان 50 على لكتوز بالكمية التالية: 100.4 ملغ.
يحتوي لوتان 100 على لكتوز بالكمية التالية: 200.8 ملغ.

كيف يبدو الدواء وما هو محتواه العلبي:
لوتان معبأ داخل لوحات (بيستر) داخل علبة كرتون. يوجد في كل علبة 7.5، 10، 14، 15، 20، 25، 28 أو 30 قرصاً. من الجائز ألا تتسوّ كافة أحجام العلب.

أقراص لوتان 12.5 هي، مطلية، مستديرة، محببة من كلا الجانبين، لونها أبيض.

أقراص لوتان 50 هي، مطلية، مستديرة، محببة من كلا الجانبين، مع خط للشرط من جانب واحد، لونها أبيض.

أقراص لوتان 100 هي، مطلية، بيضوية، محببة من كلا الجانبين مع خط للشرط من جانب واحد، لونها أبيض.

إسم صاحب الإمتياز: يونيفارم م.ض. ص.ب. 21429، تل - أبيب، 6121301.

إسم المنتج وعنوانه: يونيفارم م.ض.، يارك الصناعة «مافو كرم»، أرقام سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي هي وزارة الصحة:

لوتان 12.5: 01 31629 93 137
لوتان 50: 01 31630 93 137
لوتان 100: 01 31707 93 139

من أجل سهولة وتسهيل القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين. تم إعداده في تشرين الثاني 2020 بموجب تعليمات وزارة الصحة.